

Drei neue *Ptinus*-Arten. (Col.)

Von M. Pic, Digoin.

Die Kenntniss der drei hier beschriebenen Arten verdanke ich der freundlichen Mitteilung des Herrn Sigm. Schenkling, Kustos am Deutschen Entomologischen National-Museum; diese drei neuen Arten gehören der Sammlung des Museums an.

Ptinus disconotatus n. sp.

Latus et brevis, nitidus, rufus, oculis elytrisque pro parte nigris, plus minusve fulvo aut griseo pubescens, indistincte hirsutus; antennis gracilibus, testaceis; thorace brevis, lateraliter subdentato et fasciculato, antice granuloso, postice fere brevis et transverse punctato; scutello brevis, albido; elytris brevibus, mediocriter striato punctatis, interstitiis latis, rufis, in medio late, in lateraliter brevis et irregulariter, nigro notatis, sutura post medium nigra; pedibus gracilibus, testaceis, fulvo pubescentibus. — Long.: 3 mm. — Ost-Afrika (ohne nähere Angabe).

Cette espèce est bien facile à reconnaître grâce à son système de coloration joint à sa forme large (celle-ci se rapproche de celle de *nobilis* Boield.), ainsi qu'à la structure particulière de son prothorax dont la partie basale est presque lisse, marquée postérieurement d'une rangée transversale de points assez forts, tandis que la partie antérieure est fortement granuleuse. La disposition de la pubescence sur les élytres est irrégulière, cette pubescence est nulle par places, notamment sur la grande macule foncée qui est placée sur le milieu de la suture, macule qui, vue à l'oeil, tranche nettement sur le fond des élytres.

Devra prendre place près de *Pt. nobilis* Boield. et autres espèces voisines.

Ptinus divulgatus n. sp.

Latus, satis brevis, nitidus, nigro-metallicus, griseo maculosus aut pubescens, nigro fasciculatus et hirsutus; antennis gracilibus, rufescentibus; thorace granuloso, brevis et angustatus, lateraliter sinuatus, in disco quadri-fasciculatus; scutello subelongatus, albido; elytris brevibus, substriato punctatis, interstitiis latis, nigro-metallicis, humeris prominulis et brunneis, irregulariter griseo maculosis et fasciis nigris ornatis; pedibus gracilibus, nigris, genibus tarsisque rufescentibus. — Long.: 3,5 mm. — America meridionalis: Chili.

Cette espèce est très différente de la plupart des espèces exotiques par son aspect métallique et bien distincte par les élytres irrégulièrement mouchetés de petites macules grises alternées

avec des fascicules faits de poils noirs; elle se rapproche par sa coloration de *Pt. chilensis* Pic et s'en distingue par la disposition autre de la pubescence sur les élytres, la coloration foncière générale des élytres uniforme, le prothorax plus étroit.

Ptinus Drakei n. sp.

Satis latus, nitidus, niger, albido fasciatus, longe hirsutus, et indistincte fasciculatus; antennis gracilibus, articulo primo obscuro excepto, rufo testaceis; thorace brevis, lateraliter sinuato, in disco lateraliter albo lineato et in medio longe fasciculato (fasciculis pilosis obscuris binis, ad basin junctis); scutello brevis, albido; elytris satis latis, sat fortiter striato punctatis, interstitiis angustatis, albido fasciatis, fascia prima stragulata valde et irregulariter sinuata, fascia secunda lata et fere recta, longe hirsutis et indistincte nigro fasciculatis (pilis plus minusve obscuris et grandis); infra corpore dense albido pubescente; pedibus gracilibus, rubro-testaceis. — Long.: 2,3 mm. — America meridionalis: Paraguay (Dr. Drake).

Cette espèce est tout à fait voisine, par sa forme et sa coloration, de *Pt. Theresae* Pic, du Brésil, elle en est cependant bien distincte par les fascicules de poils noirs juxtaposés du prothorax qui, vus de profil et par coté, apparaissent sous la forme d'une dent longue et saillante en dessus, par les antennes grêles et claires, par la fascie antérieure des élytres plus sinuée et faite de poils plus longs et moins rapprochés, celle-ci remontant jusqu'à l'écusson vers la suture et émettant un rameau qui remonte au milieu vers les épaules, la présence d'une fascie subécailleuse transversale (au lieu de macules séparées) postmédiane, faite également de poils subécailleux longs et peu rapprochés, enfin par la ponctuation plus forte des stries.

Es freut mich, diese neue *Ptinus*-Art Herrn Dr. Drake, der sie in Paraguay (andere genauere Fundortsangabe fehlt) sammelte, widmen zu können.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1907](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Drei neue Ptinus-Arten. \(Col.\) 317-318](#)