

Neuheiten

der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1907.

Von J. Gerhardt, Liegnitz.

Abkürzungen: Gb. = Generalmajor Gabriel-Neisse.

G. = Gerhardt.

K. = Rektor Kolbe-Liegnitz.

Rtrr. = Reitter.

Schr. = Schreiber, Lehrer, Neusalz.

v. V. = von Varendorff, Amtsrichter,
Guhrau.

1. *Dyschirius bacillus* Schaum. Guhrau (v. V.). 1 Ex. Fleischer det.
 2. *Tachys micros* Fisch. Nicht selten im feinen Ufersande der Katzbach bei Liegnitz (G.). Bisher mit der folgenden Variation vermengt.
Tachys bistriatus v. *rufulus* Rey. Mit der Stammform: Katzbach, Jakobsdorfer und Jeschkendorfer See. ss. (G.)
Dytiscus circumcinctus v. ♀ *dubius* Gyll. Liegnitz (G.).
Dytiscus circumflexus v. *perplexus* Lai. Liegnitz (G.).
 3. *Homalium sulcolum* Steph. Glatzer Geb. (Gb. 9).
 4. *Stenus Rogeri* Kr. In Schlesien nach Letzner s. Nach Ganglbauer gute Art.
Philonthus tenuis v. *nigricollis* m. Halsschild fast schwarz. Liegnitz G.), Ohlau: Rodeland (Lehrer Tischler).
 5. *Quedius Scribae* Ganglb. Beskiden (Rtrr.).
 6. *Tachinus marginatus* Gyll. Spindelmühl i. Rsgb. (G.). Ohlau: Rodeland, unter Laub von Sträuchern in Gärten (Lehrer Tischler).
 - Atheta fungi* v. *fuscicornis* Kolbe. Liegnitz (K. G.). Auch die Wiener Museumsstücke von *A. orbata* gehören hierher. (G.)
 7. *Gyrophana gentilis* Er. Neustadt O.-Schl., Schweinsdorf (Gb.).
 8. *Cephennium carnicum* Rtrr. Beskiden (Rtrr.).
 9. *Agathidium bescidicum* Rtrr. Wie voriger.
 10. *Ptiliolum Sahlbergi* Flach. An Wildfutter, Pilzen und Rehaas n. s. Kiesewald i. Rsgb. (K.).
 11. *Ptiliolum fuscum* Er. Liegnitz: Vorderheide (K. 5). Rabengeb.: Ullersdorf, in Wildfutterresten (G. 7).
 12. *Ptiliolum Schwarzii* Flach. An ausgelegtem Aase kleinerer Tiere. Liegnitz: Forst Rehberg (5–6) hfg. Rsgb.: Kiesewald, einzeln (K. 7).
- Cercyon pygmaeus* v. *merdarius* Sturm. Liegnitz: Pantener Höhen, aus Kiefernadeln gesiebt (G.).

- 210 Gerhardt, Neuheiten der schles. Käferfauna aus dem Jahre 1907.
13. *Trichodes favarius* Illig. Lüben und Freistadt, auf Schirmblüten, s., 6–7. (Schr.)
Trichodes favarius v. *Schreiberi* m. Die ganze Oberseite rotgelb behaart. Gröfse der Stammform. Lüben: Grofs-Krichen. 1 Ex. (Schr.)
14. *Monotoma testacea* Motsch. In Komposthaufen und diverser Jäte, zuweilen zahlreich. 7–9 (G.).
Monotoma longicollis v. *quadrifoveolata* m. Das Halsschild aufser den beiden Basaleindrücken noch 2 deutliche Apicaleindrücke. Mit der Stammform in verschimmeltem Kompost. Ein sehr kleines Exemplar.
15. *Cryptophagus punctipennis* Bris. Quanzendorf (Gb.).
16. *Cis punctulatus* Gyll. Beskiden (v. V.).
17. *Meligethes Kunzei* Er. Glatzer Geb. (Gb.).
18. *Atomaria bescidica* Rtrtr. Beskiden (Rtrtr.).
19. *Anommatus duodecimstriatus* Müll. Unter faulendem Stroh. 1 Ex. Liegnitz: Weifsenrode. 6 (K.).
20. *Sphaerocoma carpathica* Rtrtr. Beskiden (Rtrtr.).
21. *Cardiophorus rufipes* Geoffr. Unter Buchenrinde. Neusalz: Grofs-Wartenberg. 1 Ex. 28. III. 07. (Schr.)
22. *Ptinus bescidicus* Rtrtr. Beskiden (Rtrtr.).
Psylliodes picina v. *bicolor* m. Halsschild rotgelb, Decken schwarzbraun. 1 Ex. Liegnitz (G.).
23. *Aphthona Czwalinae* Ws. Guhrau, mehrfach auf *Euphorbia esula*. (v. V.)
24. *Dibolia rugulosa* Rdtb. Guhrau ss. (v. V.).
25. *Microcopes uncatus* Friv. Unter schimmelndem Weifsbuchenlaub. Lähn. 7 (G.). *Cotaster uncinatus* ist nicht schlesisch.
Gymnetron veronicae Germ. v. *nigrum* Hardy. Mit der Stammform bei Liegnitz (G.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna ans dem Jahre 1907. 209-210](#)