## Neuheiten

der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1907.

Von J. Gerhardt, Liegnitz.

Abkürzungen: Gb. = Generalmajor Gabriel-Neisse.

G. = Gerhardt.

K. = Rektor Kolbe-Liegnitz.

Rttr. = Reitter.

Schr. = Schreiber, Lehrer, Neusalz. v. V. = von Varendorff, Amtsrichter, Guhrau.

- 1. Dyschirius bacillus Schaum. Guhrau (v. V.). 1 Ex. Fleischer det.
- 2. Tachys micros Fisch. Nicht selten im feinen Ufersande der Katzbach bei Liegnitz (G.). Bisher mit der folgenden Variation vermengt.

Tachys bistriatus v. rufulus Rey. Mit der Stammform: Katz-bach, Jakobsdorfer und Jeschkendorfer See. ss. (G.)

Dytiscus circumcinctus v. \( \rangle \) dubius Gyll. Liegnitz (G.). Dytiscus circumflexus v. perplexus Lai. Liegnitz (G.).

3. Homalium sulculum Steph. Glatzer Geb. (Gb. 9).

4. Stenus Rogeri Kr. In Schlesien nach Letzner s. Nach Ganglbauer gute Art.

Philonthus tenuis v. nigricollis m. Halsschild fast schwarz. Liegnitz G.), Ohlau: Rodeland (Lehrer Tischler).

5. Quedius Scribae Ganglb. Beskiden (Rttr.).

6. Tachinus marginatus Gyll. Spindelmühl i. Rsgb. (G.). Ohlau:
Rodeland, unter Laub von Sträuchern in Gärten (Lehrer
Tischler).

Atheta fungi v. fuscicornis Kolbe. Liegnitz (K. G.). Auch die Wiener Museumsstücke von A. orbata gehören hierher. (G.)

- 7. Gyrophaena gentilis Er. Neustadt O.-Schl., Schweinsdorf (Gb.).
- 8. Cephennium carnicum Rttr. Beskiden (Rttr.).
- 9. Agathidium bescidicum Rttr. Wie voriger.
- 10. Ptiliolum Sahlbergi Flach. An Wildfutter, Pilzen und Rehaas n. s. Kiesewald i. Rsgb. (K.).
- 11. Ptiliolum fuscum Er. Liegnitz: Vorderheide (K. 5). Rabengeb.: Ullersdorf, in Wildfutterresten (G. 7).
- 12. Ptiliolum Schwarzi Flach. An ausgelegtem Aase kleinerer Tiere. Liegnitz: Forst Rehberg (5 6) hfg. Rsgb.: Kiesewald, einzeln (K. 7).
  - Cercyon pygmaeus v. merdarius Sturm. Liegnitz: Pantener Höhen, aus Kiefernadeln gesiebt (G).

Gerhardt, Neuheiten der schles. Käferfauna aus dem Jahre 1907. 210

13. Trichodes favarius Illig. Lüben und Freistadt, auf Schirm-

blüten, s., 6-7. (Schr.) Trichodes favarius v. Schreiberi m. Die ganze Oberseite rotgelb behaart. Größe der Stammform. Lüben: Groß-Krichen. 1 Ex. (Schr.)

14. Monotoma testacea Motsch. In Komposthaufen und diverser Jäte, zuweilen zahlreich. 7-9 (G.).

Monotoma longicollis v. quadrifoveolata m. Das Halsschild außer den beiden Basaleindrücken noch 2 deutliche Apicaleindrücke. Mit der Stammform in verschimmeltem Kompost. Ein sehr kleines Exemplar.

15. Cryptophagus punctipennis Bris. Quanzendorf (Gb.).

16. Cis punctulatus Gyll. Beskiden (v. V.). 17. Meligethes Kunzei Er. Glatzer Geb. (Gb.).

18. Atomaria bescidica Rttr. Beskiden (Rttr.).

19. Anonmatus duodecimstriatus Müll. Unter faulendem Stroh.

1 Ex. Liegnitz: Weißenrode. 6 (K.).

20. Sphaercsoma carpathica Rttr. Beskiden (Rttr.). 21. Cardiophorus rujîpes Geoffr. Unter Buchenrinde. Neusalz: Grofs-Wartenberg. 1 Ex. 28. III. 07. (Schr.)

22. Ptinus bescidicus Rttr. Beskiden (Rttr.). Psylhodes picina v. bicolor m. Halsschild rotgelb, Decken schwarzbraun. 1 Ex. Liegnitz (G.).

23. Aphthona Czwalinae Ws. Guhrau, mehrfach auf Euphorbia

esula. (v. V.)

24. Dibolia rugulosa Rdtb. Guhrau ss. (v. V.).

25. Microcopes uncatus Friv. Unter schimmelndem Weifsbuchenlaub. Lähn. 7 (G.). Cotaster uncinatus ist nicht schlesisch.

Gymnetron veronicae Germ. v. nigrum Hardy. Mit der Stammform bei Liegnitz (G.).

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)</u>

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 1908

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: Neuheiten der schlesischen Käferfauna ans dem

Jahre 1907. 209-210