

3,5—5 mm. — Nilgiri Hills: Naduvatan, Ochterlony Valley, 6000—6500 Fufs, Dezember und Mai; in Erdhöhlen am Rande von kleinen Dschungeln, „sholas“ (H. L. Andrewes).

Eine sehr schmale, kleine Art. Schalgelb, Kopf und Halsschild zuweilen mehr rotgelb. Die schwarze Zeichnung auf den Seiten des Halsschildes normal einen länglichen Ring bildend, der hinten zugespitzt erscheint, mitunter ist aber dieser Ring vorn nicht geschlossen, oder er ist auf eine einfache Längslinie reduziert. Flügeldecken ziemlich regelmäfsig punktiert, hinter dem Schildchen tief längs eingedrückt, an der Spitze mit verdickter Schwiele, bei einem Exemplar ist die Scheibe der Flügeldecken unregelmäfsig schwärzlich gewölkt, dann ist auch die ganze Unterseite dunkel, während sonst nur der Hinterleib angedunkelt ist. Beine gelb, Tarsen etwas dunkler, Hinterschienen ohne Zähnen.

Mit *C. macer* Schklg. von Java verwandt.

Pogonostoma levigatum W. Horn n. sp. (Col.)

P. violaceo Flt. affine, differt statura graciliore; labro antice ♂ recte truncato, dente laterali distincta, intermediis obsolete, ♀ sat semicirculari, dentibus 4 validis instructo, ♂ ♀ minus rugoso, circumferentia a disco linea circulari distinctissima separata; capite supra multo subtilius sculpto, vertice angustiore postice evidenter strangulato, fronte in disco profunde confluentur bümpresso; prothorace minore convexiore, lateribus magis rotundatis, pone strangulationem anticam minus subito dilatato, supra levissime sculpto (fere sublevi), basi et apice levigatis (illa vix, hoc dense punctatis); elytrorum pubescentia illa brevissima subtiliore magis grisea, sculptura antica eadem, pone medium usque ad apicem punctis eodem modo atque antice separatis (solummodo perparum diminutis), spinis apicalibus nullis, apice decliviore, ♂ angulo externo apicali oblito, apice singulo: ♂ rotundato juxta suturam profundius quam *P. violaceo* Flt. emarginato, ♀ lateraliter recte truncato vel leviter exciso, ad suturam profundius quam ♂ emarginato, angulo externo sat recto rotundato, angulo juxtasuturali acuto interdum vel paullo prominente; labro, capitis et prothoracis superficie (hac tota dense breviter nigro-hirsuta) nitidioribus. — Long. 15—18 mm sine labro.

♀ ♂; Nordost-Madagaskar (Amboaniho und Vohemar).

Die äusserst feine Skulptur von Kopf und Pronotum genügen zur Erkennung. Ihre Kleinheit; die starke Vertexstrangulation; die gleichmäfsig tiefe, feine Skulptur der Flügeldecken, ihre eigentümliche Spitze beim ♂ usw. sind gleich bemerkenswert.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Pogonostoma levigatum W. Hörn n. sp. \(Col.\) 367](#)