

<i>Strigoderma floricola</i> , W.-Ecuador	p. 000
<i>Thyridium nigriventre</i> , O.-Ecuador	p. 000
<i>Chlorota Mathildae</i> , S.-Ecuador	p. 000
— <i>violacea</i> , O.-Ecuador	p. 398
<i>Pelidnota similis</i> , O.-Ecuador	p. 400
— <i>viridicuprea</i> , O.-Ecuador	p. 401
— <i>Söderströmi</i> , W.-Ecuador	p. 402
<i>Lasiocala opacicollis</i> , S.-Ecuador	p. 403
<i>Leucothyreus Wittii</i> , S.-Ecuador	p. 406
— <i>Davisi</i> , W.-Ecuador	p. 407
— <i>petropolitanus</i> , Brazil, Petropolis	p. 260
<i>Bolax salticola</i> , ibid.	p. 262
— <i>tacoaraphaga</i> , ibid.	p. 257

Neue Pselaphiden des Deutschen Entomol. National-Museums. (Col.)

Von A. Raffray, Rom.

Arthmius concolor n. sp.

Sat crassus et convexus, totus rufotestaceus, pube sat longa, dispersa, pallida vestitus. Caput leviter transversum, angulis posticis et anticis rotundatis, istis leviter elevatis, fronte medio declivi, simplice, utrinque impressione elongata, sinuata, posterius transversim intus extensa, vertice longitudinaliter carinato, occipite transverso, in vertice antierius foveis duabus inter se parum distantibus. Oculi ad medium siti. Antennae validae, articulis 3—8 longitudine sua paulo longioribus, 9—10 subglobosis, crescentibus, 11 magno, ovato, acuminato. Prothorax latitudine et longitudine subaequalis, cordatus, sulco transverso valido. Elytra latitudine sua vix longiora, basi valde attenuata, humeris rotundatis sed paululum elevatis. Abdomen elytris longius, segmento primo magno, basi impresso. Metasternum late sed parum profunde impressum. Pedes simplices. — Long. ♀ 1,90 mm.

Cette espèce dont la ♀ seule est connue est voisine de *modestus* Raffr. du Brésil, mais elle est plus grande, les antennes sont plus épaisses et la sculpture de la tête est différente: les angles antérieurs formant tubercules antennaires sont arrondis, peu élevés, les côtés sont à peu près droits, le front est un peu déprimé au milieu; de chaque côté il y a une impression allongée sinueuse plus profonde en arrière où elle s'étend transversalement vers le centre, faisant ainsi paraître l'occiput comme un

bourellet transversal, elle circonscrit, sur le vertex, un espace central très fortement cordiforme qui porte lui même, en avant, deux fovéoles et, au centre, une carène longitudinale.

Paraguay.

Batrisocenus cavidorsum n. sp.

Sat elongatus, fusiformis, castaneo-piceus, nitidus, breviter et parce pallide pubescens. Caput latitudine sua longius, angulis anticis rotundatis, elevatis et prominulis, fronte valde depressa et anteriorius prolongata, inter tubercula antennaria transversim impressa, lateribus intus arcuatis, temporibus fere nullis, inter oculos foveis duabus, vertice occipiteque carinatis. Oculi maximi, postice siti. Antennae validae, articulis oblongis, clava triarticulata parum conspicua, ultimo articulo fusiformi. Prothorax latitudine sua longior, subhexagonus, lateribus medio rotundatus et fere lobatus, disco valde convexus, sulcis longitudinalibus tribus, quorum lateralibus sinuatis, foveis duabus lateralibus et duabus alteris basalibus, fovea media fere cruciformi et utrinque tuberculis fere nullis. Elytra magna, humeris obliquis, valde prominulis, basi bifoveata, stria dorsali leviter sinuata, ad medium abbreviata. Abdomen elytris longius, postice attenuatum, segmento primo magno, lateribus basi angustato, posteriorius rotundatim attenuato et depresso, medio maxime et profunde excavato, ista cava fundo transversim lamellata et posteriorius longitudinaliter carinata. Metasternum obsolete impressum. Segmentis ventralibus simplicibus. Pedes validi, femoribus clavatis, posticis leviter compressis et intus oblique, parum profunde impressis, tibiis posticis arcuatis. — Long. ♂ 2,60 mm.

Cette espèce est très remarquable; elle appartient au groupe XVIII dans lequel le 1^{er} segment dorsal est seul sculpté, mais elle diffère de toutes les autres espèces africaines du même groupe par la tête plus longue à tubercules antennaires bien plus saillants, le prothorax plus long, plus hexagonal, les cuisses postérieures impressionnées en dedans et enfin l'armature très différente du 1^{er} segment dorsal: ce segment est assez brusquement rétréci presque tout de suite après la base, ses côtés vont en se rétrécissant et s'arrondissant en arrière où ils sont déprimés en dehors, l'excavation médiane est très grande et profonde, carrée à la base avec le bord supérieur cilié, les bords latéraux sont sinués, relevés et tranchants, elle s'étend jusqu'à la marge postérieure, au dessous du bord supérieur il y a une lame plate un peu oblique, dentée au milieu et s'appuyant sur une carène longitudinale qui se prolonge jusqu'à l'extrémité.

Sud-Ouest-Cameroun, Lododorf (C o n r a d t).

Batraxis tumidipes n. sp.

Tota ferruginea, polita, nitidissima. Caput leviter transversum, angulo externo supra antennas parum prominulo et foveato, utrinque posterius fovea altera latere approximata, temporibus magnis, obliquis. Oculi ad medium siti. Antennae validae, articulis 1—7 latitudine sua longioribus et longitudine decrescentibus, 8—9 quadratis, 10 majore transverso, 11 magno, subtriangulariter elongato et obliquo, ad apicem extus oblique sulcato. Prothorax breviter cordatus, convexus, fovea media antebasali, basi ipsa transversim impressa. Elytra quadrata, humeris rotundatis, basi bifoveata, stria suturali valida, dorsali nulla. Abdomen elytris longius, segmento primo magno, transverso, lateribus recto, margine laterali basi triangulari et deplanata, posterius subtilissime carinata, vix perspicua, basi carinulis duabus brevibus. Metasternum subhexagonum, medio late excavatum, lateribus carinatum. Segmento ultimo ventrali magno, impresso. Pedes validi, elongati, femoribus clavatis, pedum anticorum trochanteribus spina valida, recta, compressa, acuta armatis, tibiis medio inflatis, extus ante apicem leviter emarginatis, tibiis intermediis leviter sinuatis et ad apicem incrassatis, tibiis posticis arcuatis, ad apicem incrassatis. — Long. ♂ 2,00 mm.

Cette espèce est très voisine de *curvispina* Raffr. de Sumatra et de Singapore, elle en diffère par les fossettes de la tête dont les antérieures sont situées sur l'angle même antérieur et les deux autres en avant de la ligne médiane des yeux, tandis que dans *curvispina*, les fossettes antérieures sont situées assez près l'une de l'autre un peu en arrière du milieu du front et les postérieures un peu en arrière de la ligne médiane des yeux. L'épine des trochanters antérieurs est moins longue, droite et non recourbée, les tibias antérieurs sont renflés vers le milieu avec une échancrure obsolète près de l'extrémité, au côté externe. Le métasternum a les bords tranchants mais non dilatés en dent. Sumatra.

Decarthron saucium n. sp.

Totum rufum, antennis pedibusque dilutioribus, breviter fulvo-hirtum. Caput latitudine sua paulo longius, antrorsum leviter attenuatum, subdeplanatum, fronte transversim sulcata, foveis duabus validis inter se plus quam a latere distantibus et ante medium sitis. Oculi magni. Antennae in utroque sexu diversae. Prothorax latitudine et longitudine subaequalis, convexus, lateribus rotundatus, antice paulo plus quam postice attenuatus, fovea media basali minuta, lateralibus deficientibus. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata, humeris elevatis, stria dorsali ante medium

abbreviata. Abdomen elytris brevius, plicis duabus plus quam mediam partem disci includentibus et fere dimidiam attingentibus. Tibiis posticis leviter arcuatis.

♂. Antennae crassiores, irregulares et leviter tortae, articulis 2, quadrato, 3 obconico, 4 majore, intus inflato, 5 minore, subgloboso, 6 subquadrato, 7 transverso, 8 latiore, magis transverso, 6, 7, 8 intus paululum productis, 9 majore, quadrato, 10 (ultimo) ovato, basi truncato, apice acuminato. Femoribus intermediis valde dilatatis, supra pone medium maxime et acute angulatis, dein excavatis, ante apicem minus sed acutissime angulatis.

♀. Antennae simplices, articulis 2 valido quadrato, 3—6 latitudine sua paululum longioribus, 7, 8 leviter transversis, 9 majore, quadrato. Pedes simplices. — Long. 1,50 mm.

Paraguay.

Cette espèce est très voisine de *nanum* Schf. des Amazones; les antennes sont semblables, mais la taille est plus grande; l'armature des cuisses intermédiaires présente aussi une grande analogie, mais la dilatation anguleuse qui précède et surplombe l'excavation est beaucoup plus forte, l'angle beaucoup moins ouvert, pointu au sommet, mais n'est pas terminé, comme dans *nanum* par une épine dirigée obliquement en dehors, la seconde dilatation anguleuse, d'ailleurs bien plus petite et qui est située près de l'extrémité de la cuisse, est plus nettement anguleuse et plus pointue que dans *nanum*.

Vereinsangelegenheiten.

Der Vorstand hat die nötigen Schritte unternommen, daß unsere Deutsche Entomologische Gesellschaft gerichtlich eingetragen wird. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird an dieser Stelle darüber berichtet werden.

Vom 1. Mai d. J. an wird die bisher von dem verstorbenen Herrn Pastor F. K o n o w herausgegebene „Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie“ mit unserer Zeitschrift vereinigt. Die Mitglieder finden eine eingehende Auseinandersetzung über die Fusion auf der diesem Hefte beigegebenen Beilage.

Mit Manuskripten für die nächsten Hefte sind wir noch so reichlich versehen, daß die Redaktionskommission die geehrten Herren Mitarbeiter höflichst ersucht, die Zusendung besonders größerer Arbeiten vorläufig zu unterlassen.

Sigm. Schenkling.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Raffray A.

Artikel/Article: [Neue Pselaphiden des Deutschen Entomol. National-Museums. \(Col.\) 408-411](#)