

Die äußerst feine und zerstreute Augenbehaarung ist auch bei dieser Art vorhanden, aber sehr schwierig zu bemerken. Die Art scheint sehr selten und ist bis jetzt nur im nördlichen Rußland und in Galizien beobachtet worden; ich besitze ein einziges Männchen aus Pfarrkirchen in Oberösterreich durch die Güte des Herrn Abtes L. Czerny.

## Sammelbericht aus Ostpreußen für das Jahr 1907. (Col.)

Von **G. Vorbringer**, Königsberg.

Nachstehend ein Verzeichnis der für Ostpreußen neuen\*, resp. seltenen Käfer.

- Leistus piceus* Fröhl., 1 Exemplar, Gr. Raum, das dritte aus Ostpreußen bekannt gewordene Exemplar, aber von anderm Fundort wie die beiden ersten.
- \* *Haliphus fluvialis* Aubé var. *maculatus* Seidl. (teste G e h r h.), von Seidl. für Finnland angegeben, 1 Exemplar, Schiefsplatz.
- \* *Agabus congener* Payk. var. *lapponicus* Thoms., sonst für Schlesien und Lappland angegeben, 1 Exemplar, Cranz.
- \* *Heterocerus intermedius* Kiesw., 1 Exemplar, Metgethen.
- \* *Agrilus convexicollis* Redtb., 1 Exemplar, Gut Görlitz-Ostpreußen.
- \* *Eपुरaea limbata* F. var. *Skalitzkyi* Reitt., 1 Exemplar, Metgethen; von Schilsky für Böhmen angegeben.
- Dermestes vulpinus*, 2 Exemplare (unter vielen andern), aus einem Paket, welches aus unserer südwestafrikanischen Kolonie nach Ostpreußen gelangte.
- \* *Lathridius Bergrothi* Reitt., von Herrn Museumsassistent D a m p f hier zahlreich an den Wänden einer Wohnung gefunden; ursprünglich wohl aus Finnland beschrieben; gewinnt aber, wie schon G a n g l b a u e r bemerkt, an Verbreitung; neuerdings in P o t s d a m beobachtet, auch in Liegnitz (G e r h a r d t).
- \* *Corticaria foveola* Beck., 1 Exemplar, Gut Görlitz-Ostpreußen.
- \* *Cryptophagus pumilio* Ganglb. (Reitter determ.), 1 Exemplar, Gr. Raum; von G a n g l b a u e r nach 4 Exemplaren vom Wechselgebirge, Nied.-Österreich, beschrieben.
- Euplectus Duponti* Aubé, 1 Exemplar, Glacis, sehr selten.
- Trogophloeus nitidus* Baudi, am Sackheimer Tor, 1 Exemplar, das zweite von mir in Ostpreußen gefundene Exemplar.
- \* *Euaesthetus ruficapillus* Lac. var. (?) *Lespesi* Jac. Duv., der Käfer ist ganz rot gefärbt, macht aber nicht den Eindruck von unausgefärbten Exemplaren. — 2 Exemplare. Neuhausen und Angerburg.

- Stenus morio* Grav., 3 Exemplare, Gr. Raum, mikroptere Form.  
(Bernhauer determ.)
- Stenus pusillus* Er., fehlt im L entz schen Verzeichnis, aber wohl nur aus Versehen; von mir öfter gefunden, auch in der Steinerschen Sammlung aus Ostpreußen.
- Stenus nitens* Steph. (*aemulus* Er.), 1 Exemplar, Neuhausen, sehr selten.
- \* *Philonthus albipes* Er. var. *alpinus* Heer, 1 Exemplar, Nasser Garten.
- Hypocyptus seminulum* Er. (*pulicarius* Er.), bei Seidlitz getrennt, von Ganglbauer zusammengezogen; ist bei uns wohl nicht selten, zahlreiche Exemplare aus trockenem Schilfrohr geklopft, Gut Görlitz-Ostpreußen; auch von andern mehrfach in Ostpreußen gefunden.
- \* *Hypocyptus ovulum* Heer, 2 Exemplare, Gut Görlitz-Ostpreußen.
- Falagria nigra* Grav., bei uns nicht häufig; ich fand 7 Exemplare bei *Formica rufa* (!), Gut Görlitz-Ostpreußen, alle sehr dunkel gefärbt.
- \* *Callicerus obscurus* Grav.; 1 ♂, Sackheimer Tor, Schilskys Angabe für ganz Deutschland beruht wohl auf einem Irrtum.
- \* *Atheta parva* Sahlb. var. *muscorum* Bris., 1 Exemplar, Metgethen.
- \* *Atheta fuscipes* Heer, 1 Exemplar, Juditten (Bernhauer determ.).
- \* *Phytosus spinifer* Curtis., einige Dutzend Exemplare, Pillau; ein bemerkenswerter Fund, da dieser westeuropäische Seestrandkäfer vom deutschen Festlande bisher nicht bekannt zu sein scheint; Bernhauer besitzt ihn von der Insel Juist an der holländischen Grenze. Ich fand meine Exemplare unter am Strand lagernden Algen, die ich im Fangschirm ausschüttelte. Die Käfer sind träge, verkriechen sich gern im Sande und heben sich wegen ihrer dichten, grauen Behaarung und des rötlich gelben Fleckens am Nahtwinkel wenig von dem feuchten, gelblich grauen Seesande ab.
- \* *Aleochara obscurella* Grav., 4 Exemplare, Pillau.
- Aleochara inconspicua* Aubé. Diesen vor Jahren von mir zum ersten Male in Ostpreußen in einem Exemplare gefundenen Käfer fand ich im Herbst 1907 in der Nähe des Seestrandes bei Rauschen zahlreich unter dürrn Blättern von *Hippopharmanoides*.
- \* *Deubelia (Ocyusa) picina* Aubé, 2 Exemplare, Gut Görlitz-Ostpreußen. Weder Ganglbauer noch Seidlitz erwähnen, dafs das vierte freiliegende Dorsalsegment an der Basis tief quer eingedrückt ist!
- \* *Myllaena infusata* Kr., 2 Exemplare, Glacis.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Vorbringer Gustav

Artikel/Article: [Sammelbericht aus Ostpreußen für das Jahr 1907. \(Col.\) 475-476](#)