

# Über Fabricius'sche Typen der Gattung *Phyllobius* Schönh. und Germar'sche Typen der Gattung *Sibinia* Germ. (Col.)

Von J. Schilsky, Berlin.

## I.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. C. Brandt in Kiel war es mir vergönnt, die Typen der Fabricius'schen Sammlung zu untersuchen. Das Resultat war überraschend.

1. *Curculio calcaratus* F. ist identisch mit der var. *nidus* Westh. Als Stammform hat also die kahle, unbeschuppte Form zu gelten. Sie ist auch als solche beschrieben. Nach der Beschreibung würde man kaum diese Art vermuten. Nur 1 Exemplar mit roten Beinen. Näheres in Küst. 45. 64.

2. *Curc. abneti* F. 4 Exemplare, davon 3 Exemplare mit bläulichen Schuppen und schwarzen Beinen, 1 Exemplar mit grünen Schuppen und schwarzen Beinen.

3. *Curc. piri* F. 8 Exemplare, davon 1 Exemplar = *calcaratus* ♀, Basis der Schenkel und die Tarsen schwarz; Beschuppung kupfrig. 2 Exemplare ♀ = *calcaratus*: Schuppen grünlich, Beine einfarbig rot. 1 Exemplar *abneti* ♀ grünlich glänzend. Beine einfarbig rot. 2 Exemplare ♂ = *calcaratus* var. *atrovirens* Gyll. ♂. Beine rot. 1 Exemplar ♀ *calcaratus* mit gemakelten Flügeldecken, Beine rot. Diese Formen müssen als *calcaratus* var. *piri* F. betrachtet werden, sie bilden die Hauptmasse dieser Art.

4. *Curc. betulae* F. 2 Exemplare, 1 Exemplar (♂) war richtig. Schenkel schwärzlich, die Basis, die Spitze und die Tibien hellgelb. Das Halsschild in der Mitte und die Naht der Flügeldecken unbeschuppt. Fühler einfarbig hellgelb. Das zweite Exemplar war *Polydrosus cervinus* L. mit grünlichen Schuppen und schwarzen Beinen.

5. *Curc. argentatus* F. 8 Exemplare, davon 3 Exemplare mit schwarzen Schenkeln, 1 Exemplar mit ganz gelben Beinen; 1 Exemplar = *psittacinus* (schwarze Schenkel, gelbe Tibien); 1 *Polydrosus sericeus* und 2 *Myloccerus* sp.?

6. *Curc. mali* F. 1 Ex. = *Ph. oblongus*, Fühler und Beine hellgelb; 1 Exemplar = *Metallites*.

7. *Curc. pallidus* F. 1 Exemplar = *Phyll. incanus* Schönh., *pallidus* F. hat also nunmehr Priorität.

8. *Curc. vespertinus* F. 8 Exemplare, davon 5 *piri* L., 2 *Polydrosus cervinus* L. und 1 *Myloccerus* sp.?

## II.

Unserem Mitgliede Herrn Prof. Dr. Taschenberg in Halle verdanke ich es, die Typen der Germar'schen Sammlung gesehen zu haben.

1. *Sibinia vittata* Germ. 2 Exemplare, das erste Exemplar (mit 3 Längsbinden auf den Decken) bildet die Stammart, das zweite Exemplar die var. *subvittata* m. (Vide Küst. 45. 84.)

2. *S. fugax* Germ. Germar erhielt diese Art von Schüppel aus der Berliner Gegend. Das Exemplar war von Schüppel als *fugax* m. bezettelt. Ein solch bezettelttes Exemplar findet sich auch in meiner Sammlung. Es ist identisch mit *viscaria* der Autoren. In der Beschreibung sagt Germar aber, daß sie sich von *viscaria* L., die sich in seiner Sammlung nicht vorfand, unterscheide. *S. fugax* Fahrs. ist nun aber eine andere Art, die auch bei Berlin vorkommt, sich aber sehr leicht durch die Halsschildbildung unterscheiden läßt. Fahraeus bezieht sich auf die Angaben Germars (Schüppel, Berlin), hatte aber offenbar die Schüppel'schen Typen nicht vor sich.

3. *S. femoralis* Germ. (♀ 2,7 mm). Die Zeichnungen auf den Decken treten nur sehr undeutlich hervor, die braune Schrägmakel war nur sehr schwach angedeutet. Die Beschreibung ist jedenfalls nach besser gezeichneten Exemplaren entworfen. Bei dem typischen Exemplare ist die vordere Hälfte des Rüssels hellrötlich, die Basalhälfte bräunlich. Rüssel sonst dünn, gebogen, länger als Kopf und Halsschild zusammen. Fühler (mit Ausnahme der Keule) rötlich, Tibien und Tarsen rostfarbig. Die Schuppen liegen nebeneinander und sind doppelt so lang als breit. Nur 1 ♀.

Bemerkungen zu Wytsman,  
Genera Insectorum, Coleoptera: Curculionidae  
par Bovie.

Von K. M. Heller, Dresden.

Die mir vorliegenden 3 Lieferungen, Fascicule 69—71, des groß angelegten Sammelwerkes haben den durch seine sorgfältigen katalogographischen Arbeiten<sup>1)</sup> vorteilhaft bekannten Herrn A. Bovie, Brüssel, zum Verfasser. Der überaus reiche und

<sup>1)</sup> U. A.: Catalogue des Anthribides, Ann. Soc. Ent. Belg. 1905 und Catalogue des Curculionides de Belgique 1. c. 1906.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Schilsky Friedrich Julius

Artikel/Article: [Über Fabricius'sche Typen der Gattung Phyllobius Schönh. und Germar'sche Typen der Gattung Sibiria Germ. \(Col.\) 718-719](#)