

Neue mexikanische Staphyliniden. (Col.)

Von K. Schubert, Pankow-Berlin.

Die nachstehende Arbeit enthält eine Anzahl neuer Staphyliniden-Arten aus einer gröfsen Ausbeute, welche mir von Herrn Direktor Friedrich Schneider in liebenswürdigster Weise zur Bearbeitung übergeben wurde, wofür ich ihm hier nochmals meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Die Tiere stammen sämtlich aus dem südöstlichen Mexico, der Gegend von Jalapa, nördlich vom Pic d'Orizaba.

Ich gebe hiermit einen bescheidenen Beitrag zu der von D. Sharp bearbeiteten Staphyliniden-Fauna Mittelamerikas; seine grosse Arbeit erleichterte die Bewältigung des reichen Materials ungemein.

Falagria pergracilis n. sp.

Nigro-picea seu fusco-picea, nitida, subtiliter griseo-pubescentia, caput nigrum, subtilissime minus dense punctatum, thorace elytrisque dense subtiliter punctatis, scutellum aequale. — Long. 3—3 $\frac{1}{2}$, lat. fere 1mm.

Antennae valde elongatae, capit, thoracis elytrorumque longitudine, articulis omnibus latitudine longioribus, piceae, articulo primo testaceo. Caput nigrum, nitidum, subtilissime minus dense punctatum. Thorax anterior lateribus modice dilatatus, convexus, circiter distinete marginatus, sat profunde canaliculatus, dense subtiliter punctatus, nitidus, griseo-pubescentia. Elytra thorace parum longiora, picea, confertim subtiliterque punctata, subnitida, griseo-pubescentia. Abdomen subnitidum, confertim subtilissime punctatum, segmentis anterioribus tribus impressis. Pedes pergraciles, valde elongati, picei, tibiis tarsisque rufo-testaceis, tarsis posterioribus tibiarum fere longitudine, articulo primo sequentibus longitudine aequali.

Stenagria Schneideri n. sp.

Pergracilis, nigra, nitida, impunctata, antennarum basi articulis binis ultimis, pedibus basi apiceque rufo-testaceis, coris anterioribus obscuris abdominis segmento basali toto infuscato. — Long. 3 mm, lat. elytr. fere $\frac{3}{4}$ mm.

Sten. constrictae Sh. affinis, paulo minor, gracilior. Caput thorace paululum latius, rotundatum, pone oculos valde angustatum, laevissimum, nigrum, nitidum, parce tenuissimeque pubescens. — Antennae pergraciles, capite thoraceque sat longiores, piceae, basi apiceque rufo-testaceae, articulis omnibus elongatis, articulo 3° 2° que subaequalibus, 4—10 sensim paulo brevioribus, at parum crassioribus, ultimo modice elongato; apice rotundato. Thorax

latitudine summa longior, lateribus ampliatus, basin versus valde coarctatus, nitidus, laevis, sat profunde canaliculatus, angulis posticis acutis. Elytra thorace parum breviora, fere duplo latiora, lateribus leviter rotundata, nitida, impunctata, tenuissime vix perspicue pubescentia, sutura pone scutellum impressione communi notata. Abdomen medio dilatatum, supra fere planum, infra convexum, nigrum totum impunctatum, nudum, apice paulo infuscatum. — Pedes elongati, graciles, coxis intermediis posticisque, femoribus basi, tibiis apice tarsisque testaceis.

Zyras ater n. sp.

Breviusculus, *ater*, *nitidus*, *antennis*, *segmentorum secundo tertioque*, *geniculis tarsisque piceo-rufis*, *hoc laevigato*, *segmento primo utrinque unispinoso*, *spinis curtis*. — Long. 4 mm, lat. $1\frac{1}{2}$ mm..

Mas: *Abdominis segmento 7º supra medio ante apicem unituberculato*.

Antennae capite prothoraceque longiores, crassae, satis pilosae, articulis secundo tertioque subaequalibus, quarto parvo globoso, 5—10 fortiter transversis, crassis, longitudine duplo crassioribus, ultimo praecedentibus ambobus longiore, sat magno, subovato, apice acuminato. Caput thorace angustius, nigrum, nitidum. parcus subtiliter punctulatum. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine duplo brevior, parum convexum, circiter marginatus, basi lateribusque fortius rotundatus, antrorsum angustatus, angulis omnibus obtusis, anterioribus subdeflexis, confertim subtiliter punctatus. Elytra thoracis fere longitudine, fortiter sat dense punctata, sparsim griseo-pubescentia. — Abdomen supra laeve, subplanum, subtus parcus punctatum et pilosum, segmentis marginibus apicalibus plicato-punctatis, marginibus lateralibus vase punctatis. Pedibus piceo-brunneis, geniculis tarsispue exceptis. — Fem. latet.

Myrmedonia strigosa pennis n. sp.

Brunnea, *nitida*, *dense nigro-pilosa*, *ore*, *antennis*, *humeris*, *abdominis segmentis tribus primis pedibusque testaceis*, *thorace transverso*, *brevi*, *convexo*. — Long. 3 mm, lat. 1 mm.

Statura fere *Myrmedoniae setigerae* Sh. Subdepressa, minus brevis, nitida. Antennae elongatae, capite thoraceque haud longiores, articulo secundo tertio paulo breviore, articulis 4—10 sensim paulo incrassatis, penultimis latitudine vix longiores, ultimo valde elongato, praecedentibus 3 longitudine summa fere aequali. — Caput thorace angustius, minus dense subtiliter punctatum, brunneum, oris partibus testaceis. — Thorax transversus, latitudine duplo fere brevior, lateribus rotundatus, immarginatus, angulis omnibus rotundatis, supra satis convexus, omnino confertim

subtiliter punctulatus. Elytra thorace paulo longiora, submetallico-nidita, subtilissime sat dense longitudinaliter strigoso-punctulata. — Abdomen breviusculum, late marginatum, lateribus leviter rotundatum, laevigatum, segmentis marginibus apicalibus valde pilosis. Pedes flavescenti-testacci tarsis posticis elongatis, tibiis longitudine fere aequalibus.

Megacronus mexicanus n. sp.

Ferrugineus, nitidus, capite piceo, antennis, ano pedibusque subflavis, illis sat longis, apicem versus paulo incrassatis. — Long. 3 mm.

M. regulari Sh. et *minori* Sh. affinis sed minor, antennae capitis thoracisque longitudine, articulo secundo tertioque aequalibus, sequentibus sensim paulo incrassatis, transversis, omnibus distinete pilosis. Caput minus oblongum, nigro-piceum, nitidum, ore rufo-testaceo. Thorax fere baseos coleopterorum latitudine, apice paulo angustior, basi apiceque fere rectis, lateribus vix rotundatis, angulis rotundatis, laevissimus, ferrugineus, marginatus, nitidus, disco antice posticeque bipunctato, basi medio leviter at distinete impressa. Scutellum nitidum, impunctatum. — Elytra thorace paulo longiora, minus dense subtiliter regulariter seriatim punctata, punctis subtilissime luteo-pilosus. — Abdomen minus dense et fortiter punctatum, apicem versus longius pubescens, ferrugineum, nitidum.

Acylophorus jalapanus n. sp.

Niger nitidus, partim parce griseo-pubescent, pedibus piceis, femoribus tarsisque testaceis, elytris sat dense fortiter profundiusque punctatis. — Long. $5\frac{1}{2}$ —6 mm, lat. 1 mm.

A. mexicanus Sh. subaequalis, niger, nitidus. Antennae capite thoraceque vix longiores, articulo secundo tertio duplo majore, 4—10 sensim crassioribus, penultimis duobus transversis, ultimo subgloboso, abrupte acuminato. — Caput rotundato-ovatum, puncto singulo utrinque inter oculos impressum, punctis verticalibus utrinque duobus positis, pone oculos subtilissime confertissimeque punctatum. — Thorax basis coleopterorum fere latitudine, apice tertia fere parte quam in basi angustior, lateribus subrectis, leviter rotundatus, basi cum angulis posterioribus curvatus, apice truncatus, angulis anterioribus deflexis, sat convexus, dorso ante medium et ante apicem punctis binis notatus, prope marginem lateralem anterius puncto utrinque singulo impressus. — Scutellum medio densius sat fortiter punctatum. Elytra thoracis fere longitudine, sat dense, fortiter profundiusque punctata, minus dense longius griseo-pubescentia. Abdomen sat dense subtiliusque punctatum, parcius griseo-pubescent. Pedes picei, femoribus medio late tarsisque testaceis.

Heterothops mexicanus n. sp.

Niger, nitidus, ore, antennarum basi, pedibus plus minusve, abdominis segmentis marginibus apicalibus infra anoque piceo-testaceis. — Long. 4 mm, lat. $\frac{3}{4}$ mm.

Niger, capite thoraceque politis. Antennae capitis thoracisque fere longitudine, articulo tertio secundoque subaequalibus, 4—10 sensim brevioribus, omnibus latitudine longioribus, ultimo oblongo, fuscato. Caput ovatum, thorace duplo fere angustius, fronte impunctatum, supra oculos punctis 3—4 et duobus transversim positis verticalibus impressum. Thorax coleopterorum latitudine, sat convexus, antrorsum leviter angustatus, angulis omnibus rotundatis, anterioribus deflexis, disco ante medium et apice bipunctatus, marginibus lateralibus medio unipunctatus. Scutellum laevigatum, indistincte disperse vage punctatum. Elytra thorace breviora, nigra vel piceo-brunnea, sparsim subtiliter tenuiterque punctulata, parcus pubescens. — Abdomen supra subtiliter, apicem versus disperse punctulatum, parcus pubescens, nigro-pilosum. Pedes piceo-testacei, femoribus plus minusve infuscatis.

Philonthus semicyaneus n. sp.

Niger, nitidus, pedibus abdominalis apiceque concoloribus, capite, thorace epipleurisque laete cyaneis, elytris cupreis, thoracis seriebus dorsalibus, 4-punctatis. — Long. 9 mm, lat 2 mm.

Antennae capite thoraceque paulo longiores, elongatae, nigrae, articulo tertio secundo sesqui fere longiore, 4—7 elongato-obconicis, 8—10 subaequalibus, brevi-obconicis, ultimo praecedente paulo longiore, ovato, apice truncato et inferne acuminato. Palpi piceo-nigri. Caput (σ^7) thoracis fere latitudine, rotundatum, utrinque supra oculos punctis pluribus, inter oculos punctis utrinque duobus transversim positis impressum. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine vix brevior, lateribus parallelis, antice leviter rotundatis, pone medium subsinuatis, basi leviter rotundatus, angulis anterioribus deflexis et rotundatis, posterioribus obtusis, leviter transversim convexus, seriebus dorsalibus 4-punctatis, punctis anticis ante marginem anteriorem positis, lateribus punctis utrinque 4 praeter marginales impressis, punctis omnibus minus subtilibus. Scutellum nigrum, subtiliter parce punctulatum nigro-pubescentia. Elytra thorace paulo longiora, sat dense et fortiter punctata, nigro-pubescentia, disperse nigro-pilosa. Abdomen nigrum, supra dense minus subtiliter, apicem versus aequaliter punctatum, nigro-pubescentia. Pedes nigris, coxis omnibus concoloribus, tibiis spinulosis.

Mas: tarsi antici valde dilatati, abdominis segmentum inferius sextum apice sat profunde triangulariter excisum. Femina latet.

Philonthus laeviventris n. sp.

Niger, nitidus, antennis pedibusque piceis; thorax seriebus dorsalibus 4-punctatus, abdomen laevigatum et dispersissime piloso-punctatum. — Long. 7 mm, lat. $1\frac{3}{4}$ mm.

Antennae capite thoraceque breviores, subgraciles, articulo tertio secundo perparum longiore, 4—10 sensim paulo brevioribus, minus crassi, prioribus subcylindricis, penultimis vix transversis, ultimo ovato, apice oblique truncato et inferne acuminato, piceae. Caput thorace paulo angustius, rotundatum, inter oculos punctis 4 transversim positis impressum, pone oculos parce punctatum. Thorax basi coleopteris latitudine fere aequalis, antrosum subangustatus, latitudine paulo brevior, basi cum angulis posterioribus subrotundatis, lateribus leviter rotundatis, angulis anterioribus deflexis rotundatisque, leviter convexus, seriatis dorsalibus punctis 4 impressis, antico paulo magis extrorsum sito, lateribus punctis praeter marginalia, apicalibus exceptis, 5 impressis. — Scutellum parce piloso-punctatum. — Elytra thoracis fere longitudine, minus subtiliter sat dense punctata, nigro-pubescentia. — Abdomen laevigatum, subversicoloreum, parcissime piloso-punctatum, punctis segmentorum apicalibus crebrioribus. Pedes picei, coxis concoloribus, geniculis tarsisque rufo-piceis.

Philonthus discedens n. sp.

Niger, subnitidus, capite thoraceque nitidis ore pedibusque piceis, capite ovato, thoracis seriebus dorsalibus 4-punctatis. — Long. 6 mm, lat. fere $1\frac{1}{4}$ mm.

Statura fere *Philonthi nigritae* Gravh., antennis et thoracis punctis dorsalibus exceptis. Antennae capitinis thoracique fere longitudine, articulo secundo tertioque subaequalibus, 4—10 sensim paululum brevioribus et crassioribus, penultimis latitudine vix brevioribus, ultimo ovato, apice oblique truncato et inferne subacuminato, nigrae. Palpi picei. Caput ovatum, thorace angustius, utrinque punctis supra oculos parcis dispersis, inter oculos binis transversim positis impressum. Thorax coleopteris parum angustior, latitudine baseos vix longior, apicem versus leviter angustatus, lateribus leviter rotundatis, basi cum angulis posterioribus rotundatus, angulis anterioribus deflexis rotundatisque, modice convexus seriebus dorsalibus punctis 4, apicali remotore, compositis, lateribus punctis utrinque 5 impressus, punctis omnibus fere subtilibus. — Scutellum subtilius punctulatum. Elytra thorace

paulo longiora, confertim et subtiliter punctata, griseo-pubescentia. — Abdomen crebrius subtiliter punctulatum, longius griseo-pubescentia. Pedes picei, plus minusve infuscati, tibiis omnibus leviter spinulosis.

Philonthus vagepunctatus n. sp.

Piceus, nitidus, ore, antennarum basi pedibusque piceo-testaceis, elytris piceo-brunneis, humeris marginibusque parum flavo-translucentibus. — Long. 6 mm, lat. elytr. fere $1\frac{1}{4}$ mm.

Antennae capitis thoracisque longitudine fere aequales, articulo tertio secundo vix longiore, 4—10 sensim paulo brevioribus at vix latioribus, penultimis latitudine vix longioribus, ultimo ovato, minus elongato, apice oblique emarginato et inferne acuminato, piceo-nigrae. — Caput thoracis fere latitudine, subquadratum, basi haud constrictum, supra oculos utrinque punctis duobus sub-approximatis impressum. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine longior, lateribus rectis, basi cum angulis posterioribus subrotundatus, angulis anterioribus deflexis et rotundatis, modice transversim convexus, seriebus dorsalibus punctis 6, lateribus punctis praeter marginalia utrinque 5 impressus, punctis omnibus subtilibus. — Scutellum subtilissime vage punctatum. — Elytra thoracis fere longitudine, minus dense subtiliter vage-punctata, parcissime griseo-pubescentia, nitida. — Abdomen parcius subtiliter punctulatum, medio longitudinaliter sublaevigatum, utrinque longius et paulo densius subtiliter griseo-pubescentia, lateribus apiceque nigro-pilosellum, segmento ventrali ultimo apice rufo-testaceo. Pedes piceo-testacei, coxis tibiisque obscuris.

Philonthus speculicollis n. sp.

Niger, nitidus, capite, thorace elytrisque aeneis, palpis pedibusque piceis, femoribus anterioribus et intermediis subflavis, abdominis segmentis ultimis infra piceo-marginalis. — Long. $5\frac{1}{2}$ mm.

Ph. sordido Gravh. assimilis. Elongatus, capite thoraceque nitidissimis. — Antennae capitis thoracisque fere longitudine, apicem versus parum incrassatae, articulo tertio basi angustato, secundo subaequali, 4—10 sensim paululum brevioribus, penultimis paulo transversis, ultimo oblongo, apice exciso et acuminato, nigro-piceae, articulis primis concoloribus. Caput rotundatum, thoracis fere latitudine, supra oculos punctis utrinque parcissimis, inter oculos punctis 4 transversim positis, intermediis magis distantibus, impressum. Thorax coleopteris angustior, latitudine baseos brevior, lateribus rectis, basi cum angulis posterioribus rotundatus, angulis anterioribus deflexis rotundatisque, modice convexus, seriebus dorsalibus punctis 6, apicali ante marginem

sat remoto, lateribus punctis praeter marginales utrinque 5 impressis, punctis omnibus subtilioribus. — Scutellum piceo-nigrum, subtiliter punctulatum, tenuiter pubescens. — Elytra thorace vix longiora, minus dense sat fortiter punctata, parce griseo-pubescentia metallico-virescentia, nitidula. Abdomen nigrum, parcissime subtiliter vage punctatum, minus dense griseo-pubescentia, subitus segmentorum marginibus obscure ferrugineis. Pedes picei, coxis omnibus concoloribus, femoribus anterioribus intermediisque subflavis.

Philonthus crinitus n. sp.

Niger, subnitidus, ore, antennarum basi pedibusque piceo-testaceis, thoracis seriebus dorsalibus 6-punctatis, abdominis segmentis ventralibus obscure rufo-marginatis. — Long 5— $5\frac{1}{2}$ mm, lat. fere 1 mm.

Statura omnino *Ph. micantis* Grv. at paulo minor, antennarum articulis crassioribus, niger, capite thoraceque niditis. Antennae capite thoraceque paulo breviores, articulo tertio secundo paululum longiore, 4—10 sensim paulo bevieribus, mediis crassioribus, penultimis leviter transversis, ultimo oblongo, apice abrupte truncato et inferne obsolete acuminato, nigrae, basi piceae. — Caput thorace paulo angustius, rotundatum, supra oculos utrinque punctis nonnullis dispersis, inter oculos utrinque duobus transversini positis impressum. — Thorax basi coleopteris paulo angustior, latitudine paulo longior, lateribus fere rectis, basi leviter rotundatus, angulis omnibus rotundatis, anterioribus deflexis, leviter convexus, seriebus dorsalibus punctis 6, primo remotiore lateribus punctis utrinque 5 impressus, punctis omnibus minus subtilibus. — Scutellum nigrum, subtilissime confertim punctatum. Elytra thoracis fere longitudine, subtiliter confertim punctata, sat dense longeque griseo-pubescentia. — Abdomen confertim subtiliter punctatum, griseo-pubescentia. — Pedes piceo-testacei, coxis concoloribus, tibiis tarsisque infuscatis, tibiis omnibus sat fortiter spinulosis.

Philonthus proportionalis n. sp.

Niger, subnitidus, ore, antennarum basi pedibusque piceo-rufis, thorax seriebus dorsalibus irregulariter 6—8 punctatis, tarsis breviusculis, articulo primo ultimo fere breviore. — Long. $5\frac{1}{2}$ —6 mm, lat. 1 mm.

Antennae capite thoraceque paulo breviores, articulo tertio secundo sesqui longiore, 4—10 inter se subaequalibus, penultimis parum transversis, ultimo ovato, apice truncato et inferne subacuminato, piceae. Palpi piceo-rufi. Caput orbiculatum subquadratum, thoracis latitudine, lateribus et vertice parce punctatum. Thorax coleopteris paulo angustior, latitudine sat longior, paral-

lelus, lateribus fere rectis, pone medium subsinuatus, angulis omnibus rotundatis, anterioribus deflexis, leviter convexus, seriebus dorsalibus irregularibus punctis 6—8, lateribus praeter marginales utrinque punctis 5, anterioribus approximatis impressus, punctis omnibus subtilibus. — Scutellum creberrime punctulatum, nigropubescentia. Elytra thoracis fere longitudine, dense et subtiliter punctata, minus dense griseo-pubescentia. — Abdomen subtilissime et densissime punctulatum, parce nigro-pubescentia, apice piceum, segmento 8° supra sublaevigato. — Pedes piceo-rufi, coxis posterioribus obscuri, tibiis omnibus sat fortiter spinulosi.

Paederomimus cupreonitens n. sp.

Elongatus, gracilis, capite, thorace elytrisque cupreο-nitentibus, antennarum articulis ultimis 3 albidis, humeris rufo-brunneis, articulis femoribus tibialisque medio late pallide flavis. — Long. $6\frac{1}{2}$ —7 mm, lat. $1\frac{1}{4}$ mm.

Caput subquadrato-rotundatum supra oculos sat fortiter profundeque punctatum, punctis inter oculos 4, fronte laevi in anteriore parte leviter impressa. — Antennae elongatae, piceae, articulo secundo basi pallide rufo, 8° obscure testaceo, sequentibus albidis, capiti thoracique fere longitudine aequales, articulo tertio secundo longiore, 4—7 sensim paulo brevioribus et crassioribus, 8—10 aequalibus, leviter transversis, ultimo rotundato, truncato, subtus acuminato. — Palpi sat elongati, picei. — Thorax coleopteris angustior, convexus, latitudine paulo brevior, basin versus angustatus, angulis omnibus rotundatis, undique marginatus, utrinque fortiter profundeque grosse punctatus, seriebus dorsalibus punctis 8—10 irregularibus, lateribus punctis praeter marginalia distantes utrinque circa 12 impressus. — Scutellum crebre densiusque punctatum. — Elytra thoracis fere longitudine, sat dense fortiter profundiusque, apicem versus vase punctata, sparsim griseo-pubescentia, epipleura antice densius, postice sparsim vase punctata. — Abdomen nigro-piceum, sparsim griseo-pubescentia, nigro-pilosum, segmento 7° apice supra et infra testaceo marginato, segmentis 3 primis supra basi impressis, subtiliter parce punctatis, segmento 6° 7°-que basi confertim strigoso-punctatis. — Pedes per partes pallide flavi.

Mas: tibiis posticis apicem versus clavato-incrassatis.

Paederomimus nigrocyaneus n. sp.

Elongatus, gracilis, niger, nitidissimus, nigro-pilosus, capite thoraceque nigro-cyanis, seriebus dorsalibus punctis 7; elytris sat dense fortiter profundeque punctatis, abdominis segmentis apicalibus concoloribus. — Long. 8 mm, lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Caput rotundatum, thoracis fere latitudine, fronte antice

canaliculato-impresso, punctis inter oculos quatuor transversim positis, duobus utrinque approximatis, supra oculos punctis non-nullis dispersis impressum. Palpi maxillares valde elongati, articulo ultimo angustato, penultimos duplo fere longiore. — Antennae capite prothoraceque paulo longiores, articulo tertio secundo paulo longiore, 4—10 elongatis, sensim paulo brevioribus, penultimis latitudine breviores, ultimo ovato, apice triuncato et inferne acuminato, nigro-piceae, articulo ultimo penultimoque obscure rufo-piceis. — Thorax coleopteris dimidio fere angustior, latitudine sat longior, basin versus angustatus, angulis omnibus rotundatis, anterioribus deflexis, convexus, seriebus dorsalibus punctis 7, punctis lateralibus hic illis in lineas compositis, punctis omnibus sat profundis. — Scutellum crebre punctatum. — Elytra thoracis fere longitudine, densius sat profunde punctata, disperse pilosa, longius nigro-pubescentia. — Abdomen antice supra disperse subtiliusque, apicem versus (segm. 6° 7°-que) dense punctatum. — Pedes sat elongati, piceo-brunnei, postici obscuri.

Holisus planus n. sp.

Depressus, fere *planus*, *niger*, *nitidus*, *lateribus parce pilosellus*, *mandibulis*, *geniculis tarsisque rufo-piceis*. — Long. 6 mm, lat. 1 mm.

Caput sat magnum, quadratum, sat fortiter et profunde minus dense punctatum, fronte medio laevi. — Antennae capite paulo longiores, articulo secundo tertioque subaequalibus, 4 rotundato, 5—10 sat crassis, ultimo ovato, apice tenuiter exciso, nigro-piceae, basi vix dilutiores. — Thorax subquadratus, rotundatus, basin versus paulo angustatus, angulis omnibus rotundatis, utrinque subtiliter minus dense punctatus. — Elytra thorace sesqui longiora, plana, dense subtiliter et aequaliter punctata, tenuiter griseo-pubescentia. — Abdominis segmentis anterioribus supra sat crebre minus subtiliter, posterioribus minus dense punctatis, segmento 8° punctis raris piligeris.

Scopaeus curtipeennis n. sp.

Nigro-piceus, *subopacus*, *capite abdome que confertissime punctatis*, *antennis*, *pedibus quoque piceo-brunneis*, *antemarum articulis 5 ultimis tarsisque testaceis*. — Long. 3 mm, lat. fere $\frac{1}{2}$ mm.

Scop. piceo Sh. et *brevipenni* Sh. affinis, elongatus, linearis, nigro-piceus, subnitidus. Antennae capite plus sesqui longiores, articulo primo sat longiore et crassiore, tertio quam secundo breviore, sequentibus subaequalibus, penultimis paulo crassioribus, ultimo parum elongato, apice subacuminato, piceae, ab articulo 7° testaceae. — Os piceo-brunneum. Caput thoracis fere latitudine, oblongum, antice angustatum, basi truncatum, angulis

posterioribus rotundatis, leviter convexum, confertissime subtiliter punctatum, clypeus apice laevigatus. Thorax coleopteris parum angustior, latitudine paulo longior, basin versus leviter angustatus, apice attenuatus, angulis anterioribus obtusis, posterioribus rotundatis, convexus, nitidus, toto dense subtilissimeque laxe punctatus. — Elytra thorace tertia parte breviora, dense subtiliterque vage subrugulose punctata. — Abdomen sub-ampliatum, postice dilatatum, supra confertissime subtilissimeque punctatum, tenuiter griseo-pubescentes, segmento septimo sexto plus sesqui longiore. Pedes picei tarsis testaceis.

Metoponcus lineatus n. sp.

Angustatus, elongatus, nigro-piceus, nitidus, fere laevigatus, ore, antennis, pedibus quoque, abdomine infra, segmentis supra marginibus testaceo-rufis; prothorace seriebus dorsalibus subtiliter 5-punctatis. — Long. 5 mm, lat. fere $\frac{1}{2}$ mm.

Antennae breviores, capitis fere longitudine, articulo tertio secundo breviore et angustiore, 5—10 transversis, penultimis tribus subaequalibus, latitudine dimidio brevioribus, ultimo oblongo, apice rotundato subacuminato, praecedentibus binis paulo longiore, testaceo-rufae, sat dense tenuiter pilosae. — Caput thorace paulo latius, subtus planum, laeve, angulis posterioribus rotundatis, lateribus rectis, latitudine paulo longius, sat depresso, clypeus utrinque unipunctatus, sulculis inter oculos postice convergentibus, supra oculum utrumque lineola longitudinali ornatum, lateribus solum punctis nonnullis vage impressis. — Thorax antice coleopteris vix angustior, latitudine duplo longior, basin versus leviter angustatus, seriebus dorsalibus subtiliter 5-punctatis, anticis ante marginem apicalem positis, lateribus punctis praeter marginales utrinque 3 longitudinaliter impressis. — Elytra thorace paulo breviora, laevia, nigro-picea, disperse indistincte vage punctata, fere glabra. — Abdomen parallelum, laevigatum, parcissime testaceo-pilosellum, segmento 7° valde elongato 6° plus duplo longiore, ab medio testaceo-rubo. — Pedes testacei.

Stenus (s. g. Nestus) auropubescens n. sp.

Niger, parum nitidus, capite abdomineque auro-pubescentibus, palpis testaceis, articulo tertio obscuro, pedibus ferrugineis, fronte planiuscula, tenuiter bisulcata, elytris convexis, thoracis fere longitudine. — Long. $2\frac{1}{2}$ mm, lat. elytr. vix $\frac{3}{4}$ mm.

Minutus, convexiusculus, niger, fere opacus. — Antennae breviores, articulis duobus primis dilutioribus, articulo tertio quarto parum longiore, piceae, apice obscurae. — Caput thorace latius, creberrime punctulatum, auropubescentes, fronte planiuscula,

late et parum profunde bisulcata. Thorax coleopteris dimidio fere angustior, lateribus leviter rotundatus, postice tenuiter angustatus, subcordatus, latitudine paulo longior, convexus, confertissime profundeque punctatus, interstitiis sat fortiter rugulosus, medio linea longitudinali ab tertia parte apicem versus laevigata. — Elytra thorace paulo longiora at duplo fere latiora, lateribus leviter rotundata, creberrime et profunde punctata, interstutiis rugulosis. Abdomen elongatum, apicem versus sensim attenuatum, tenuissime marginatum, auro- vel albido-pubescentis, dorso convexum, minus subtiliter crebre punctatum, segmentis singulis basi impressis et subtiliter tricarinatis. — Pedes ferruginei, geniculis parum picecentibus, tarsis abbreviatis.

Remarques synonymiques sur quelques espèces de Coprides. (Col.)

Par Prof. Dr. Joseph-J.-E. Gillet, Nivelles.

Au cours de la présente note je relève les critiques adressées par M. C. Felsche (Deutsch. Ent. Zeitschr. 1908, pp. 271—274) à deux de mes travaux précédents; tout en ne partageant pas la manière de voir de mon honorable contradicteur, je tiens cependant à le remercier de l'occasion qu'il me procure d'examiner de plus près les points en litige.

Pour éviter toute confusion, je ferai d'abord remarquer que le *Copris lunoides* Blanchard in litt., dont il est question ici, est l'espèce d'Abyssinie dont parle Harold in Coleopt. Hefte, V, p. 61. Les exemplaires rapportés par Wilhelm Schimpfér sont conservés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (Collection du Jardin des Plantes) et j'en possède deux individus (σ° φ) qui m'ont été généreusement cédés par cette importante institution. J'ajouterais que j'ai sous les yeux les types des espèces citées, de Boheman (Naturhistoriska Riksmuseum de Stockholm), de Wallengren (Museum de Malmö, Suède), de Roth (Staats-sammlung de Munich) et de Gerstaecker (Naturhistorisches Museum de Hambourg).

I.

La description et les figures de *Copris corniger* Sahlberg (1823, Peric. Entomogr., p. 6, pl. 1, figg. 2, 3)¹⁾ ont été reproduites

¹⁾ Periculi entomographici, Species Insectorum nundum descriptas proposituri, fasciulus. Auctore Car.-Regin. Sahlberg Hist. Natur.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [1909](#)

Autor(en)/Author(s): Schubert K.

Artikel/Article: [Neue mexikanische Staphyliniden. \(Col.\) 287-297](#)