

tuberculato; elytris ovalibus, conjunctim obtuse productis, punctato-striatis (punctis striarum minutis aequaliter dispositis et subcontiguis), interstitiis coriaceis, abdomine depresso pedibusque extus lanuginosis ♂.

Long. (rost. excl.) 7 mm; lat. $4\frac{1}{2}$ mm.

Hispania: entre Arvas et Pajares. Asturias.

In derselben Lokalität sammelten 1868 ich und mein lieber schon lange verstorbener Reisegefährte Piochard de la Brûlerie; 1872 und 1873, auf meine Anregung Getschmann, von dem auch die Chevrolat'schen Stücke stammen dürften, denn letzterer beschreibt ebenda noch andere von Getschmann gefundene Arten, fast alle von Pajares.

Die O. Schneiderschen Varietäten des *Otiorrhynchus alutaceus* Germar. (Col.)

Von Prof. Dr. L. v. Heyden, Bockenheim.

Durch die Firma Staudinger und Bang-Haas erhielt ich zwei typische Stücke der von Oskar Schneider in Entomol. Nachrichten 1896 p. 321 beschriebenen Varietäten *rufofemoratus* und *Kummeri* des *alutaceus* Germ. In der Beschreibung des *rufofemoratus* sagt Schneider: „Augenscheinlich ist demnach meine No. 2 (*rufof.*) mit Gyllenhal's *punctatissimus* identisch.“ In der Tat ist es so. Ich besitze ein Stück *punctatissimus* Ziegler Dalmatia aus der alten Ziegler'schen Sammlung. 8 mm lang, das genau die roten Schenkel mit schwarzen Knien des *rufofemoratus* besitzt. Gyllenhal beschreibt in Schönherr Gen. Spec. Curcul. II. 2. 1834 579 den *punctatissimus* Ziegl. genau wie auch Schneider für die Farbe der Schenkel angibt.

Demnach ist *rufofemoratus* = *punctatissimus*. Stücke mit ganz roten Schenkeln und Knien bilden die ab. *Kummeri* Schneider.

Stierlin, Revis. Europ. Otiorrh. 1861 p. 97 führt noch ein Exemplar meiner Sammlung als var. ♂ aus Dalmatien aus der Ziegler'schen Sammlung an, das 9 deutlich vertiefte Streifen mit etwas gewölbten Zwischenräumen zeigt. Die Beine sind typisch schwarz. Länge von Rüsselspitze bis Deckenende 13 mm.

Da eine Deckenstreifung bei *alutaceus* fast nicht erwähnt wird, nenne ich diese Form var. *parcestriatus* Heyden.
