

little more than the outer margin of each eye can be seen when viewed directly from above. These characters readily distinguish the species from all others known to me.

A specimen from Victoria in the collection of the Society, and one from Illawarra in my own, differ in having the clothing of the upper surface mostly of a sooty brown; with the scutellum, and patches of variable size on the elytra; white or greyish.

Zwei neue Coleopteren-Varietäten.

Von **Heinr. Löden**, Kiel.

Rhynchaeus rufus Schrank. var. *unicolor* n.

ist nach 2 mir vorliegenden, in Mittel-Italien gesammelten Stücken unzweifelhaft eine Varietät des, wie es scheint, sonst nur im mittleren und nördlichen Europa vorkommenden *Rhynchaeus rufus*. Während bei dieser bekannten Art die Unterseite größtenteils schwarz ist, finde ich sie bei der hier erwähnten Varietät ganz rot. Dabei handelt es sich, wie die völlig ausgebildete Skulptur der Oberseite und die satte, rötliche Färbung zeigen, durchaus um ganz ausgefärbte Stücke. Ich darf daher mit Recht annehmen, in dieser var. *unicolor* eine südliche Form des *Rhynchaeus rufus* vor mir zu haben.

Gymnetron tetrum var. *rufescens* n.

aus Mittel-Italien ist ebenfalls eine südliche Form, bei welcher sich die rote Farbe der Flügeldecken so sehr ausbreitet, daß nur ein schwarzer Dreiecksfleck an der Basis bleibt. Diese Varietät würde sich also an var. *plagiellum* anreihen, deren Decken eine rostrote Spitze bzw. hier je eine rote Makel haben.
