

Die Männchen von *Neoeryma stygium* D. T., *Hemiteles pulchellus* Gr., *Lissonota atropos* Schmiedkn. (Hym.)

Von Clemens Gehrs, Hannover.

1. Die ♀ von *Neoeryma stygium* D. T. waren mir schon lange vom Oberharz bekannt, aber da ich nur im Juli dort sein konnte, hatte ich die ♂ nicht mehr angetroffen. Bei Nauheim fand ich die ♂ anfangs Juni sehr häufig an jungen Fichten am Wege zum Eichwald, während Ende Juni die ♀ häufig waren und die ♂ verschwanden. Die ♂ sind den ♀ ziemlich gleich, nur zierlicher. Die Mandibeln sind, mit Ausnahme der gleichen braunen Zähne, hellgelb, wie das ganze Gesicht und der innere Augenrand bis zur schwachen Ausrandung des Auges. Die beiden kurzen gelben Linien am hinteren Augenrand finden sich auch beim ♀. Die gelbe Gesichtsfarbe wird oft von einem schwarzen Streifen durchzogen, der sich vom Grund der Antennen bis zum Clypeusrand ausdehnt oder durch einen schwarzen Punkt angedeutet wird. An den Beinen der ♂ sind die vorderen Hüften, Trochanteren und Trochantellen weiß, während die hintersten an der Oberseite verdunkelt sind.

2. Das ♂ von *Hemiteles pulchellus* Gr. ist dem weiblichen gleichgefärbt. Bei beiden Geschlechtern breitet sich die rote Farbe mehr oder weniger aus, doch fehlt bei dem ♂ die rote Farbe auf dem Hinterleibe nicht selten gänzlich. Auf den Flügeln des ♂ fehlen die beiden dunkeln Binden meist gänzlich. Man zieht beide Geschlechter leicht aus *Microgaster*-Puppen, welche auf Wiesen neben Kohlfeldern häufig im Herbst an Grashalmen hängen.

3. Das ♂ von *Lissonota atropos* Schmiedkn. ist Schmiedeknecht nicht bekannt und das ♀ kennt er nur aus dem National-Museum in Ungarn. Herr Lehrer Wilhelm Peets hieselbst fand ♂ und ♀ dieser Art am 10. IV. 09 und 15. VII. 06 in der Nähe von Hülsen an der untern Aller vor den Brutlöchern von *Cicindela hybrida* und einer großen Erdspinne. Das ♂ ist dem ♀ sehr ähnlich, nur etwas schwächtiger. Auffallend ist die viel stärkere Behaarung des Kopfes, dessen Clypeus schmutzig weiß ist, wie beim ♀. Beide Geschlechter tragen einen kleinen hellen Augenpunkt auf dem Scheitel. Der ganze Körper erscheint mattschwarz mit Ausnahme des großen polierten Speculums. Auf dem Metathorax des ♂ ist die hintere Querleiste in der Mitte deutlich, an den Seiten erloschen. Das erste bis dritte Hinterleibssegment ist länger als breit, das vierte quadratisch, fünftes bis siebentes ist breiter als lang. Die Hinterränder der Segmente sind vom zweiten an rotgelb. Die Beine des ♂ sind etwas heller als die des ♀, die vorderen Hüften sind schwarz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [1910](#)

Autor(en)/Author(s): Gehrs Clemens

Artikel/Article: [Die Männchen von *Neoeryma stygium* D. T., *Hemiteles pulchellus* Gr., *Lissonota atropos* Schmiedkn. \(Hym.\) 370](#)