

# Die paläarktischen Arten der Dipteren- (*Nematocera polyneura*-) Gattung *Pachyrhina* Macq. (Dipt.)

Suit. à Buff. (1834.)

Von M. P. Riedel, Ürdingen (Niederrhein).

Mit 4 Figuren im Text.

Die Gattung *Pachyrhina* wurde von Macquart (1834)<sup>1)</sup> auf diejenigen gelben, schwarz gezeichneten, eine ungestielte oder doch nur kurz gestielte zweite Hinterrandszelle aufweisenden *Tipula*-Arten gegründet, die, wie folgt, gekennzeichnet werden: le prolongement de la tête est plus épais, moins allongé, et un peu arrondi en dessus, et le premier article des antennes est plus court et un peu conique. Bei vielen echten Tipuliden finden sich jedoch diese Merkmale mehr oder weniger wieder<sup>2)</sup>, so daß ein hierauf allein gebildeter Gattungsbegriff sich schwer aufrecht erhalten ließe. Erst infolge der Entdeckung Huguenins (1888)<sup>3)</sup>: „*Pachyrhina* von *Tipula* unterschieden durch den Ursprung der II Längsader aus I; dieser Punkt liegt fast genau da, wo der Vorderast von I in den Hauptast von I zurückmündet, während bei dem genannten Genus zwischen den 2 Punkten eine große Distanz liegt“, wurde ein konstanter Charakter bekannt, auf Grund dessen ein Herausheben der Pachyrhinen aus der Gattung *Tipula* gerechtfertigt ist.

An der Macquartschen Schreibweise des Namens *Pachyrhina*, „qui exprime l'épaisseur du museau“, mit einem „r“, was sich auch nach grammatikalischen Grundsätzen und im Hinblick auf ähnliche Bildungen bei altgriechischen Schriftstellern rechtfertigen läßt, wäre festzuhalten.

Die Frage, ob die Gattung *Nephrotoma* Meig. (1803) mit der einzigen nicht zu verkennenden paläarktischen Art *dorsalis* Fabr. als berechtigt anzusehen oder, wie Loew und Osten-Sacken befürworten, zu *Pachyrhina* zu stellen ist, mag vorläufig offen bleiben<sup>4)</sup>.

Die Pachyrhinen fallen wegen ihrer lebhaften Färbung, gelb mit schwarzen oder schwarz mit gelben Streifen und Binden unter den paläarktischen Tipuliden auf. Wie öfter bei lebhaft ge-

<sup>1)</sup> Macquart, Hist. nat. d. Dipt. (Nouv. suit. à Buff.). Paris, I, 88 (1834).

<sup>2)</sup> Osten-Sacken, Studies on Tipulidae. Berl. Ent. Zeitsch. XXX. 1886. 184.

<sup>3)</sup> Huguenin, Fauna ins. Helv. Tip. Schaffhausen. 1888. — Bergroth, Ref. Wien. Ent. Zeitg. VIII. 1889. 213.

<sup>4)</sup> Bergroth, Österreich. Tipulid. Verh. zool.-bot. Ges. XXXVIII. 652 bei Besprechung d. Tip. glacialis Pok.

färbten Tieren finden sich auch bei den Pachyrhinen, besonders unter den ♀ der *scalaris-crocata-pratensis*-Gruppe Farbabänderungen, vorwiegend in südlicheren Gegenden. Ein Hinüberneigen zur Verdrängung der schwarzen Farbe zugunsten der helleren (gelben) Partien ist vorherrschend. Bei ♀ von *pratensis* L. aus Kleinasien, Spanien usw. breitet sich z. B. die bei typischen Exemplaren ausschließlich an den Hinterleibsseiten vorhandene gelbe Färbung in rotgelbem Tone über das ganze Abdomen derart aus, daß die schwarze Farbe in der Dorsalregion nur noch als mehr oder weniger breite Mittelstrieme und schmale Ränder an den Segment-einschnitten übrig bleibt. Derartige aberrierende Tiere, die bei genauerer Kenntnis der Konstanz ihres Vorkommen als Rasse angesehen werden könnten, bereiten bezüglich des Zurückführens auf die Stammform zum Teil erhebliche Schwierigkeiten; beschrieben sind bisher v. *luteata* (und *flavipalpis*) Meig., *croceiventris*, *semiflava* und *flavirostris* Strobl.

Bei den gelben Arten finden sich, mehr oder weniger ausgeprägt, folgende Zeichnungen: am Hinterkopf oberhalb des Hinterhauptloches der schwarze Occipitalfleck; dieser kann, wie ich mich bei meinem reichen Material überzeugt habe, wegen seiner Veränderlichkeit nur in den extremsten Bildungen mit Vorteil verwertet werden und verdient die Berücksichtigung, deren er sich bei Pachyrhinen-Beschreibungen zu erfreuen hatte, kaum; am Rostrum sind nicht selten die Oberseite oder die Seiten gebräunt; ein schwarzer Fleck nicht selten an den Seiten des Pronotum; auf dem Präscutum 3 schwarze Längsstriemen, deren seitliche durch ihre Bildung, ob gerade oder vorn herabgebogen, gute Bestimmungshilfen abgeben; 2 schwarze seitliche Streifen auf dem Scutum; Scutellum und Mesophragma zeigen eine dunkle Mittelstrieme. Die Pleuren<sup>1)</sup> sind ebenfalls schwarz gezeichnet; typisch sind folgende Flecke: auf den Mesopleuren ein gabelförmiger, mit der Öffnung nach oben; auf den Sternopleuren ein das Gelb ganz oder fast ganz verdrängender; auf den Pteropleuren, am Rande nach der Mesopleura hin, ein ausgebuchteter und auf den Hypopleuren ein kleiner Fleck am unteren Rande; schließlich sind die Metapleuren auf 3 Seiten schwarz umrandet, so daß nur der untere Rand frei bleibt. Coxae am Grunde schwärzlich oder deutlich schwarz gefleckt. Der Hinterleib zeigt eine schwarze Dorsallinie von oft eigenartiger, jedoch meist nur bei ganz ausgefärbten Exemplaren, scharfer Zeichnung, eine Mittellinie auf der Unterseite und je eine Seitenlinie. Das Hypopyg ist bei manchen

<sup>1)</sup> Osten-Sacken, An Essay of comp. Chaetotaxy. Transact. Ent. Soc. London. 1884. — Grünberg, Die blutsaug. Dipteren. Jena. 1907. 9.

Arten scharf schwarz abgesetzt, während den Hinterleib der ♀ vor den Cerci häufig ein schwarzes Bändchen ziert.

Kopf länglichrund, Hinterkopf stark entwickelt; Rostrum kurz und dick; Palpen viergliedrig, das letzte Glied geißelförmig verlängert; Fühler 13gliedrig; das erste Glied etwas verlängert, kegelförmig; das zweite kurz, napfförmig; das dritte lang, walzenförmig; die folgenden von verschiedener Gestaltung: zylindrisch, mit knopfigen Verdickungen, ausgebuchtet, gekerbt usw.; diese Bildungen verschwinden nach dem Ende hin und sind bei den ♀ kaum angedeutet; das letzte Glied ist sehr kurz; das erste ist wenig, das dritte reichlicher beborstet; vom vierten ab stehen an der Basis 3—5, meist 4, lange Wirtelhaare; außerdem zeigen die Fühler einiger Arten, z. B. *quadristriata* Schum., *Schummeli* m., eine deutliche und dichte Pubescenz. Eine eigentliche Beborstung fehlt den Pachyrhinen; längere, nach vorn gerichtete (schwarze) Haare trägt der Fortsatz des Rostrum; kurze (schwarze) finden sich am Hinterkopf, an den Augenrändern beginnend und sich unten nach der Mitte zu ausdehnend; längere (fahlgelbe, weißse) an den Hüften; auch der Hinterleib zeigt gewöhnlich eine hellere Pubescenz, die am Hypopyg zu längeren Haaren auswachsen und büschel- oder bürstenähnliche Formen annehmen kann.

Beine gewöhnlich; häufig verlängert, besonders die Tarsen der hintersten Beine.

Flügel meist etwas tingiert, von hellem Gelb bis recht intensivem Schwarz; zuweilen lebhaft irisierend; häufig mit schattenähnlichen Bräunungen; Pterostigma blaß oder dunkel. Radius 2 entspringt aus dem Punkte, wo sich die Subcosta mit R. 1 vereinigt; aus der Discoidalzelle 3 Adern ausstrahlend, M. 1 und M. 2 an der Basis genähert, vereinigt oder kurz gestielt. Schwinger mit großem Knopf.

Hinterleib des ♂ meist etwas seitlich zusammengedrückt, des ♀ breiter. Hypopyg verschieden gebildet<sup>1)</sup>, jedoch mit demjenigen von *Tipula* im wesentlichen übereinstimmend<sup>2)</sup>. Lam. term. sup. und inf. weisen mannigfache Veränderungen auf; nur geringe Umwandlungen hat die Lam. bas. sup., etwas mehr die Lam. bas. inf. erfahren. In der Mitte des äußeren Randes der letzteren ragt bei einigen Arten ein Anhang, Appendix basalis (simplex), in verschiedener Form hervor: bei *quadrifaria* Schum. in knopfförmiger, bei *maculata* Meig. und *lineata* Scop. in länglicher, bei *cornicina* in

<sup>1)</sup> Westhoff, Über d. Bau d. Hypopyg. d. Gatt. *Tipula*. Münster. 1882.

<sup>2)</sup> (*Pachyrhina*) — in the external structure of the hypopygium it most nearly resembles *Bittacomorpha* and *Ptychoptera*. Snodgrass, The Hypopygium of the Tipulidae. (Trans. Americ. Ent. Soc. XXX. 1904. p. 199.)

nagelförmiger Gestalt; bei *tenuipes* m. ist er dünn, gegen das Ende flach und etwas verbreitert und, wie bei *cornicina*, so lang, daß er mit dem Hinterleibsende abschneidet; bei *aculeata* Lw. stachel-förmig, lang abstehend usw. App. ext. sup. stehen meist in Form nach innen gebogener Hörnchen deutlich hervor, seltener die mehr blattartigen intermediae. Andere Organe wenig auffallend. Cerci und Styli sind von verschiedener Länge, erstere feinspitzig oder mit abgerundeter Spitze.

Über die ersten Stände von *Pachyrhina*, welche denen der Gattung *Tipula* gleichen, sind wir durch die Beobachtungen Belings (Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 1878 und XXXVI, 1886) unterrichtet. Angaben über ein schädliches Auftreten der Larven sind spärlich. Beling teilt nach Hartig einen Fall mit, in dem die Larven von *crocata* L. junge Tannenpflänzchen zum Absterben brachten. (Ormerod, Rep. of Injurious Ins., welcher nach dem Katalog Kertész mehrfach *maculata* Meig. erwähnt, ist mir nicht zugänglich gewesen.) Die Betätigung der meisten Pachyrhinen-Larven dürfte indifferent sein; vielleicht ist ihrer Humus produzierenden Tätigkeit noch eine bescheidene Nützlichkeit zuzusprechen.

Die Pachyrhinen haben eine weite, jedoch nicht gleichmäßige Verbreitung; in der ganzen paläarktischen Zone, von Nordafrika bis Sibirien, sind sie vom Frühjahr bis spät in den Herbst hinein, wenigstens durch gewisse Arten, in größerer oder geringerer Häufigkeit vertreten. Soweit mir bekannt geworden, greift nur das Verbreitungsgebiet von *lineata* Scop. auf Nordamerika über. Bergroth erwähnt sie W. E. Z. VII, 1888, 239 aus dem Kaskaden-Gebirge nördlich von Lytton (Britisch-Columbia) mit der Bemerkung, „diese Art hat keinen nahen Verwandten unter den amerikanischen Arten“. — Bemerkenswert ist das Fehlen oder seltene Vorkommen sonst häufiger Arten in manchen Gegenden. 1888 war, um ein Beispiel anzuführen, die in Deutschland nirgends fehlende *pratensis* L. in England noch nicht gefunden<sup>1)</sup>. Die ebenso häufige *cornicina* L. wird 1877 von v. d. Wulp für die Niederlande mit „Bij ons zeldzaam“ bezeichnet<sup>2)</sup>. Diese Angabe ist um so auffälliger, als *cornicina* hier am Niederrhein, dessen Fauna und Flora im allgemeinen mit der holländischen übereinstimmt, zu den häufigsten Pachyrhinen gehört; es steht mir für diese Erscheinung vorläufig keine, nicht einmal hypothetische Erklärung zu Gebote.

Zur vorliegenden Arbeit habe ich annähernd 1600 Pachyrhinen

<sup>1)</sup> Verrall, List of Brit. Tip. Ent. Month. Mag. XXV. 1888. 20.

<sup>2)</sup> v. d. Wulp, Dipt. Neerland. I. 1877. 380.

untersuchen können. Den Herren Bang-Haas, Becker, Heyne, Lichtwardt, Oldenberg, Schulze, Speiser und Strobl sage ich auch an dieser Stelle für ihre Unterstützung, teilweise auch für Überlassung von Material, meinen verbindlichsten Dank; ganz besonders verpflichtet bin ich jedoch der Liberalität des k. k. naturhist. Hofmuseums in Wien, der ich die Kenntnis der Typen bzw. Cotypen von Meigen (Winthem), Wiedemann, Schummel, Schiner und Mik verdanke.

Schließlich möchte ich nicht verfehlen, des Catalogus dipt. huc. descript. und des Katalogs d. paläarkt. Dipt. von Kertész als wertvoller und zuverlässiger Hilfsmittel zu erwähnen. Für die naturgetreue Ausführung der Zeichnungen habe ich meinem Freund, Herrn Alex. Reichert in Leipzig zu danken.

Material und Typen, soweit ich darüber verfügen konnte, habe ich dem Deutschen Entomol. National-Museum überwiesen.

Nur die mir durch Anschauung bekannt gewordenen Arten haben in den Bestimmungstabellen Berücksichtigung gefunden; diese sind für ♂ und ♀ getrennt aufgestellt und ausführlicher behandelt; es erübrigten sich hierdurch eingehende Detailbeschreibungen der häufigeren Arten, von denen gute und ausreichende Beschreibungen in leicht zugänglichen Werken eingesehen werden können.

#### Bestimmungstabelle der ♂.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Grundfarbe schwarz . . . . .  | 2.                    |
| Grundfarbe gelb . . . . .  | 6.                    |
| 2. Hinterleib ganz schwarz . . . . .   | <i>Nox</i> n. sp.     |
| Hinterleib nicht ganz schwarz . . . . .  | 3.                    |
| 3. Hinterleib nur an den Seiten gelb; Pleuren schwarz, gelb<br>gefleckt . . . . .  | <i>pratensis</i> L.   |
| Hinterleib mit durchgehenden, gelben Querbinden . . . . .  | 4.                    |
| 4. Querbinden rotgelb . . . . .  | <i>rossica</i> n. sp. |
| Querbinden safrangelb oder hellgelb . . . . .  | 5.                    |
| 5. Hinterleib mit 3, seltener mit 4 ungeteilten, safrangelben<br>Querbinden; Pleuren schwarz . . . . .   | <i>crocata</i> L.     |
| Hinterleib mit mehr als 4 gelben Querbinden; die schwarze<br>Farbe in der Dorsallinie meist etwas vorgezogen, wodurch<br>eine unterbrochene Rückenstrieme gebildet wird; Pleuren<br>gelb, schwarz gefleckt . . . . . | <i>scalaris</i> Meig. |
| 6. Flügel mit dunkelbraunem, sich scharf abhebendem Rand-<br>mal . . . . .   | 7.                    |
| Flügel mit hellem, gelbem, sich von der Flügelfärbung nicht<br>oder kaum abhebendem Randmal . . . . .  | 18.                   |

7. Seitenstriemen des Mesonotum gerade . . . . . 8.  
Seitenstriemen des Mesonotum vorn abwärts gebogen. 10.
8. Appendix basalis fehlend . . . . . 9.  
Appendix basalis vorhanden, lang und spitz. *aculeata* Lw.
9. Fühler von gewöhnlicher Länge und Dicke; vom vierten  
Glied ab deutlich, wenn auch nicht tief, ausgebuchtet.  
*lunulicornis* Schum.  
Fühler lang, dünn und zierlich; vom vierten Glied ab an  
beiden Enden nach unten knopfig verdickt, dazwischen  
eingedrückt (tief und lang ausgebuchtet).  
*Schummelii* n. sp.
10. Flügel und das ganze Tier auffallend bräunlichgelb; Vater-  
land: Sibirien . . . . . *fuscescens* n. sp.  
Flügel nicht auffallend bräunlichgelb; die Grundfarbe des  
Tieres hellgelb . . . . . 11.
11. Hintere Querader und das Endstück der fünften Längsader  
(Cubitus 2) bräunlich umsäumt; die 3—4 ersten Fühler-  
glieder gelb; App. bas. kurz knopfartig.  
*quadrifaria* Meig.  
Hintere Querader nicht umsäumt . . . . . 12.
12. App. bas. fehlend . . . . . 13.  
App. bas. vorhanden . . . . . 17.
13. Mittelstrieme bräunlich mit schwarzem, spitzem Kern.  
*terminalis* Wied.  
Mittelstrieme einfach schwarz . . . . . 14.
14. Lam. bas. inf. auffallend behaart . . . . . 15.  
Lam. bas. inf. nicht auffallend behaart . . . . . 16.
15. Lam. bas. inf. gleichmäÙsig zottig behaart; *quadrifaria*-ähn-  
liche Art . . . . . *analisis* Schum.  
Lam. bas. inf. an den gegenüberliegenden Rändern mit  
bürstenartig geordneten, rostgelben Haaren besetzt.  
*crinicauda* n. sp.
16. Größere *analisis*-ähnliche Art; obere Endlamelle abgerundet,  
ohne Zähne; lam. term. inf. am inneren Rand schneiden-  
förmig vorstehend . . . . . *lamellata* n. sp.  
Kleinere *cornicina*-ähnliche Art; obere Endlamelle mit 2  
stumpfen Zähnen; lam. term. inf. nicht vorstehend;  
Pleuren gelb, reichlich schwarz gefleckt.  
*questfalica* Westh.
17. App. bas. derb, am Ende kegelförmig verdickt, Pleuren  
ungefleckt, nur Pl. 3 nach den Schwingern zu mit schwarzer  
Makel . . . . . *cornicina* L.  
App. bas. dünn, wenig verdickt . . . . . *tenuipes* n. sp.

18. Seitenstriemen des Mesonotum vorn abwärts gebogen; kleinere Arten . . . . . 19.  
Seitenstriemen des Mesonotum gerade; gröfsere Arten. 20.
19. Der Höcker (Pleura 3, Metapleura) vor den Schwingern oben und an den Seiten schwarz umrahmt; Hinterleib mit deutlicher Pubescenz; Genitalien stark behaart; dunklere Art, mit mehr schwarzen Zeichnungen als die folgende.  
*maculata* Meig.  
Der Höcker nur an der nach den Schwingern zu gelegenen Seite mit schwarzem Längsfleck; Hinterleib und Genitalien fast nackt; hellere gelbe Art mit wenigen schwarzen Flecken . . . . . *lineata* Scop.
20. Fühler vom vierten Glied ab nur sanft ausgebuchtet, etwa wie bei *lunulicornis*; dunkelockergelbes Tier. *scurra* Meig.  
Fühler vom vierten Glied ab tief ausgekerbt, etwa wie bei der Gattung *Nephrotoma* Meig., Grundfarbe hellgelb.  
*quadristriata* Schum.

## Bestimmungstabelle der ♀.

1. Grundfarbe tiefschwarz; Hinterleib mit gelben Querbinden. 2.  
Grundfarbe schwarzblau; Hinterleib nur an den Seiten gelb; Pleuren schwarz, gelb gefleckt . . . . . *pratensis* L.  
Grundfarbe gelb; Hinterleib mit schwarzen (dunklen) Längsstreifen . . . . . 3.
2. Hinterleib auf der Mitte rotgelb; die letzten Segmente schwarz . . . . . *rossica* n. sp.  
Hinterleib durchaus lebhaft orange gelb mit scharfen, schwarzen, gleichschenkelig dreieckigen Rückenflecken.  
*euchroma* Mik.  
Hinterleib mit safrangelben Binden, meist 3, eine vierte durch gelbe Seitenflecke angedeutet. Thorax, besonders auch die Pleuren, schwarz, die gelbe Farbe fast verdrängt . . . . . *crocata* L.  
Hinterleib mit (hell-) gelben Binden, mindestens 6. Am Thorax die gelbe Farbe vorherrschend; die schwarzen Striemen des Mesonotum deutlich getrennt; Pleuren gelb, schwarz gefleckt . . . . . *scalaris* Meig.
3. Flügel mit dunkelbraunem, sich scharf abhebendem Randmal . . . . . 4.  
Flügel mit hellem, gelbem, sich von der Flügelfärbung nicht oder kaum abhebendem Randmal . . . . . 12.

4. Mittellinie des Mesonotum vorn gegabelt (4 Längslinien, die mittelsten hinten zusammengeflossen). *lucida* Schin.  
Mittellinie bräunlich mit schwarzem, spitzem Kern.  
*terminalis* Wied.  
Mittellinie einfach schwarz . . . . . 5.
5. Seitenstriemen des Mesonotum gerade . . . . . 11.  
Seitenstriemen des Mesonotum vorn weit abwärts gebogen . . . . . 6.  
Seitenstriemen des Mesonotum nur wenig abwärts gebogen, gleichmäfsig dick, schwach mondformig. Beine lang und dünn. Cerci feinspitzig . . . . . *tenuipes* n. sp.
6. Flügel und das ganze Tier auffallend bräunlichgelb; Vaterland: Sibirien . . . . . *fuscescens* n. sp.  
Flügel nicht auffallend bräunlichgelb; die Grundfarbe des Tieres hellgelb . . . . . 7.
7. Ende der Cerci abgerundet . . . . . 8.  
Ende der Cerci spitz . . . . . 10.
8. Fühler meist ganz gelb, mindestens aber die 3 ersten Glieder; hintere Querader und das Endstück der fünften Längsader bräunlich umsäumt; die schwarze Rückenlinie des Hinterleibs besteht aus dreieckigen Flecken, deren Spitzen nach vorn gerichtet sind . . . . . *quadrifaria* Meig.  
Nur die ersten beiden Fühlerglieder gelb; Adern nicht braun gesäumt . . . . . 9.
9. Die schwarze Rückenlinie des Abdomens am Hinterrand der einzelnen Ringe fufsförmig erweitert . . .  *analis* Schum.  
Die schwarze Rückenlinie des Abdomens besteht aus grofsen, trapezförmigen Flecken, welche die gelbe Farbe nur an den Ringeinschnitten übriglassen . . . *crinicauda* n. sp.
10. Die Dorsalstrieme des Hinterleibs entspringt breit; ihre Seitenränder fast parallelseitig, nur wenig gezähnt; Fühler braun, auch die beiden ersten Glieder gebräunt; Pleuren ungefleckt, nur Pl. 3 nach den Schwingern zu mit schwarzer Makel . . . . . *cornicina* L.  
Die Dorsalstrieme des Hinterleibs entspringt schmal, die schwarzen Zeichnungen auf den einzelnen Ringen (efeu-) blattförmig, die Spitze der Blattfigur nach dem Hinterleibsende gerichtet; die beiden ersten Fühlerglieder gelb, höchstens das zweite an der Basis gebräunt; Pleuren gelb, reichlich schwarz gefleckt . . . *gestfalica* Westh.
11. Das Ende der Cerci stumpf . . . . . *lunulicornis* Schum.  
Das Ende der Cerci spitz; unterhalb des vorderen Endes der Seitenstriemen des Mesonotums gewöhnlich ein bräunlicher Fleck oder Schatten . . . . . *aculeata* Lw.

12. Seitenstriemen des Mesonotums vorn abwärts gebogen; kleinere Arten . . . . . 13.  
 Seitenstriemen des Mesonotums vorn gerade; größere Arten . . . . . 14.
13. Der Höcker vor den Schwingern oben und an den Seiten schwarz umrahmt; Dorsalstrieme des Hinterleibs breit, fast zusammenhängend; dunklere Art. *maculata* Meig.  
 Der Höcker vor den Schwingern nur an der nach den Schwingern zu gelegenen Seite mit schwarzem Längsfleck; Rückenstrieme in Fleckchen aufgelöst; hellere, gelbe Art. *lineata* Scop.
14. Pterostigma ganz blafs; Hinterleib verlängert; Rückenstrieme meist dünn; dunkelockergelbes Tier . . . *scurra* Meig.  
 Pterostigma bräunlich; Hinterleib nicht verlängert; Rückenstrieme breit; gelbes Tier . . . *quadristriata* Schum.

*P. scalaris* Meig.

S. B., I. 195 (1818). — Syn. *imperialis* Meig. S. B. I. 196 (1818).  
*flavipalpis* Meig. ♀. S. B., VI. 290 (1830).

Die Art glänzt, besonders auch am Hinterleib, wie poliert und ist hierdurch und durch die immer viel Gelb zeigenden Pleuren von den Farbabänderungen der Verwandten, *crocata*, *pratensis* usw., noch am ehesten zu unterscheiden. Der Hinterleib des ♀ zeigt die charakteristische Zeichnung nur bei den Exemplaren, bei denen er seine runde, walzenförmige Gestalt während des Trocknens beibehalten hat; dieses trifft aber nur vereinzelt zu, gewöhnlich ist das Abdomen breit, wie plattgedrückt, die Zeichnung verschwommen, sie ähnelt dann auffallend derjenigen der ♀ von *pratensis*, bei denen die gelbe Färbung sich nicht selten über die ganze Oberseite des Hinterleibs verbreitet.

Meigen beschreibt als *flavipalpis* ein bei Stollberg im Rheinland gefangenes ♀ mit etwas von *scalaris* abweichender Färbung; schon v. d. Wulp „denkt“ an eine Varietät von *scalaris*, ich gehe noch einen Schritt weiter und stelle *flavipalpis* als Synonym zu *scalaris*<sup>1)</sup>.

*Scalaris* ist verbreitet, jedoch nicht überall vorkommend, im Süden häufiger, im Norden seltener; in Deutschland im August zerstreut und vereinzelt. Während sie Verrall (1888) als britische Art aufführt, fehlt sie in Wallengrens Verzeichnis „Skandinaviens Tipulidae“ (1882): auch Huguenin nennt sie sehr selten und weiß für die Schweiz nur einen Fundort (1888).

<sup>1)</sup> Vergl. Strobl, Die Dipteren v. Steiermark. Mitt. d. naturw. Ver. f. Steierm. 1894. 205.

v. *flavirostris* Strobl.

Span. Dipt. III. Verh. zool.-bot. Ges. 1909. 134. 1 ♀.

„Unterscheidet sich durch ganz gelbe Schnauze, viel kleinere, dunkle Flecke der Brustseiten und ganz schwarzes Schildchen.“

*P. castellana* Strobl.

Span. Dipt. Mem. Real. Soc. Española d. Hist. Natur. Madrid. 1905. 406.

„Differt ab imperiali Mg., rostro, antennis, palpis, scutello et segmento primo prorsus nigris. ♂ ♀.“

Ist nach der Beschreibung *scalaris* Meig. sehr ähnlich; unterscheidet sich „durch ganz schwarzen Rüssel, Fühler, Taster, Brustseiten, Schildchen und I Segment. Hinterleib am zweiten bis fünften Ringe orangegelb, mit mälsig breiten, schwarzen Endsäumen; die folgenden Ringe schwarz. Das kleine Hypopyg wieder gelb. Die Oberseite des Thorax und Mesothorax stimmt ganz mit *imperialis*. Flügel intensiv graugelb, sonst wie bei *imperialis*. Die Art steht jedenfalls zwischen *crocata* und *imperialis*.“

v. *croceiventris* Strobl. ♀.

„Mit ganz schwarzen Brustseiten, Hinterleib oberseits fast ganz safrangelb; die Mitte trägt eine in Längsflecke aufgelöste Strieme und die umgeschlagenen Seitenränder sind schwarz.“

*P. crocata* L.

Syst. Nat., Ed. X., 585 (1758).

Syn. *flavofasciata* Deg., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins. VI. 349 (1776).  
*perpulchra* Harr., Exp. Brit. Ins., 159 (1782).

Eine alt- und allbekannte Art von auffallender Färbung. Die ♀ waren in meinem Material viel zahlreicher als die ♂ vertreten. Im Spätsommer und Herbst, vereinzelt auch im Frühjahr, häufig auf Dolden; mit ihr zusammen ist meist auch *pratensis* L. zu treffen, welche diesen Aufenthaltsort im Gegensatz zu den meisten anderen, sich im Gebüsch und Grase herumtreibenden Arten, gleichfalls liebt.

v. *luteata* Meig. ♀.

S. B., I. 193 (1818) (als Art).

Wiedemann charakterisiert das Tier sehr treffend, wenn er schreibt: „Sie steht der *T. crocata* am nächsten, ja man möchte sagen, es sei diese selbst, die nur durch das wärmere Klima (Portugal) mehr Färbung erhalten hätte.“ In der Coll. Winthem befanden sich 3 ♀ aus Marseille mit dem Zettel „*luteata*“, anscheinend von Wiedemanns Hand; sie zeigen fünf gelbe Binden und auch der letzte Hinterleibsring und die Cerci sind von der-

selben Farbe; auch die Pleuren weisen mehr Gelb auf, wie gewöhnlich. Die immer vorherrschend schwarzen Sterno- und Hypopleuren und der schwarze erste Hinterleibsring werden diese Farbänderung als zu *crocata* gehörig erkennen lassen. Die Flügel zeigen das typische Bild. Im Süden (Spanien, Portugal, Korsika usw.) anscheinend häufig.

v. *semiflava* Strobl.

Span. Dipt. III., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1909. 134.

„Stimmt fast ganz mit der v. *luteata* Wied. in Mg., nur ist am Hinterleibe die orangefarbene Färbung stärker ausgedehnt.“

*P. verticalis* Beck.

Dipt. Ergebnisse. Zeitsch. f. system. Hym. u. Dipt. VII. 240.

„Ein ♀ aus Algier. Durch den ganz orangeroten Hinterkopf zu unterscheiden. Die Flügel haben auffallend und intensiv schwarze Adern mit angeräucherter Spitze. Länge des Körpers 16, der Flügel 13 mm.“

*P. rossica* n. sp.

Nigra, rufofasciata. Antennis subtus levissime sinuatis; thorace nigro, nigro-trivittato, vittis lateralibus late hamatis; alis flavescens cum pterostigmate nigropiceo insigni; abdomine nigro, segmentis mediis rufis; hypopygio compresso nigro. Long. corp. ♂ 11, ♀ 19, al. ♂ 11, ♀ 12,5 mm. 2 ♂ 1 ♀ Wiener Museum. Patria: Rossia.

Kopf rotgelb; Occipitalfleck schwarz, groß, die Spitze weit vorgezogen; Rostrum, Palpae — mit Ausnahme der ersten beiden dunkelbraunen Glieder —, Pronotum, Thorax — besonders auch die Pleuren —, Scutellum und Mesophragma schwarz.

Abdomen ♂: Erster Ring bis auf einen schmalen rotgelben Streifen — in den zweiten Ring übergehend — schwarz, zweiter ganz rotgelb, etwa von der Nuance wie bei dem ♀ von *Xiphura atrata* L., dritter Ring rot mit schwarzem Fleck am Ende, vierter desgleichen, am Ende — nach dem Hinterleibsende zu — bindenartig erweitert, die folgenden Segmente und das Hypopyg ganz schwarz. Bauchseite des zweiten und dritten Ringes ganz rot. An den Seiten des Hinterleibs eine scharfe, schwarze Linie. Beim ♀ ist, wie gewöhnlich bei den Arten dieser Gruppe, die gelbe Farbe etwas weniger von der schwarzen verdrängt. Auf dem Präscutum sind die 3 schwarzen Striemen — die seitlichen vorn breit herabgebogen — wenigstens bemerkbar, wenn auch undeutlich; Pronotum oben gelb; Schildchen und Mesophragma an den

Seiten bräunlich. Pleurae und Coxae wie beim ♂ ganz schwarz. Hypopyg geschlossen, schwarz. Die Ränder der Lam. bas. term. etwas schneidenförmig vorstehend, die Form erinnert an die Gestaltung bei *lamellata* m. App. sup. plump, wenig vorstehend und ebenso wie das Innere des Kopulationsapparates bräunlich.

Fühler: ♂, das erste Glied tiefschwarz, die folgenden dunkelbraun, fast schwarz, vom vierten Glied ab die Basis stark knopfig verdickt, unten kaum ausgeschnitten. Beim ♀ ist das zweite Glied ganz und das dritte bis über die Hälfte rotgelb.

Flügel gelblich mit starken, braunen Adern und scharfem Randmal. Schwinger schwarz mit hellerem Stiel. Beine gelb, nach den Gelenken hin dunkelbraun.

Die Art ist in die Nähe der *pratensis* L. zu stellen. Die ausgedehnte, rotgelbe Hinterleibsfärbung ist bei Pachyrhinen ungewöhnlich.

Die mir vorliegenden Exemplare trugen den Vermerk: *rossica* (in litt.) von Schiners Hand.

*P. euchroma* Mik.

Beitr. z. Dipteren-Fauna Österr. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1874. 353.)  
Syn. *aurantiaca* Mik. Beitr. z. Dipt.-Fauna d. österr. Küstenlandes (Verh. zool.-bot. Ges., Wien. 1866. 304).

2 ♀. Die Art fällt durch ihre intensiv orangegelbe Färbung, die nur in geringem Mafse von schwarzen Flecken unterbrochen wird, auf. Ein sicheres Urteil über die Stellung dieser interessanten Spezies unter den Pachyrhinen wird sich erst nach Bekanntwerden des ♂ fällen lassen. Im übrigen verweise ich auf die minutiöse Beschreibung von Mik.

*P. pratensis* L.

Syst. Nat., Ed. X., 586 (1758).

Syn. *variegata* Deg., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins. VI. 346 (1776).

Schiner nennt sie mit Recht die gemeinste Art von allen; fehlt bei Verrall und scheint nach Huguenin auch in der Schweiz nicht überall vorzukommen.

Beim ♀, besonders in südlichen Gegenden, breitet sich die sonst nur an den Hinterleibsseiten in geringer Ausdehnung vorhandene gelbe Färbung häufig über die ganze Oberseite des Abdomen aus. Kennzeichnend für die Art sind die meist ganz schwarzen Pleuren.

*P. Nox* n. sp.

*P. pratensi* L. proxima. Tota fere nigra; alis nigrotinctis, pedibus piceonigris, hypopygio nigro clauso. Long. corp. 15, al. 12 mm. Patria: Kappadocia; 1 ♂ coll. Lichtwardt.

Ganz tiefschwarz, wenig glänzend. Der Scheitelfleck ist von derselben Form und orangegelben Farbe wie bei *pratensis* oder *crocata*. Gelb sind ferner nur die kleinen Humeralflecke, ein Fleckchen seitlich am hinteren Absturz des Präscutum, die Schwiele vor der Einlenkungsstelle der Flügel (seitlich an der hinteren Hälfte des Scutum; nicht Pleura), je 2 Flecke am Scutellum und Mesophragma, die man daher auch als gelb mit breiter schwarzer Mittelstrieme bezeichnen könnte. Alles übrige tiefschwarz, so besonders auch der Oberrand des Pronotums (Collare) die Pleuren und die inneren Teile des Hypopygs.

Fühler von ähnlicher Bildung wie bei *pratensis*, doch etwas kürzer. Flügel etwas dunkler tingiert, mit denselben Bräunungen an den Adern. Vom Randmal ein dunkler Schatten zur Discoidalis.

Beine gewöhnlich; bei durchfallendem Licht dunkelpechbraun.

Hypopyg geschlossen, ohne auffallende Anhänge; soweit sich ohne Zergliederung erkennen läßt, wie bei *pratensis* gebildet. Unterseite der Lamina basalis infera mit kurzen, schwarzen, abstehenden Haaren beborstet.

Ein auffallendes Tier, welches ich als melanotische Abänderung einer anderen Art, etwa von *pratensis*, nicht ansehen kann. Osten-Sacken beschreibt Bull. Unit. Stat. Geol. Surv., III. 210. 1877 eine ebenfalls ganz schwarze *P. altissima* aus den Rocky Mountains — altogether black, including legs and halteres; wings brownish, with a small brown stigma. Length, ♂ 12 bis 13 mm; ♀ 15—16 mm — mit der *Nox* jedoch kaum zusammenfallen dürfte; die nahestehenden, mir bekannten amerikanischen Arten, z. B. *lugens* Lw. (Berl. Ent. Zeitsch. VIII. 63. 1864), sind wenigstens stark glänzend, während *Nox* den matten, nur am Thorax etwas lebhafteren Glanz der *pratensis* zeigt.

*P. lunulicornis* Schum.

Beitr. z. Ent. III. 107 (1833).

Schummels „Versuch einer genauen Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der Gattung *Tipula* Meigen. Bachmücke.“ gehört zu den literarischen Seltenheiten und ist schwer zu erlangen. Es sei daher auf die ausreichende, nach Schummelschen Originalexemplaren gefertigte Beschreibung in Schiner, Fauna austriaca, II, 504 hingewiesen.

Für die Art sind beim ♂ die Eigenart der Fühler — beim ♀ kaum bemerkbar — und die lange, dichte Behaarung des letzten, unten tief ausgeschnittenen Hinterleibsringes und des Hypopygiums, beim ♀ der langgestreckte, in der Form  *analis* Schum. am nächsten kommende Hinterleib charakteristisch. Die Fühler beschreibt

Schummel treffend wie folgt: „Die 2 ersten Glieder rostgelb, das dritte ziemlich lange Glied unten am Ende verdickt, die folgenden unten am Grunde stark verdickt, vor dieser Verdickung (nach der Fühlerspitze hin) merklich ausgeschnitten, vor dem Ende



Fig. 1.

mit sanfter runder Hervorragung.“ Man könnte die Fühlerbildung etwa mit derjenigen von *scurra* Meig. vergleichen; sie hat mit *Nephrotoma*, wie häufig angenommen wird und wie ich mich bei Schummelschen Tieren überzeugen konnte, keine Ähnlichkeit, die Ausbuchtung ist vielmehr ganz seicht.

Das ♀ ist konstant bedeutend größer als das ♂. Das Vorkommen von *lumulicornis* scheint lokal begrenzt. Sie wird weder von Verrall noch von Wallengren genannt und fehlt z. B. auch in Kowarz, Fliegen Böhmen. Bergroth führt sie aus Laibach, Huguenin als selten aus Zürich, Weissenburg und Wallis, Czwalina für Ost- und Westpreußen und Westhoff aus der Provinz Westfalen (verbreitet aber selten) an. Hier am Niederrhein ist sie häufig.

Im Trafoier Tal fing ich ein abweichendes Exemplar, welches vielleicht eine besondere Art darstellt; es gleicht in allem *lumulicornis*, nur befindet sich am vierten Fühlerglied die tiefste Ausbuchtung in der Mitte, bei *lumulicornis* dagegen im ersten Drittel. Die folgenden Glieder sind bei beiden Arten gleich; ferner sind die App. interm. auffallend groß, fast so groß wie die superae, hakenförmig mit scharfer Spitze; bei *lumulicornis* sind sie wenig auffallend oder verborgen; auch fehlt die lange Behaarung des Hypopygs; da das Tier aber abgeflogen zu sein scheint, mag sie verloren gegangen sein.

*P. fuscescens* n. sp.

Ex affinitate *P. quadrifariae* Schum. Fusca, nigro signata. Praescuto nigrovittato, vittis lateralibus antice curvatis; pleuris nigromaculatis; alis fusciscentibus, cum pterostigmate brunneo; pedibus brunneis longis. Long. corp. 13—14, al. 14—16 mm. Patria: Sibiria (2 ♂ 4 ♀ Halbinsel Jankowsky, Süd-Ussuri). Juli. coll. Heyne.

Gelbbraun, beim ♂ die Grundfarbe mehr gelblich, die Zeichnungen schwarz; beim ♀ mehr bräunlich und dunkelbraun (vielleicht je nach dem Grade der Ausfärbung verschieden, vielleicht auch durch die Art der Konservierung — Alkohol? — verändert).

Kopf gelb. Occipitalfleck braun, von verschiedener Größe und Gestalt, meist rundlich, wenig zugespitzt, die Hinterhauptsmitte kaum erreichend. In der Mitte des oberen Scheitelrandes der Augen je ein samtschwarzes Fleckchen. Schnauze gelb, oben gebräunt. Taster gelb, lang. Fühler von gewöhnlicher Länge, schwarz, die beiden Basalglieder gelb. ♂: Erstes Glied etwas verlängert, zweites kurz, napfförmig, drittes verlängert, zylindrisch, die übrigen — bei den letzten verschwindend — an der Basis knopfig, weiterhin ausgeschweift und an der Spitze erweitert, etwa wie bei *analis* Schum. Das erste und dritte Glied mit einigen Härchen, die übrigen mit 3—4 Wirtelharen; fast ohne Pubescenz. ♀: Fühler gewöhnlich.

Pronotum (Prothorax, Collare aut.) gelb, an den Seiten schwarz; Präscutum mit den gewöhnlichen 3 schwarzen Striemen, die seitlichen vorn abwärts gebogen; die mittelste greift etwas auf das Scutum über; letzteres mit den üblichen schwarzen Streifen. Scutellum ganz gelb, blasig. Mesophragma gelb, der hintere abfallende Teil schwarz, die gelbe Körperfarbe nur als dünnen Mittelstrich freilassend. Pleuren, Meso- und Metasternum, sowie Coxae mit wenig charakteristischen schwarzen oder schwarzbraunen Flecken wie bei den Individuen der *quadrifaria*-Gruppe gezeichnet.

Beine braun mit dunkleren Gelenken; Tarsen sehr lang, fadenförmig; Metatarsus aller Beine sehr kurz bewimpert. Flügel intensiv rötlich-(zimt-)braun tingiert; alle Adern auffallend gelbbraun, das Randmal etwas dunkler, ein schwacher Schatten zur Discoidalis und um die Flügelspitze. M. 1 und 2 bei meinen 5 Exemplaren sitzend. Schwinger gelb.

Abdomen beim ♂ und ♀ kürzer als die Flügel, braun, gegen das Ende dunkler werdend, mit spärlicher weißgelber Pubescenz. Die schwarze Zeichnung, besonders bei der Dorsallinie des ♀, ähnlich derjenigen von *quadrifaria*. Hypopyg etwas verdickt; lamina terminalis supera ausgeschnitten, so daß 2 stumpfe Zähne gebildet werden; die korrespondierende untere Schiene tief ausgeschnitten. Die Appendices superae als gelbe, hörnchenförmige Gebilde mit nach innen gebogenen Spitzen auffallend; die intermediae kleiner, blattförmig. Cerci kurz, ähnlich wie bei *quadrifaria*, gedungen lanzettlich; Styli etwas kürzer, nach unten weisend.

Das ♂ ähnelt im Habitus am meisten *analis*, das ♀ *quadrifaria*. Eine durch die Färbung auch äußerlich auffallend gekennzeichnete Art.

*P. quadristriata* Schum.

Beitr. z. Ent. III. 109.

Die Schummelsche Beschreibung ist gut und treffender als der hiernach von Schiner (II, 508) gefertigte Auszug. Die Art gehört nach dem Habitus und dem Hypopyg in die *lumlicornis*-Verwandtschaft, unter-



Fig. 2.

scheidet sich aber von *lumlicornis* Schum. und *Schummelii* m. sofort durch den Bau der Fühler: „länger als Kopf und Mittelleib, schwarzbraun, die ersten 2 Glieder gelb, das dritte länger als gewöhnlich, vor dem Ende etwas verdickt, die folgenden unten am Grunde und vor dem Ende stark verdickt, zwischen beiden Verdickungen tief ausgeschnitten, welche Bildung der von *Nephrotoma* gleicht, bei den letzten Gliedern, wie immer, allmählich verschwindet.“ (Schummel). Ferner ist

das Randmal wenig auffallend, bernsteingelb. Die Abbildungen des Hypopygs und der Fühler bei Schummel genügen.

Das ♀ unterscheidet sich durch die auch bei den ♀ der anderen Arten üblichen Abweichungen: kürzere Fühler mit ausgedehnterem Gelb, häufig ganz gelb, breitere Rückenstrieme des Hinterleibs, die bei den wenigen mir zur Verfügung stehenden, arg zusammengeschrumpften Exemplaren eine scharfe Zeichnung nicht erkennen läßt, und durch etwas dunkleres Randmal.

Die als um Breslau nicht sehr selten bezeichnete Art scheint doch recht selten und gar nicht bekannt. Ich sah sie aus Österreich und ein Exemplar, wohl aus der Umgegend von Berlin, in der coll. Oldenberg.

*P. Schummelii* n. sp.

Flava. Antennis tenuibus, elongatis; articulis fragilibus valde excisis. Pleuris immaculatis. Vittis praescuti lateralibus antice non hamatis; stigmatibus alarum nigro. Long. corp. 12—15, al. 12—14 mm. 3 ♂; 2 Süd-Steiermark, eins von mir im August bei Franzeshöhe unterhalb des Ortlermassivs gefangen.

Hellgelb. Kopf gelb; der schmale, vorn spitze Occipitalfleck

als schwarzer Schatten über Hals und Pronotum fortgesetzt; letzteres an den Seiten ohne schwarze Flecke. Taster gebräunt. Fühler von interessanter Bildung, dünn und verlängert; erstes Glied gelb, zweites gebräunt, die folgenden schwarzbraun. Das dritte Glied verlängert, an der Spitze nach unten mit einem knopfigen Vorsprung; die folgenden, vom siebenten ab immer mehr verschwindend, an der Basis knopfartig angeschwollen und am Ende mit zahnartigem Vorsprung; zwischen diesen beiden Hervorragungen ist der Fühlerschaft unverändert geblieben und zeigt sich in der üblichen, zylindrischen Form. Die Fühler sind mit Wirtelhaaren, wie gewöhnlich, besetzt und weisen dichte, hellgelbe Pubescenz auf.

Präscutum mit den bekannten schwarzen Streifen, die seitlichen gerade. Schildchen braun, ebenso wie das hellere Mesophragma mit dunkelbrauner Mittelstrieme. Die Seiten des Thorax (Pleuren) ungefleckt, nur Sternopleura unten mit breitem, lichtbraunem Band.




Fig. 3.

Abdomen gelb, schlank, mit gerader, den ganzen Rücken bedeckender, brauner Strieme und den gewöhnlichen Seitenstriemen; die letzten Schienen schwarz. Das gelbbraune, unten behaarte Hypopyg sehr ähnlich demjenigen von *lunulicornis* und *quadristriata*; App. sup. ebenfalls von gleicher Bildung, auffallend vorstehend.

Flügel gleichmäfsig bräunlich; Randmal bei 2 Exemplaren braun und scharf umgrenzt, beim dritten zwar auch scharf, aber nur bräunlichgelb.

Eine, wie die Abbildung des Fühlers zeigt, von *lunulicornis* und *quadristriata*, in deren Nähe sie die Bildung des Hypopygs verweist, leicht zu unterscheidende Art. Ich weihe sie den Manen Schummels, dessen treffliche Pachyrhinen-Beschreibungen eine sichere Trennung der Formen aus der *lunulicornis*-Gruppe wesentlich erleichterten.

*P. analis* Schum.

Beitr. z. Ent. III. 105 (1833). — Syn. *cornicina* Zett. Dipt. Sc. X. 3996 (1851).

Eine der *quadrifaria* auch in der Gröfse nahe stehende, ähnliche Art. Appendix basalis nicht vorhanden, ein gutes und konstantes Merkmal. Der bei *quadrifaria* kleine, meist wenig deutliche Scheitelfleck ist bei *analis* grofs, tiefschwarz und scharf umrissen. Beim ♀ fällt der lange und schlanke Hinterleib auf; die Cerci sind lang und dünn. Auch die bei *quadrifaria* und *analis* besonders deutliche, verschiedene Zeichnung der Rückenstrieme des Hinterleibs trennen die beiden Arten scharf.

*Analis* ist ziemlich selten, viel seltener als *quadrifaria*, wenn auch weit verbreitet, aber anscheinend nicht immer sicher unterschieden; sie könnte sonst nicht, wie es geschieht, mit *cornicina* L., anstatt mit *quadrifaria* verglichen werden. Sie fehlt bei Wallengren und auch Verrall, Huguenin und Strobl kennen nur 1 Exemplar.

*P. lamellata* n. sp.

Ex affinibus *P. quadrifariae* Meig., *anali* Schum. propinqua; robusta, flava, pallida; differt praecipue hypopygio alio constructo, lamella infera basali non excisa, terminali cultello simili, exserta; halteribus pallidis, clava flava; scutello nigro. Long. corp. 13, al. 16 mm. Patria: Bohemia, Karlsbad. 1 ♂.




Fig. 4.

Der *analis* Schum. nahe stehend, aber durch den robusten Habitus, die blafs-gelbe Färbung, die reichlichere, intensiv schwarze Zeichnung und die abweichende Bildung des Hypopygys unterschieden.

Kopf mit grossem, schwarzem, vorn ausgezogenen Occipitalfleck; Rostrum gelb, obenauf schwarz; Taster gelb, Endglieder gebräunt; Fühler wie bei *analis*, die Ausbuchtungen vom vierten Gliede ab jedoch schärfer. Thorax mit den gewöhnlichen, schwarzen Zeichnungen; die Seitenstriemen des Präscutum breit vorn nach unten herabgebogen. Schildchen schwarz (bei *analis*

gelb mit schwarzer Mittelstrieme); Mesophragma mit breitem, schwarzem, nach dem Abdomen hin fufsförmig erweiterten Mittelstreifen. Pleuren, Sterna und Coxae mit den gewöhnlichen, bei dieser Art besonders tiefschwarzen, glänzenden Flecken.

Beine lang, kräftig, schwarzbraun; Schenkel hellbraun. Metatarsus der Hinterbeine verlängert, 10 mm, die folgenden Tarsen zusammen 6 mm lang.

Flügel mit kräftigen Adern, scharf begrenztem, dunkelbraunem Randmal, dunklem Schatten zur Discoidalzelle und deutlich gebräunter Flügelspitze.

Schwinger ganz gelb (bei *analis* mit dunklem Knopf). Abdomen kürzer als die Flügel, hellbraun. Erster Ring mit schwarzer, nach dem Thorax hin erweiterter, die folgenden Ringe mit breiter, fast die ganze Oberfläche einnehmender, an den Ringeinschnitten kaum abgesetzter Rückenlinie. Die Endschienen ganz schwarz. Hypopyg viel sparsamer behaart als bei *analis*, von eigentümlichem Bau. Lam. term. sup. wenig verändert, am freien Rande seicht ausgeschnitten und weißgelb abgesetzt; lam. bas. inf. etwas vorgezogen, ganzrandig; terminalis groß, die Ränder unten in der Mitte senkrecht parallel laufend, schneidenförmig vorstehend, oben kolbig geschlossen; bräunlich mit schwarzen Makeln. Append. sup. hörnchenförmig, etwa wie bei *analis* gebildet, hellgelb; intermediae blattförmig, verdunkelt.

*P. terminalis* Wied.

Aufereurop. zweifl. Ins., II. 616 (1830). (Tip.)

Von dieser Art liegen mir 3 ♂ und 1 ♀ vor, Wiedemannsche Typen aus der Winthem(Meigen-)schen Sammlung des Wiener Museums. Eine der Form und Größe nach *cornicina* L. nahe stehende Art. Long. corp. ♂ 13, ♀ 19; al. ♂ 10, ♀ 12 mm. Patria: Syria.

Die Grundfarbe ist ein *scurra*-ähnliches ockergelb. Kopf gelb; Occipitalfleck klein, schwarz. Taster gelb, verlängert, besonders das vierte Glied geißelförmig; beim ♂ etwas kürzer, beim ♀ so lang wie die Fühler. Diese gewöhnlich; vom vierten Gliede ab unten schwach ausgebuchtet; Basalglieder von der Körperfarbe, allmählich brauner werdend. Collare ungefleckt. Seitenstriemen des Präscutum breit nach unten bis zur Prothorakalgrenze herabgebogen. Mittelstrieme von eigentümlicher, das Erkennen der Art erleichternder Bildung: am besten als vorn erweiterte Bräunung zu bezeichnen, mit schwarzem, nach vorn spitz ausgezogenem Kern, schwarzem Vorderrand und von vorn nach hinten zu verschwindenden, schwarzen Seitenrändern. Pleuren wenig charakteristisch hellbräunlich gezeichnet. Beine gewöhnlich.

Flügel schwach bräunlich tingiert, nicht irisierend, mit braunen Adern, deutlichem, braunem Randfleck, schwacher Bräunung der Flügelspitze. Schwinger gebräunt, Ende des Knopfes gelb.

Abdomen beim ♂ mit punktförmig abgesetzter, beim ♀ auf den einzelnen Ringen breit dreieckiger — Spitze nach vorn — Rückenstrieme. Seitenstriemen durch Punkte angedeutet. Hinterleib des ♂ der *maculata*-Gruppe ähnlich, walzenförmig, gleichmäsig dick in das unscheinbare, nicht abgesetzte Hypopyg übergehend. Auffallende Anhänge oder Bildungen fehlen. App. sup. anliegend. Cerci verlängert, fein, stumpfspitzig.

Es ist erfreulich, über diese bisher für eine *Tipula* s. str. gehaltene gute Art sichere Kenntnis erhalten zu haben.

*P. lucida* Schin.

Novara-Reise, Dipt., 34. 1 (1868).

1 ♀ aus Madeira.

Das ganze Tier einschliesslich der Flügeladern und des Pterostigma zeigt eine bräunlichgelbe Farbe, wie Schiner richtig bemerkt.

Kopf gelb mit schwarzem, nach vorn spitz ausgezogenem Occipitalfleck, der sich über den Hals und das Pronotum andeutungsweise fortsetzt; Rostrum und Palpen gelb; Fühler kurz, gewöhnlich, gelb, vom vierten Gliede ab an der Basis schwarz, mit den üblichen Wirtelhaaren und der geringen Beborstung, erstes Glied plump. Die 3 Striemen des Präscutum dunkelbraun, die seitlichen gerade, die mittelste gabelt sich vorn in 2 — man könnte auch sagen, Präscutum mit 4 Striemen, die mittelsten vorn divergierend und aus gemeinschaftlicher Wurzel entspringend. Schildchen und Mesophragma gelb, ersteres mit braunem Mittelstreifen. Brustseiten ungefleckt, stark glänzend. Abdomen verlängert, mit dunklen Rückenflecken, die am Hinterrande die ganze Breite ausfüllen und nach vorn halbkreisförmig sich verschmälern. Genitalien ziemlich lang, auch die stumpfspitzigen Cerci verlängert, klaffend. Flügel gelb tingiert, mit intensiv braunen Adern und auffallendem braunen Randfleck. Schwinger gelb mit grossem Knopf. Beine gewöhnlich, braun, nach den Gelenken zu dunkler werdend. Long. corp. 20, al. 15 mm.

Die Art steht unter den paläarktischen Arten vereinzelt; es ist möglich, dass *maderensis* Wulp. das ♂ zu *lucida* ist, es würde dann das von Becker, Mitt. Mus. Berl. 1908. 188, zu *maderensis* gezogene ♀ wahrscheinlich zu einer anderen Art gehören.

*P. crinicauda* n. sp.

*P. scalaris* similis; flava, nigrofasciata; vittis praescuti lateribus antice hamatis; alis cum pterostigmate nigropiceo; hypo-

pygio magno, valde ostentato; lamella bas. inf. pectinatim setosa. Long. corp. ♂ 12, ♀ 16 mm; al. ♂ 13, ♀ 16 mm. 9 ♂ 3 ♀ (coll. Wiener Museum, Lichtwardt, Schulze). Patria: Austria, Toscana (Pisa), Corsica, Sicilia, Creta (Elos).

Rostgelb, schwarz gezeichnet.

Kopf und Rostrum gelb; Occipitalfleck klein, rautenförmig. Pronotum an den Seiten schwarz. Taster gebräunt, gewöhnlich. Fühler braun, die beiden Basalglieder ganz gelb, vom dritten Gliede ab am Grunde etwas knopfig verdickt, unten kaum ausgebuchtet.

Die 3 Striemen des Präscutum tiefschwarz und breit, die seitlichen vorn breit nach unten herabgebogen. Schildchen blasig, bräunlich. Mesophragma gelb mit breiter, schwarzer, nach dem Abdomen hin fußförmig erweiterter Strieme. Pleura 1 mit schwarzem (braunen) Gabelfleck — Öffnung nach dem Präscutum hin —, Pleura 2 am Vorderrande und Pleura 3 oben und an den Seitenrändern (etwa wie bei *maculata* Meig.) schwarz umrahmt, Sterno- und Hypopleura am Grunde schwarz gefleckt. Coxae gelb, mit langer, weicher, gelber Behaarung.

Abdomen beim ♂ gedrun gen, beim ♀ lang ausgezogen; gelb; Bauch ganz gelb; Rücken mit großen, dunkelbraunen, fast quadratischen, nach vorn etwas verschmälerten, breit auf den Seitenrand überfassenden Flecken, so daß die gelbe Farbe nur als schmale Binden zwischen den einzelnen Ringen übrig bleibt. Hypopyg groß, kolbig abgesetzt, gelb. Lam. bas. sup. breit braun, terminalis gelb, wenig ausgerandet, in der Mitte mit ganz kleinem Einschnitt, die Ecken zahnförmig vorstehend. Lam. bas. inf. kaum ausgeschnitten, die Ränder mit auffallenden, kammartigen, zueinander geneigten, rostgelben, seidenartig glänzenden Borstenbüscheln. Adminiculum deutlich sichtbar. App. sup. breit mit kurzer, stumpfer Spitze. Cerci lang, schmal stumpfspitzig. Flügel schmal, länger als der Hinterleib, gelb mit großem, scharfem, braunem Randmal. M. 1, 2 und 3 breit sitzend und lang. Schwinger bräunlich, Knopf dunkler, Spitze hell. Beine gewöhnlich.

Das ♂ ähnelt in der Körperfärbung zwar etwas *scalaris* Meig., die Art kann aber wegen des abweichenden Hypopygs des ♂ und der Hinterleibszeichnung des ♀ dieser Gruppe nicht zugerechnet werden. Bei *scalaris*, *crocata*, *pratensis* usw. geht der Hinterleib allmählich in das Hypopyg über, während letzteres bei *crimicauda* scharf abgesetzt und kolbig verdickt ist. Die kammartige Beborstung der Lam. bas. inf. ist auffallend und am ehesten mit derjenigen bei *Tipula lunata* L. zu vergleichen.

*P. quadrifaria* Meig.

Klass., I. 72 (1804).

Syn. *dentata* Meig., S. B. VII. 35 (1858); *dentata* Zett., Dipt. Sc. X. 3992 (1851); *fascipennis* Zett. Dipt. Sc. X. 3993 (1851); *dentata* Wallengr., Ent. Tidskr. III. 14 (1882).

Durch den braunen Schatten, der sich vom Randmal über die Queradern und den letzten Abschnitt des Cubitus 2 hinzieht und auch beim ♀ deutlich ist, vor allen Arten ausgezeichnet. Die Fühlerglieder des ♂ sind unten sehr seicht ausgekerbt. Das ♀ ist wenig größer als das ♂; Hinterleib breit und plump, vor dem Übergang in die Legeröhre etwas geschwollen. Die Cerci sehr kurz und parallel klaffend.

In mehreren Verzeichnissen, z. B. für Frankfurt (Main)<sup>1)</sup>, Ost- und Westpreußen, Böhmen, Finnland u. a., wird *quadrifaria* nicht erwähnt, dagegen die viel mehr lokalisierte, ähnliche *analis* Schum.; ob eine Verwechslung mit *quadrifaria* stattgefunden hat?

*Dentata* Zett. ist, wie bekannt, Synonym zu *quadrifaria* Meig., aber auch *dentata* Meig. ist hierher zu ziehen. Das von Meigen beschriebene ♀ kennzeichnet sich nach den angegebenen Merkmalen: „3 unterste Fühlerglieder rotgelb; Hinterleibs-Rückenstrieme aus dreieckigen zusammenhängenden Flecken bestehend, deren Spitze nach vorn gerichtet ist. Flügel: Die Queradern und die dritte Längsader am Hinterrande braun gesäumt; Spitze bräunlich. 5 Linien.“ mit Sicherheit als ein kleineres ♀ von *quadrifaria*<sup>2)</sup>.

*P. aculeata* Lw.

Beschr. europ. Dipt., II. 20 (1871).

Die einer etwas größeren und schlankeren *cornicina* L. ähnliche Art ist durch die beim ♂ auffallend vorstehende, lange, spitze, stachelförmige App. basalis („segmentum ventrale ultimum maris in aculeum acutum productum. Loew.“) gekennzeichnet. Das ♂ gleicht am meisten *quadrifaria* in der Hinterleibszeichnung, die aus dreieckigen Rückenflecken besteht. Bei *aculeata* ist jedoch die vordere Spitze stumpf, so daß man auch die Zeichnung trapezförmig nennen könnte, bei *quadrifaria* dagegen spitz. Die Fühler sind gelb, wenig gebräunt, besonders die ersten beiden Glieder ganz hellgelb. Die Legeröhre — Cerci und Styli als Ganzes betrachtet — ist schlanker und länger als die kurze, vom letzten Hinterleibsring deutlich abgesetzte der *quadrifaria*.

<sup>1)</sup> Sack, Beiträge z. Kenntnis der Fauna der Umgegend von Frankfurt a. M. Berichte der Senckenberg. Naturforsch. Gesellsch. 1907. 33.

<sup>2)</sup> Vergl. auch Wahlgren, Über einige Zetterstedtsche Nemoceren-typen. Arkiv för Zoologi. II. Stockholm. 1904. 13.

Die seitlichen Striemen des Präscutum „sind vorn nicht abwärts gekrümmt, pflegen aber unterhalb ihres vorderen Endes einen graulichen Fleck zu haben, nur bei besonders vollkommen ausgefärbten Exemplaren erweitern sie sich gegen diesen Fleck hin und sind dann zwar vorn ebenfalls nicht hakenförmig, aber doch sanft abwärts gebeugt“. Dieser grauliche Fleck kommt besonders häufig beim ♀ vor und erleichtert dann in zweifelhaften Fällen das Erkennen unter anderen ähnlichen Arten. Das von Schummel p. 109 bei *lunulicornis* erwähnte ♀ gehört hierher.

Die Art war Loew aus dem Harz, Steiermark, Kärnthen, dem Bayrischen Hochgebirge und der Tatra bekannt; ich fing sie bei Eys in Südtirol und hier am Niederrhein und sah sie aus Osterreich, der Schweiz, Italien und aus der Berliner Gegend.

Lundström kennt aus Finnland (Petrosawodsk) nur 1 ♂<sup>1)</sup>.

*P. tenuipes* n. sp.

Lutea, nigro signata. Capite luteo, nigro-maculato; antenarum duabus articulis basalibus luteis, ceteris nigris. Praescuto trivittato, vittis lateralibus lunatis. Pedibus elongatis tenuibusque. Hypopygio compacto; appendice basali simplice, gracili, projecta; cercis acutis. Alis cum pterostigmate nigropiceo dilatato, apice adusto.

Gelb mit den gewöhnlichen schwarzen Zeichnungen. Scheitelfleck groß, zugespitzt, die Ränder mit den Augenrändern parallel. Schnauze obenauf braun. Taster bräunlich, die Gelenke weißlich. Fühler von gewöhnlicher Bildung, braun; die ersten beiden Glieder gelb, wenig gebräunt. Die Seitenstriemen des Präscutum kaum abwärts gebogen, gleichmäßig dick, schwach mondförmig. Die hellbraune Pleurenzeichnung läßt zwischen den Vorder- und Mittelhüften die gelbe Grundfarbe als breites, paralleseitiges, horizontales, nach den Mittelhüften herabgebogenes Band frei. (Diese Zeichnung findet sich übrigens auch bei den anderen gelben Arten mehr oder weniger deutlich.) Beine besonders lang und dünn; gelb, Schenkel an der Spitze und Tibien braun. Flügel länger als der Hinterleib, schwach grau tingiert, mit braunen Adern, wenig irisierend; Randmal groß und dunkel; eine ebenso intensive Bräunung zieht sich über die kleine Querader bis zur Discoidalzelle hinab; Flügelspitze gebräunt; Cu. 2 stark; M. 1, 2 und 3 breit auf der Discoidalzelle sitzend. Hinterleib mit breiter, dunkler, die ganze Oberfläche einnehmender, wenig charakteristischer Rücken-, und den gewöhnlichen Seiten- und Bauchstriemen. Lam.

<sup>1)</sup> Lundström, Beiträge zur Kenntnis der Dipt. Finnlands. Act. soc. pro fauna et flora fennica. Helsingf. 1907. 25.

term. sup. zu 2 dunkelbraunen Wülsten umgebildet; lam. bas. inf. dunkelbraun, der äußerste, gerade Rand fein gelb abgesetzt. App. simpl. als dünner, gegen das Ende abgeflachter, etwas verbreiteter, im letzten Viertel nach aufsen schräg erweiterter Stiel von Hypopygslänge auffallend vorstehend. Hypopyg geschlossen; die oberen, wenig vorstehenden Anhänge länglich viereckig, die innere, freie Spitze dunkelbraun, nach innen gekrümmt; Cerci hellbraun, mälsig lang, feinspitzig. Long. corp. ♂ 12—13, ♀ 15—16 mm; al. 15 mm.

4 ♂ 3 ♀. Im Trafoiertal an den Rinnsalen der Stilfserjochstrafse; Ende August (1909).

*P. cornicina* L.

Syst. Nat., Ed. X., 586 (1758).

Syn. *iridicolor* Schum. Beitr. z. Ent., III. 101 (1833); *sannio* Meig., S. B., VII. 36 (1838).

Flügel stark irisierend. ♂ gekennzeichnet durch den parallel zum unteren Hypopygrand abstehenden, stielförmigen, am Ende verdickten Anhang (Appendix basalis). ♀ mit breiter, fast den ganzen Hinterleibrücken bedeckenden, brauner Strieme, die am Hinterrand breit entspringt und fast gerade, wenig ausgezackte Ränder zeigt.

*Cornicina* ist in Deutschland eine der häufigsten Pachyrhinen; es müssen daher v. d. Wulps und Huguenins Bemerkungen über ihr seltenes Vorkommen auffallen.

*P. guestfalica* Westh.

Jahresber. westf. Prov.-Ver. f. Wiss. VIII. 49 (1880).

Syn. *analis* var. *escorialensis* Strobl. Span. Dipt. III. Verh. zool.-bot. Ges. 1909. 134.

Eine der *cornicina* ähnliche, gute Art. Die Beschreibung von Westhoff ist wenig bekannt geworden, ich lasse sie daher im Auszuge folgen.

„Ex *P. analis* Schum. et *cornicinae* Linn. affinibus; lutea; oculis, verticis macula angusta anticeque acuta nigris; antenarum flagello articuloque secundi basi fuscatis, pleuris nigromaculatis; mesonoto abdomineque nigro-trivittatis, vittis lateralibus illius antici hamatis, huius angustissimis; alis hyalinis, minus iridisantibus, cum pterostigmate nigropiceo, minore quam in anali, majore quam in *cornicina*, apice levissime obscuro-afflato; pedibus testaceis, femorum tibiatarumque apice, tarsi infuscatis.

♂ antennis mediocribus, flagelli articulis subtus levissime sinuatis; vitta dorsali abdominis interrupta, vittae lateribus paululum denticulatis, segmento sexto immaculato; hypopygio

brunneo, vix incrassato, lamella infera<sup>1)</sup> nulla, margine inferiore plus minusve subdeflexo, lamellis superioribus<sup>2)</sup> angustis, prae-longis, nigro-pilosis (peni filamentosa ex medio spiraliter prominente<sup>3)</sup>); alis abdomine longioribus.

♀ antennis brevioribus; abdominis dorsali vitta maculiformi, maculis in omni segmento plus minusve hederæfoliiformibus; terebra brunnea, lamellis superis rectis, apice acutis, lamellis inferis brevioribus, acutis.

Long. corp ♂ 9,5—11,5, ♀ 13—15,5 mm; long. al. ♂ 11,5—13, ♀ 12—13,5 mm.“

Die Zeichnungen der Hinterleibstrieme sind selten so deutlich „hederæfoliiformes“, wie man nach der Beschreibung und noch mehr nach der stylisierten Abbildung glauben könnte. Immerhin sind sie unverkennbar anders gestaltet als bei *cornicina*. *Guestfalica* ist wahrscheinlich ebensoweit verbreitet, wie *cornicina*. Verrall<sup>4)</sup> führt sie an („is fairly common in my garden, but not so abundant as *P. histrio*“). Sonst erwähnt sie nur noch de Meijere<sup>5)</sup> aus Holland. Hier bei Ürdingen ist sie im Ufergebüsch des Rheins häufig. Ich sah sie aus verschiedenen Gegenden Deutschlands (Berlin, Sachsenwald, Thüringen), auch aus Spanien (Escorial, Fte. Teja, Sierra de Guadalupe, coll. Heyne und Oldenberg). Die v. *escorialensis* ist, wie mir Herr Prof. Strobl nach Einsicht meiner zum Vergleich gesandten *guestfalica* bestätigte, als Synonym hierherzustellen.

*P. maculata* Meig.

Klass., I. 71 (1804).

Syn. *flavescens* Walk., Ins. Brit. III. 332 (1856); *maculosa* Meig., S. B., I. 197 (1818).

*P. lineata* Scop.

Ent. Carn. 320 (1763).

Syn. *cornicina* Meig., Klass. I. 71 (1804); ? *flavescens* L., Syst. Nat., Ed. X., 586 (1758); *flavomaculata* Deg., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 347 (1776); *histrio* Fabr., Ent. Syst., IV. 237 (1794); *maculosa* Zett., Ins. Lapp. 845 (1838).

Zwei nahe verwandte, überall häufige Arten, welche durch den in seiner ganzen Länge gleichmäfsig zylindrischen Hinterleib

1) Appendix basalis.

2) Appendices externae superae.

3) Zufall.

4) Verrall, A hundred new British species of Diptera, The Entom. monthly Mag. London. 1886. XII. 201.

5) de Meijere, Erste Supplement op de Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera. Tijdschrift voor Entomol., s'Gravenhage, 157 u. 176 (1907).

auch habituell als einander nahe stehend gekennzeichnet sind. Bei *maculata* ist das Hypopyg ein wenig, bei *lineata* gar nicht kolbig abgesetzt.

*Maculata* aus südlichen Gegenden zeichnet sich häufig durch verdunkeltes Randmal aus, wie es Strobl für Spanien (Span. Dipt. III) angibt.

Bergroth<sup>1)</sup> und Becker<sup>2)</sup> führen *lineata* aus Algier an.

*P. scurra* Meig.

S. B., I. 198 (1818). — Syn. *picta* Meig., S. B., VII. 35 (1838).

Grofse, schlanke Art mit langgestrecktem Hinterleib; etwas vom Pachyrhinentyp abweichend. Beim ♀ die gewöhnlich eine dünne Linie darstellende Strieme auf der Oberseite des Hinterleibs nicht selten verbreitert und die ganze Dorsalregion einnehmend.

Überall vorkommend<sup>3)</sup>. Über ihre ersten Stände ist mir nichts bekannt geworden.

*Picta* nennt Meigen „rotgelb“, während seine anderen Pachyrhinen — natürlich mit Ausnahme von *scalaris* — „gelb“ genannt werden und in der Tat zeigt eine Pachyrhina, nämlich *scurra* Meig., ein roteres Gelb als ihre Verwandten. Zieht man Meigens weitere Beschreibung von *picta*; eines ♀, in Betracht: „Brustseiten ungefleckt. Auf dem Bauche 3 schwarze, vorne genäherte Linien“ (beim Trockenwerden biegen sich die Seitenränder des dünnen Hinterleibs gerade von *scurra* tatsächlich soweit herunter, daß es den Anschein erweckt, als lägen drei Streifen auf der Bauchseite); „7 Linien“ (es ist dies auch die von Meigen für *scurra* angegebene Gröfse), so kommt man zu der Überzeugung, daß *picta* als Synonym zu *scurra* zu stellen ist.

Von *scurra* tritt in den südlicheren Ländern eine interessante und, wie es scheint, konstante Farbabänderung auf, der ich beim Fehlen aller plastischen Unterschiede von *scurra* Artrechte nicht zubilligen kann, auf die ich jedoch zu weiteren Beobachtungen aufmerksam machen möchte und deren Beschreibung ich hiermit gebe:

Grundfarbe durchaus licht ockergelb (bei der typischen *scurra* meist dunkler). Kopf fast ohne Abzeichen, da der Occipitalfleck kaum durch eine etwas dunklere Stelle angedeutet ist; Fühler wie bei *scurra*, vom dritten Gliede ab allmählich brauner werdend. Von der gewöhnlichen, dorsalen Rückenschild-

<sup>1)</sup> Bergroth, Über einige paläarkt. Tip. W. E. Zeitg. VIII, 113 (1889) u. VII, 239 (1888).

<sup>2)</sup> Becker, Dipt. Erg., Zeitschr. f. syst. Hym. et Dipt., VII, 240.

<sup>3)</sup> Algier, Becker, Zeitsch. f. syst. Hym. et Dipt. VII. 240.

zeichnung ist nur die mittlere, vorn verbreiterte Strieme des Präscutum tiefschwarz und daher sehr auffallend, die übrigen, üblichen Zeichnungen, besonders die geraden Seitenstriemen heben sich bei den hellsten Tieren überhaupt nicht, bei den anderen kaum durch eine etwas tiefere Nüanzierung der gelben Grundfarbe ab; nur die Teile hinter der Quernaht — scutum mesonoti — sind nach außen hakenförmig tiefschwarz umrandet. Brustseiten ganz gelb, ohne jede Zeichnung. Beine gelb, Tarsen verdunkelt. Flügel lebhaft gelb tingiert, Randmal kaum bemerkbar. Die beiden ersten Ausstrahlungen der Discoidalzelle sitzend oder auf kurzem gemeinschaftlichen Stiel. Schwinger gelb mit dunklem Knopf. Hinterleib mit einer sehr schmalen, unterbrochenen, hinten verschwindenden, dunklen Dorsallinie und je einer Linie an den Seiten und einer am Bauch. Das Hypopyg zeigt keinen Unterschied von *scurra*; vor der Legeröhre des ♀ ein auffallendes braunes Bändchen. Gröfse wie *scurra*.

Ich fing 6 ♂ und 8 ♀ bei Eys (Südtirol) im Wiesengebüsch des Etschtals Ende August; ich sah gleichgefärbte Tiere aus Trient, Bozen (Oldenberg) und mit der Bezeichnung „Austria“ (Wien. Mus.) und 1 Exemplar aus der Schweiz in der entomol. Sammlung des Polytechnikums in Zürich.

*P. maderensis* v. d. Wulp.

Notes Leyden Mus., VII. 8. 19 (1885).

„Flava, thorace vittis tribus fuscis, media gemina, lateralibus antice rectis, pleuris immaculatis; metanoto maculis tribus fuscis; abdominis segmentorum singulorum margine posteriore nigro; antennarum flagello nigro, articulis subcylindricis; alis flavo-cinereis, stigmatate testaceo. 1 ♂ (Madeira); 9 mm.“

Der Satz „the middle one before the suture divided in two“ in der weiteren Beschreibung, legt einen Vergleich mit *lucida* Schin. aus Madeira nahe (vergl. die Bemerkung bei *lucida*).

Becker beschreibt Mitt. Mus. Berl. 1908. 188 ein fraglich zu *maderensis* gehöriges ♀: 9 mm; die 3 braunen Flecke des Metanotum zu einem vereinigt. Hinterleibsringe außer dem breiten Hinterrandsaume noch eine schmale dunkle Rückenlängslinie; die Fühlerglieder an der Wurzel 2 Haare.

*P. nodulosa* Brullé.

Expéd. scient. d. Morée, III. 290. 626 (1832).

„Flavo-rufescens; capite thoraceque fascia fusciscente, abdomine fascia dorsali angusta lineaque laterali fuscis; palpis

antennis pedibusque fuscis, femorum et antennarum basi rufescente; antennarum articulis basi nodulosis. ♂. Long. 12 mm.“

„Corselet d'un jaune roussâtre, avec une large bande brune sur le prothorax, laquelle se continue sur le mésothorax, vers l'extrémité duquel elle pâlit en se rétrécissant: cette bande du mésothorax est divisée en deux dans toute sa longueur; méta-thorax couvert d'une très large bande d'un gris brun; côtés du corselet de la même couleur.“ „Stigmate d'un jaune un peu brun.“ „En Avril, dans les environs de Messène. Cette espèce est assez voisine du *Tipula scurra* Meig.“

Die Art wird der von mir bei *scurra* erwähnten Farbabänderung sehr nahe stehen.

*P. brevipennis* Wollaston.

Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 3. I. 115 (1858).

„*P. flava*, capitis vitta, antennis palpisque nigris; thorace fusco-trivittato; abdomine nigro, segmentis antice flavis; alis abbreviatis, subcinereis. Long. corp.  $8\frac{1}{2}$ , al.  $8\frac{1}{2}$  mm. July. J. Madeira.“

Die Art wird ebenfalls ohne Kenntnis der Type kaum zu deuten sein, aber wahrscheinlich mit einer früher oder später beschriebenen Art — vielleicht aus der *cornicina*-Gruppe — zusammenfallen.

*P. virgata* Coquill., ♂, und *palloris* Coquill., ♀,

Proc. Unit. Stat. Nat. Mus. XXI. 306 (1898).

aus Japan lassen nach der Beschreibung kein sicheres Urteil über ihre Stellung innerhalb der Pachyrhinen-Gruppe zu, da den beiden einzigen Exemplaren für die Charakterisierung wichtige Teile fehlten (*virgata*: „the apical portion of the antennae wanting in the single specimen before me“; *palloris*: „antennae, except the two basal joints, wanting“).

*P. picticornis* Zett., D. S. p. 4003, ist nach Wahlgren „nichts anderes als ein Individuum von *Tipula luteipennis* Meig. mit abnormer Aderung“.

Unter den von älteren Autoren als *Tipula*<sup>1)</sup> usw. beschriebenen Arten wird noch die eine oder andere, meist wohl als Synonym,

<sup>1)</sup> Auch *Tipula fuliginosa* Gimmerthal, aus Rufslund, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 111. (1834), dürfte, worauf mich Herr Dr. Bergroth freundlichst aufmerksam machte, nach der Beschreibung eine *Pachyrhina* sein.

zu *Pachyrhina* zu stellen sein. Ihre sichere Deutung stößt ohne die kaum zu erhoffende Einsichtnahme der Typen — der Zahn der Zeit wird die Mehrzahl längst zernagt haben — bei dem Mangel charakteristischer Beschreibungen auf große Schwierigkeiten.

Alphabetisches Verzeichnis  
der in vorstehender Arbeit besprochenen Arten.

	Seite		Seite
<i>aculeata</i> Lw. . . . .	430	<i>maculata</i> Meig. . . . .	433
<i> analis</i> Schum. . . . .	426	<i>maderensis</i> v. d. Wulp. . . . .	435
<i>brevipennis</i> Woll. . . . .	436	<i>nodulosa</i> Brullé . . . . .	435
<i>castellana</i> Strobl . . . . .	418	<i>Nox</i> n. sp. . . . .	420
v. <i>croceiventris</i> Strobl ♀ . . . . .	418	<i>palloris</i> Coquill. . . . .	436
<i>cornicina</i> L. . . . .	432	<i>pratensis</i> L. . . . .	420
<i>crinicauda</i> n. sp. . . . .	428	<i>quadrifaria</i> Meig. . . . .	430
<i>crocata</i> L. . . . .	418	<i>quadristriata</i> Schum. . . . .	424
v. <i>luteata</i> Meig. ♀ . . . . .	418	<i>rossica</i> n. sp. (Schin. i. litt.) . . . . .	419
v. <i>semiflava</i> Strobl ♀ . . . . .	419	<i>scalaris</i> Meig. . . . .	417
<i>euchroma</i> Mik. . . . .	420	v. <i>flavirostris</i> Strobl ♀ . . . . .	418
<i>fuscescens</i> n. sp. . . . .	422	<i>Schummelii</i> n. sp. . . . .	424
<i>gestfalica</i> Westh. . . . .	432	<i>scurra</i> Meig. . . . .	434
<i>lamellata</i> n. sp. . . . .	426	<i>tenuipes</i> n. sp. . . . .	431
<i>lineata</i> Scop. . . . .	433	<i>terminalis</i> Wied. . . . .	427
<i>lucida</i> Schin. . . . .	428	<i>verticalis</i> Beck. . . . .	419
<i>lunulicornis</i> Schum. . . . .	421	<i>virgata</i> Coquill. . . . .	436

## Die Schildlausgattung *Gymnaspis*. (Hemipt.)

### II.

#### Von Leonhard Lindinger.

Jüngst fand ich auf einer brasilianischen *Anonacee* eine Diaspine, die ich beim ersten Anblick für junge Tiere eines *Chrysomphalus* hielt, für zweite Stadien von *Chr. perseae* etwa. Es waren nämlich flache braune Schilde mit zentraler, schwarzer Larvenhaut. Die mikroskopische Untersuchung zeigte aber, daß es sich um eine neue *Gymnaspis*-Art handelte. Von den 2 bisher bekannten Arten dieser Gattung weicht die neue Art in mancher Hinsicht stark ab. Da diese nach ihren Nährpflanzen benannt sind, habe ich es auch bei der neuen Art so gehalten, ich nenne sie

#### *Gymnaspis aberemoae* sp. n.

Schild vom ♀ rund, 1—1,3 mm im Durchmesser haltend, dünn, flach, durchscheinend, hornbraun mit schwarzer Larvenhaut.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [1910](#)

Autor(en)/Author(s): Riedel Max Paul

Artikel/Article: [Die paläarktischen Arten der Dipteren- \(Nematocera polyneura-\) Gattung Pachyrhina Macq. \(Dipt.\) 409-437](#)