© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

épine costale nulle. Pattes noires. — ♀ à pruinosité cendrée plus dense; l'abdomen vu d'arrière et à jour frisant, rayé transversalement de blanc au bord antérieur des segments.

Le ♂ a été trouvé à Bonifacio par M. Ferton le 7 octobre dans un nid de Bembex oculata Latr. Il y a une ♀ dans la collection de M. Schnabl et j'en ai capturé une autre à Vizzavona.

Remarque. — Cette Onesia paraît avoir une grande ressemblance avec O. (Pollenia) pulvillata Rond., mais elle s'en éloigne indubitablement par la coloration du scutellum et de l'abdomen.

138. *Onesia caerulea* Meig.
139. *Pollenia rudis* F.
140. *Rhynchomyia impavida* Rossi. — Une ♀ à Tattone.
141. *Stomatorrhina lunata* F.
142. *Phormia regina* Meig.
143. *Lucilia Caesar* L. et var. *ruficeps* Meig.
144. *Lucilia sericata* Meig.
145. *Calliphora erythrocephala* Meig.
146. *Calliphora vomitoria* L.
147. *Gastrophilus equi* F. ♀ à Pigna.
148. *Hypoderma bovis* L. var. *Bellieri* Big. — Un seule ♀, posée sur le sol, à Tattone.

Berichtigung.

In der Arbeit von J. Schnabl, Dipterologische Sammelreise nach Korsika, in dieser Zeitschrift Heft I. 1911, ist Folgendes zu berichtigen:

S. 74 Zeile 4 von oben lies: „als die hintere Querader“ statt „als der Abstand der beiden Queradern“.

S. 84 Nr. 69 lies: *Chirosia albitarsis* var. *Villeneuvi* n. var. ♂ ♀. Schnb.

S. 86 Zeile 11 von unten lies: „Abartnamen“ statt „Artnamen“.

S. 95 Nr. 114: = *fratercula* Mde. ist zu streichen.

S. 100 Nr. 169 erhält folgenden Zusatz:

Unter den korsikanischen Exemplaren der *P. cornicina* Fabr. finden sich am häufigsten Exemplare mit 2 Acrosticalborsten vor der Naht, einige wenige aber in meiner Sammlung haben nur eine oder keine solche Borste. Dr. J. Villeneuve, welcher zuerst meine Aufmerksamkeit auf diese Tatsache lenkte, betrachtet diese Exemplare als zu einer Art gehörige, als Varietät der *cornicina* Fabr., und ich teile seine Meinung, dafs man, um Gewifsheit zu erlangen, noch das Hypopyg beider Arten untersuchen mufs. Frey dagegen betrachtet die Form mit 2 Acrosticalborsten vor der Naht als besondere Art, *Ps. fennica* Frey. J. Schnabl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 1911

Autor(en)/Author(s): Schnabl Johann

Artikel/Article: Berichtigung. 130