

Hoplia fissipes n. sp.

♂. Brunnea, supra flavo-squamosa, elytris macula post-mediana brunnea; pygidio corporeque infra margaritaceo-squamosis; tibiis anticis tridentatis; antennis 9-articulatis. — Long. 4,5 mm.

♀. A mare differt: Supra, elytrorum macula brunnea post-mediana excepta, viridi-aureo-squamosa.

Hab.: Borneo (Brunei, Kina-Balu). Waterstradt leg.

Die Oberfläche ist beim ♂ mit Ausnahme des glänzenden Clypeus gelb beschuppt und beborstet. Die Schuppen auf Halschild und Flügeldecken sind rund und berühren sich meist nicht. Der braune Fleck, der sich hinter der Mitte der Flügeldecken befindet, entsteht nicht nur durch braune Färbung der Schuppen, sondern dieselben sind auch winzig klein, so daß der braune Untergrund sichtbar wird. Das Pygidium ist dicht beschuppt, die Schuppen sind von unregelmäßiger Gestalt und ebenso wie die der Unterseite silbern oder perlmutterfarben. Die Vorder-schienen sind dreizählig. Sämtliche Krallen, auch die Kralle der Hinterfüße, sind gespalten, wodurch sich diese Art leicht von der sehr ähnlichen *bimaculata* unterscheidet. An den Mittel- und Hinterfüßen ist die eine der beiden Krallen nur wenig kürzer als die andere.

Das ♀ unterscheidet sich vom ♂ nur dadurch, daß die Schuppen der Oberseite nicht gelb, sondern grüngoldig sind. Auf den Flügeldecken befindet sich ein gleicher brauner Fleck wie beim ♂.

Bemerkungen zu einigen Nonfriedschen Arten. (Col.)

Von J. Moser, Berlin.

Ich hatte Gelegenheit einige Nonfriedsche Typen zu erwerben, resp. zu vergleichen, und habe dabei folgendes festgestellt:

Hoplia marginata Nonfr. und *Hoplia tebinggana* Nonfr. gehören zur Melolonthiden-Gattung *Dejeania*.

Ectinohoplia Hüttenbacheri Nonfr. gehört zur Gattung *Hoplia*.

Hoplia Dombrowskii Nonfr. und *imitatrix* Nonfr. gehören zur Gattung *Ectinohoplia*.

Lachnosterna Wittkugeli Nonfr. = *setifera* Burm.

Diplotaxis Wittkugeli Nonfr. ist eine *Apogonia*-Art des indischen Gebiets.

Trichoderma ceylonica Nonfr. stammt nicht von Ceylon; ich besitze diese Art von Paraguay und gehört sie zur Gattung *Philochlaenia*.

Buprestis Wawari Nonfr. = *Salomoni* Thoms.

Conognatha Staudingeri Nonfr. = *excellens* Klug.

Chrysodema splendens Nonfr. = *Chrysaspis auricauda* Saund.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [1912](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Julius

Artikel/Article: [Bemerkungen zu einigen Nonfriedschen Arten. \(Col.\) 325](#)