

	Seite		Seite		Seite
<i>plagiatus</i> . . .	448	<i>rudis</i> . . .	456	<i>sulcistrotris</i> . . .	450
<i>plausibilis</i> . . .	448	<i>rubripes</i> . . .	456	<i>tibialis</i> . . .	451
<i>pubifer</i> . . .	447	<i>setosus</i> . . .	451	<i>uniformis</i> . . .	455
<i>quadrifasciatus</i> .	451	<i>seamaculatus</i> .	456	<i>vittatoides</i> . . .	455
<i>quadrinotatus</i> .	456	<i>striola</i> . . .	455	<i>vittatus</i> . . .	452
<i>quadripunctatus</i> .	449	<i>subcostatus</i> . .	448		
<i>regularis</i> . . .	455	<i>subnudus</i> . . .	450		

Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna Rheinlands. (Hemipt.)

Von **P. Radermacher**, Duisdorf bei Bonn.

Im Laufe der letzten 3 Jahre habe ich beim Käferfange eine Menge Hemipteren gesammelt. Die Tiere wurden mir in liebenswürdigster Weise von Herrn F. Schumacher-Kagel, Herrn Dr. J. Gulde-Frankfurt und Herrn Dr. Reichensperger-Bonn bestimmt, und ich erlaube mir den Herren an dieser Stelle nochmals ganz besonders für ihre aufgewendete Mühe meinen besten Dank abzustatten. In nachstehendem Verzeichnisse, welches 157 Arten meiner Sammlung umfaßt, möchte ich einen kleinen Beitrag geben zur Kenntnis unserer rheinischen Hemipterenfauna, besonders der Umgebung von Duisdorf. Die Wälder hieselbst gehören zu den Randwäldern des Kottenforstes. Ich fing in denselben, besonders im heißen Sommer 1911, mehrere selten bei uns vorkommende Arten, wie z. B. *Homodemus M-flavum* Goez., *Campyloneura virgula* H.-Sch., *Lopus cingulatus* F., *Adelphocoris reicheli* Fieb. u. a. Besonders verdient *Psallus argyrotichus* Fieb. der Erwägung (Schumacher det.). In meiner Sammlung befinden sich 2 Exemplare dieser seit 1861 verschollenen Art. Ich fand sie im Sommer 1910 an einer Hecke eines Waldbaches. Hueber bezeichnet ihn mit „?“ als Syn. von *Psallus salicellus* Mey. Ein kleiner Teil meiner Sammlung stammt aus der Umgebung meines Heimatsortes Löhndorf bei Sinzig, welches im Hellenbachtal, einem Paralleltale des Ahrtales, liegt. Soviel es mir nach meinen Beobachtungen möglich war, fügte ich bezüglich der Häufigkeit des Auftretens jeder Art eine kurze Notiz hinzu. Bei der Aufstellung des Verzeichnisses habe ich mich nach dem Katalog v. Hueber gerichtet und auch den einzelnen Arten die betreffende Nummer des Katalogs vorangesetzt.

9. *Eurygaster maura* Lin. Stommeln (Landkreis Köln), Duisdorf. Überall häufig.
- — v. *picta* Fab. Duisdorf.
17. *Brachypelta aterrima* Forst. Löhndorf.
21. *Sehirus bicolor* L. Stommeln, Löhndorf, Duisdorf, Immerath (Kreis Daun). Überall häufig.
24. *Gnathoconus albomarginatus* Goez. Stommeln, Löhndorf. Häufig.
34. *Aelia acuminata* Lin. Duisdorf.
40. *Eusarcoris aeneus* Scop. Duisdorf. Ziemlich häufig.
41. — *melanocephalus* F. Duisdorf. Auf *Stachys silvatica* mehrere Exemplare gefunden.
46. *Carpocoris purpuripennis* de G. Stommeln, Duisdorf. Sehr häufig.
49. *Dolycoris baccarum* L. Stommeln, Immerath, Löhndorf, Duisdorf. Sehr häufig.
50. *Palomena viridissima* Pod. Stommeln, Löhndorf, Duisdorf. Wie vorhin.
51. — *prasina* L. Duisdorf.
56. *Pentatoma rufipes* Lin. Löhndorf und Duisdorf. Sehr häufig.
58. *Eurydema festivum* L. Löhndorf. Häufig.
61. — *oleraceum* L. Stommeln, Löhndorf. Häufig an Kruziferen.
63. *Picromerus bidens* Lin. Duisdorf, Löhndorf, Stommeln. Sehr häufig.
65. *Troilus luridus* F. Wie vorhergehende.
70. *Acanthosoma interstinctum* Lin. Duisdorf, Löhndorf. Häufig.
72. *Elasmotethus griseus* Lin. Wie vorhergehende.
79. *Syromastes marginatus* Lin. Stommeln, Löhndorf, Duisdorf. Häufig.
83. *Gonocerus acuteangulatus* Goez. Stommeln.
86. *Bathysolen nubilus* Fall. Duisdorf.
96. *Alydus calcaratus* Lin. Löhndorf, Duisdorf, Stommeln. Häufig.
100. *Therapha hyoscyami* Lin. Löhndorf.
101. *Corizus crassicornis* v. *abutilon* Rossi. Duisdorf.
103. — *subrufus* Gmel. Löhndorf. Nicht selten.
109. *Myrmus miriformis* Fall. Löhndorf, Duisdorf. Sehr häufig.
113. *Berytus clavipes* Fab. Siegmündung.
129. *Nysius thymi* Wolff. Duisdorf. Häufig.
131. — *senecionis* Schill. Wie vorhergehende.
138. *Ischnorhynchus resedae* Pz. Desgl.
152. *Heterogaster urticae* Fab. Duisdorf.
167. *Rhyparochromus chiragra* F. Löhndorf.
169. *Pterotmetus staphylinoïdes* Burm. Wie vorige.
177. *Acompus rufipes* Wolff. Duisdorf. Nicht selten.
178. *Stygnocoris rusticus* Fall. Desgl.
179. — *pedestris* Fll. Duisdorf. Häufig.

180. *Stygnocoris fuliginus* Fourc. Duisdorf.
190. *Trapezonotus arcuarius* Lin. Duisdorf.
201. *Aphantis pini* Lin. Duisdorf.
209. *Eremocoris erraticus* F. Duisdorf, Löhndorf. Häufig.
214. *Drymus sylvaticus* F. Duisdorf.
215. — *brunneus* Sahlbg. Löhndorf.
217. *Scolopostethus affinis* Schill. Löhndorf, Duisdorf. Nicht selten.
219. — *decoratus* Hah. Desgl.
224. *Pyrrhocoris apterus* Lin. Duisdorf, Stommeln. Sehr häufig.
228. *Piesma maculata* Lap. Duisdorf. Häufig.
242. *Dictyonota fuliginosa* Cost. Duisdorf. Vereinzelt.
254. *Phyllotocheila cardui* Lin. Löhndorf.
269. *Monanthia echii* Wolff. Siegmündung.
291. *Aradus cinnamomeus* Pz. Duisdorf.
298. *Hydrometra stagnorum* Lin. Duisdorf. Häufig.
302. *Velia currens* Fab. Tümpel an dem westlichen Abhange des Kreuzberges bei Bonn.
309. *Gerris lacustris* L. Duisdorf, Stommeln, Löhndorf. Sehr häufig.
316. *Reduvius personatus* Lin. Stommeln, Duisdorf. Nicht selten.
324. *Nabis apterus*. Löhndorf, Duisdorf. Sehr häufig.
325. — *lativentris* Boh. Wie vorige.
326. — *major* Costa. Duisdorf, Löhndorf. Selten.
330. — *ferus* Lin. Löhndorf, Duisdorf. Nicht selten.
331. — *rujosus* Lin. Löhndorf, Duisdorf. Sehr häufig.
332. — *ericetorum* Schlz. Duisdorf.
342. *Salda saltatoria* Lin. Duisdorf. Nicht selten.
359. *Cimex lectularius* L. Duisdorf.
363. *Piezostethus galactinus* Fieb. Duisdorf.
365. — *cursitans* Fall. Löhndorf.
368. *Temnostethus pusillus* H.-Sch. Duisdorf.
373. *Anthocoris nemoralis*. Löhndorf.
- — v. *austriacus* F. Duisdorf.
376. — *Minki* Dohrn. Duisdorf.
- *pilosus* Jak. Duisdorf. Siegmündung.
378. — *nemorum* L. Duisdorf, Löhndorf. Sehr häufig.
382. *Triphleps nigra* Wlff. Löhndorf 27. XII. 12 unter der Rinde einer Buche gefunden, Duisdorf.
384. — *minuta* Lin. Löhndorf, Duisdorf. Sehr häufig.
397. *Miris calcaratus* Fall. Duisdorf. Häufig.
398. — *virens* L. Duisdorf.
399. — *laevigatus* L. Duisdorf, Löhndorf. Häufig.
400. — *holsatus* Fab. Wie vorhergehende.
401. *Megaloceraea erratica* L. Löhndorf.
- — v. *ochracea*. Desgl.

402. *Megaloceraea linearis* Fuessl. Duisdorf.
 403. — *ruficornis* Fourc. Duisdorf. Nicht selten.
 408. *Leptopterna ferrugata* Fll. Duisdorf, Lengsdorf bei Duisdorf.
 Häufig.
 409. — *dolabrata* L. Wie vorige.
 413. *Lopus gothicus* Lin. Duisdorf, Löhndorf. Nicht selten.
 414. — *cingulatus* Fab. Duisdorf, ziemlich häufig, Ruine Olbrück
 im Brohltal.
 416. *Phytocoris tiliae* Fabr. Duisdorf.
 417. — *longipennis* Flor. Duisdorf.
 418. — *populi* Lin. Duisdorf.
 421. — *pini* Kb. Duisdorf.
 422. — *ulmi* Lin. Duisdorf. Nicht selten.
 423. — *varipes* Boh. Löhndorf. Häufig.
 424. *Megacoelum infusum* H.-Sch. Duisdorf. Nicht selten.
 426. *Adelphocoris seticornis* Fab. Duisdorf. Häufig.
 427. — *reicheli* Fieb. Duisdorf, Löhndorf. Selten.
 430. — *lineolatus* Goetz. Löhndorf, Duisdorf. Häufig.
 434. *Calocoris ochromelas* Gmel. Duisdorf. Vereinzelt.
 437. — *fulvomaculatus* de G. Duisdorf. Häufig.
 442. — *bipunctatus* Fab. Duisdorf, Löhndorf. Häufig.
 444. *Homodemus M-flavum* Goetz. Lengsdorf bei Duisdorf. Selten.
 445. *Pycnopterna striata* Lin. Löhndorf, Duisdorf. Nicht selten.
 449. *Stenotus binotatus* F. Duisdorf. Nicht selten.
 450. *Dichroscytus rufipennis* Fall. Wie vorhergehende.
 453. *Lygus kalmii* Lin. Löhndorf, Duisdorf. Sehr häufig.
 454. — *pastinacae* Fall. Duisdorf.
 457. — *rubricatus* Fall. Duisdorf.
 459. — *pratensis* L. Duisdorf, Löhndorf. Sehr häufig.
 461. — *lucorum* Mey. Duisdorf.
 463. — *contaminatus* Fall. Duisdorf. Nicht selten.
 465. — *pabulinus* Lin. Desgl.
 467. *Camptozygum pinastri* Fall. Duisdorf. Sehr häufig.
 468. *Poeciloscytus unifasciatus* Fall. Duisdorf, Löhndorf. Nicht selten.
 473. *Charagochilus gyllenhali* Fall. Löhndorf.
 474. *Liocoris tripustulatus* Fab. Duisdorf, Löhndorf. Nicht selten.
 475. *Camptobrochis lutescens* Schill. Löhndorf, Duisdorf. Häufig.
 476. — *punctulatus* Fall. Löhndorf.
 482. *Capsus ruber* L. Duisdorf, Löhndorf. Häufig.
 — — v. *danicus* Fab. Duisdorf.
 483. *Rhopalotomus ater* L. Duisdorf. Häufig.
 — — v. *semiflavus* Lin. Stommeln, Lengsdorf.
 484. *Allaeotomus gothicus* Fall. Löhndorf, Duisdorf. Nicht selten.
 489. *Pilophorus perplexus* Scott. Duisdorf, Löhndorf.

496. *Orthocephalus mutabilis* Fall. Duisdorf.
 508. *Dicyphus pallidus* H.-Sch. Duisdorf.
 514. *Campyloneura virgula* H.-Sch. Duisdorf. Selten.
 515. *Cyllocoris histronicus* Lin. Duisdorf. Sehr häufig.
 516. — *flavonotatus* Boh. Duisdorf, im Melbtal bei Bonn. Ziemlich selten.
 517. *Aetorhinus angulatus* Fab. Löhndorf, Duisdorf. Vereinzelt.
 518. *Globiceps sphegiformis* Rossi. Duisdorf. Nicht selten.
 519. — *flavomaculatus* F. Löhndorf. Vereinzelt.
 520. — *selectus* Fieb. Duisdorf.
 528. *Orthotylus marginalis* Reut. Duisdorf.
 530. — *nassatus* F. Löhndorf.
 535. — *flavosparsus* Sahlbg. Duisdorf. Häufig.
 537. — *concolor* Kb. Löhndorf.
 540. — *ericetorum* Fall. Löhndorf, Duisdorf. Ziemlich häufig.
 544. *Heterotoma merioptera* Scop. Löhndorf, Duisdorf. Häufig.
 546. *Heterocordylus tumidicornis* H.-Sch. Duisdorf.
 547. — *genistae* Scop. Duisdorf. Ziemlich häufig.
 548. — *tibialis* Hah. Duisdorf. Ziemlich häufig.
 551. *Malacocoris chlorizans* Fall. Löhndorf, Duisdorf.
 561. *Megalocoleus pilosus* Schr. Löhndorf, Duisdorf. Häufig.
 572. *Macrotylus paykuli* Fall. Duisdorf.
 576. *Phylus melanocephalus* Lin. Duisdorf. Häufig.
 577. — *coryli* L. Lengsdorf. Häufig.
 580. *Psallus ambiguus* Fall. Duisdorf. Häufig.
 581. — *betuleti* Fall. Wie vorhergehende.
 583. — *variabilis* Fall. Desgl.
 585. — *quercus* Kb. Duisdorf.
 587. — *fallenii* Reut. Duisdorf. Nicht selten.
 592. — *roseus* Fab. Löhndorf, Duisdorf.
 — *argyrotrichus* Fieb. Duisdorf.
 596. *Atractotomus mali* Mey. Duisdorf.
 599. — *magnicornis* Fll. Duisdorf.
 604. *Plagiognathus chrysanthemi* Wlff. Duisdorf, Löhndorf. Nicht selten.
 606. — *arbustorum* F. Duisdorf, Löhndorf. Häufig.
 612. *Neocoris bohemani* Fll. Lengsdorf.
 613. *Campylomma verbasci* H.-Sch. Duisdorf.
 619. *Nepa cinerea*. Löhndorf, Duisdorf. Nicht selten.
 622. *Naucoris cimicoides* L. Duisdorf, Stommeln. Nicht selten.
 623. *Notonecta glauca* L. Stommeln, Löhndorf. Nicht selten.
 630. *Corixa hieroglyphica* Duf. Löhndorf.
 632. — *sahlbergi* Fieb. Stommeln. Häufig.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [1913](#)

Autor(en)/Author(s): Radermacher P.

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna Rheinlands. \(Hemipt.\) 457-461](#)