

Nachträge
zum Schilskyschen Verzeichnis der Käfer Deutschlands
von 1909 und einige sonstige Bemerkungen über
deutsche Käfer. (Col.)

Von P. Delahon, Luckenwalde.

Im folgenden beziehen sich die Zusätze: „Schilsky det.“, „vergessen“, „Schils.“ als Benenner neuer Aberrationen usw. auf seine eigenhändigen Zusätze zu Notizen, welche ich ihm im Februar und April 1910 übersandte. Seine mir schriftlich mitgeteilte Absicht, den Inhalt der Notizen ebenso wie von meinen früheren (vgl. D. E. Z. 1908 p. 599 ff.) zu publizieren, wurde durch seine leider zum Tode führende Erkrankung vereitelt. Die Notizen sind auf Schilskys Wunsch mit seiner gesamten sonstigen entomologischen Korrespondenz durch seine Tochter dem Deutschen Entomologischen Museum in Dahlem überwiesen worden, wohin ich sie nach Benutzung für das Folgende zurückgesandt habe. Dem Kustos des Museums, Herrn S. Schenkling, sage ich für die gütige Überlassung der Notizen und des Schilskyschen Handexemplars zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands (1909) herzlichen Dank. Wo unter A. im folgenden Schilsky nicht als Gewährsmann genannt ist, handelt es sich um spätere Funde, welche ihm nicht vorgelegen haben. Auch diese werden aber richtig bestimmt sein, wofür ich mich auf Schilskys Beurteilung meiner früheren Bestimmungen (D. E. Z. 1908 p. 599) berufen darf.

S. = Seite im Schilskyschen Verzeichnis, bei C. nicht.

* = In der Mark Brandenburg vorkommend.

A. Für die Mark Brandenburg neue Funde.

- * *Cicindela campestris* L. a. *impunctata* Westh. Bei Luckenwalde ♀ selten, ♂ häufiger als die Stammform, unter dieser.
- * *Cicindela campestris* L. a. *protos* D. Torre. Juni 1907. 2 St. (in meiner Sammlung) bei Rheinsberg unter der Stammform gefangen.
- * *Notiophilus biguttatus* F. mit nach vorn stark verlängertem Spitzenfleck. Vereinzelt bei Lck. (lies überall Luckenwalde). Diese Verlängerung wird von Schaum (Erichson u. a., Naturgeschichte der Insekten, I, S. 65) nur bei *substriatus* Waterh. = *punctulatus* Schaum erwähnt. Unausgefärbt?
- * *Amara tricuspidata* Dej. a. *lepidula* Letzn. 1 St. bei Lck. (in meiner Sammlung).

- * *Pterostichus cupreus* L. a. *rectangulatus* Letzn. Bei Lck. s. unter der Stammform. Schils. det.
- * *Anchomenus seapunctatus* L. Bei Lck. selten. Schils. det.
- * *Anchomenus lugens* Duft. v. *emarginatus* Letzn. Bei Lck., wie auch die Stammform sehr selten. 1 St. in meiner Sammlung.
- * *Quedius boops* Grav. v. *brevipennis* Fairm. Bei Lck. selten (Stammform häufig). 2 St. in meiner Sammlung.
- * *Gyrophaena Poweri* Crotch. Bei Rheinsberg im Juni 1907 (Schils. det.) und bei Lck. im Juni 1912 in Pilzen.
- * *Atheta hepatica* Er. 1 St. bei Lck. (in meiner Sammlung). Schils. det.
- * *Necrophorus humator* Goeze a. n. *Delahoni* Schils. Epipleuren rötlich. Am 16. IV. 08 1 St. mit mehreren zur Stammform gehörigen bei Lck. in einem Forstgraben gefangen. Am 29. IV. 11 1 St. in derselben Gegend (Belauß Klosterheide) an Krähenaas gefangen. Falls Schilskys Benennung als nomen i. litt. zu gelten hat: a. *rubropleuratus* Delahon. Beide Stücke in meiner Sammlung.
- * *Liodes dubia* Kugel. v. *consobrina* Sahlb. Bei Lck. nicht selten.
- * *Liodes dubia* Kugel. a. *longipes* Schmidt. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Liodes dubia* Kugel a. *bicolor* Schmidt. Bei Lck. nicht selten.
- * *Cercyon nigriceps* Marsh. a. n. *simplex* Schils. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung. Flügeldecken ganz dunkel. Falls n. i. litt.: a. *simplex* Delahon.
- * *Cantharis pallida* Goeze. Flügeldecken und Beine ganz gelbbraun, ziemlich dunkel. Dürfte zur a. *ustulata* Kiesw. gezogen werden können. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Malachius aeneus* L. a. *medius* Abeille. Am 3. VI. 11 1 St. bei Lck. (Dorf. Holbeck) auf Umbellaten, in meiner Sammlung. Die Stammform hatte ich 1911 bis dahin noch nicht gesehen.
- * *Coninomus nodifer* Westw. a. n. *rufescens* Delahon. Körper ganz rötlich. Am 1. VIII. 11 1 St. bei Lck. an schimmlichen Baumpilzen unter vielen schwarzen Stücken, daher schwerlich unausgefärbt, in meiner Sammlung.
- * *Subcoccinella 24-punctata* L. a. *nigra* Delahon. Der ganze Körper schwarz, ohne erkennbare rötliche Flecke. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Anatis ocellata* L. a. *bicolor* Weise. Am 2. VII. 11 1 St. bei Lck. im Kiefernwald tot in Spinnweben, in meiner Sammlung.
- * *Cyphon variabilis* Thunb. a. n. *nigricans* Schils. Oberseite ganz schwarz. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung. Falls n. i. litt: a. *nigricans* Delahon.

- * *Byrrhus fasciatus* Forst. a. *fuscus* Reitt. Bei Lck. nicht selten.
- * *Ernobius longicornis* Strm. a. *dilatipennis* Gerh. Bei Lck. selten.
- * *Rhinosimus ruficollis* L. Stirn nicht dunkel = a. *Roboris* Payk.?, deren Beschreibung mir fehlt (im Kuhnt nicht enthalten), 1 St. bei Lck. (Holbeck) auf einem ziemlich frischen Eichenstumpf, in meiner Sammlung. Am 20. V. 10.
- * *Notoxus monocerus* L. a. *latemaculatus* Pic. 2 St. (Mai 1910/11) bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Lagria atripes* Muls., Schils. det. Bei Lck. nicht selten im gemischten Gehölz auf Gräsern, Juni. Anfang Juli nur noch meist befruchtete ♀♀, welche auch bald verschwinden. *L. hirta* erscheint nach meinen Beobachtungen Ende Juni, Juli, und kommt bis in den Herbst hinein vor. Nach Schilskys Mitteilungen bezweifelt Prof. Seidlitz das Vorkommen von *L. atripes* für Deutschland!
- * *Scaphidema metallica* F. a. *bicolor* F. Bei Lck., wie die Stammform, ziemlich selten.
- * *Lema melanopus* L. Linke Flügeldecke rein blau, rechte rein grün. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung. Ähnliche Farbenabnormitäten sind bei *Platanus sericea* L. beobachtet. (D. E. Z. 1892 S. 416.)
- * *Crioceris asparagi* L. a. *cruciata* Schust.
- * *Crioceris asparagi* L. a. (v.) *Pici* Heyden.
- * *Crioceris asparagi* L. a. *incrucifer* Pic.
- * *Crioceris asparagi* L. a. *Linnei* Pic.
- * *Crioceris asparagi* L. a. *apiceconjuncta* Pic.
- * *Crioceris asparagi* L. a. *quadripunctata* Schust.

Alle diese Aberrationen, sowie auch a. *pupillata* Ahr. und a. *Schusteri* (in Schilskys Verzeichnis bereits mit *), fing ich bis auf *apiceconjuncta* (1 St.) und *pupillata* Ahr. (2 St.) in Mehrzahl bei Lck. auf einem schlecht gehaltenen, in Waldnähe und in einiger Entfernung von Gebäuden gelegenen Spargelbeet auf dem Spargelkraut im Juni und Juli 1910. 1911, 1912 viel seltener. Die Stammform (*asparagi* L. nach Weise: Chrys. S. 77, nach v. Heyden = *anticeconjuncta* Pic; syn. *normalis* Schust.) und die a. *trifasciata* Schust. (= *Linnei* Pic?) fand ich dort zur gleichen Zeit in sehr großer Menge, ebenso Larven in allen Entwicklungsstadien. Die Benennungen im Schilskyschen Verzeichnis stimmen mit v. Heydens Abhandlung (Wiener Ent. Zeitung, Jahrg. XXV, Heft II, III, IV) zum Teil nicht überein. Im Verzeichnis ist zu *asparagi* L. die a. *cruciata* Schust. gezogen. Bei letzterer ist aber nach v. Heyden die erste und dritte dunkle Binde aufgelöst, nämlich durch die weiße Färbung unter-

brochen, welche Weise übrigens als Grundfarbe annimmt. Nach ihm ist ferner die im Verzeichnis besonders angeführte a. *anticeconjuncta* Pic (mit syn. *normalis* Schust.) die eigentliche *asparagi* L. Die von Weise in Chrys. als Normalform angesehene Färbung findet sich im Verzeichnis Schilskys als a. *Linnei* Pic, welche Bezeichnung v. Heyden nicht erwähnt, mit dem syn. *trifasciata* Schuster besonders angeführt. Es bliebe demnach im Verzeichnis *cruciata* Schuster als a. zu bezeichnen und a. *anticeconjuncta* als syn. zu *asparagi* zu bringen. Ferner ist im Verzeichnis v. *Pici* Heyd. mit *campestris* L.? verbunden, was nicht zutreffen dürfte. Denn a. *Pici* Heyd. hatte dunkle Halsschildmitte und dunkle Beine und ist nach ihm und Weise = *campestris* F., während nach beiden Autoren *campestris* L. rote Beine hat. Letztere wäre also im Verzeichnis als a. besonders anzuführen. Für die Mark fehlen demnach nur noch: 1. a. *campestris* L. (nicht = v. *Pici* Heyden), 2. a. *Heydeni* Pic = *impupillata* Heyden non Pic, 3. v. *macilenta* Weise.

- * *Phytodecta 5-punctata* F. a. *nigriventris* Penecke. Bei Lck. mit der Stammform und anderen Aberrationen.
- * *Phaedon cochleariae* F. a. *neglectus* Sahlb., Schils. det. Bei Lck. nicht selten unter der Stammform. Nach Schilskys Mitteilung auch von Berlin bekannt.
- * *Phaedon cochleariae* F. a. n. *nigroaeneus* Delahon. Oberseite dunkel erzfarben. 1 St. (in meiner Sammlung) bei Lck. am 16. V. 11. Diese Färbung erwähnt Weise in Chrys. nicht.
- * *Lochmaea suturalis* Thoms. a. *nigrata* Weise, Schils. det. 1 St. am 11. X. 08 bei Lck. unter Birken von *Calluna vulgaris* gestrichen. Auf *Calluna* habe ich die Stammform häufig und oft in großer Menge, meist unter oder nahe bei Birken (nach Weise, Chrys. S. 614 neben Sumpfpflanzen und Weiden = Nahrungspflanze) angetroffen. Es ist daher zu vermuten, daß die Art auch an *Calluna* frisst. Herabgefallen oder vom Winde abgeschüttelt waren die Käfer kaum, da ich sie in Menge auch während windstillen Perioden so fand.
- * *Galeruca calvariensis* L. a. n. *nigrina* Delahon. Der ganze Körper dunkel, fast schwarz. 1 St. bei Lck. (Handwerkerbadeanstalt) am 16. VIII. 11, in meiner Sammlung. Der Käfer war völlig intakt, insbesondere auch hinsichtlich der Behaarung, und lebensfrisch. Auf Witterungseinflüsse wird diese abnorme Färbung daher nicht zurückzuführen sein, um so weniger, als ich gleichzeitig normale Stücke strich.
- * *Longitarsus melanocephalus* Deg. a. n. *nigrosuturalis* Delahon. Naht breit und alle Beine dunkel. 1 St. bei Lck. (Elstal) am

10. X. 08, in meiner Sammlung. Meines Wissens noch nicht, insbesondere von Weise: Chrys. S. 979, erwähnt.

- * *Phyllobius calcaratus* F. a. *tibialis* Schils. Bei Lck. nicht selten unter a. *atrovireus* und a. *densatus*. Die Stammform ist bei Lck. selten.
- * *Bagous glabirostris* Herbst a. *puncticollis* Boh., Schils. det. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Bagous nigritarsis* Thoms. Flügeldecken an der Spitze deutlich klaffend. Nach Schilskys Notiz = Monstrosität, immerhin wohl bemerkenswert, weil Schilsky (Küster, Bd. 44 S. 68) diese Bildung als besonderes Kennzeichen von *B. frit* hervorhebt. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Micrelus ericae* Gyll. a. *Olcesei* Pic. Der ganze Körper rötlich. Im April bei Lck. nicht selten mit der Stammform auf Calluna. Mit Schilsky halte ich die rötlichen Stücke für unausgefärbt, weil ich sie im Gegensatz zu den dunkleren meist noch nicht ausgehärtet fand.
- * *Ceutorrhynchus trisignatus* Gyll., Schils. det. Ein St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Ceutorrhynchus erysimi* F. a. *subniger* Gerh. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Bradybatus Kellneri* Bach a. *rufipennis* Reitt., Schils. det. 1 St. bei Lck. (Elstal). Die Stammform ist dort nicht eben selten, März, April, September, Oktober unter Birken und Hainbuchen gestrichen. Schils. det.
- * *Apion pallipes* Kirby, Schils. det. Bei Lck. (nur im Stärchen bei Holbeck) im Mai und Juni auf *Mercurialis perennis* (?).
- * *Apion variegatum* Wenck., Schils. det. Bei Lck. sehr selten von Gras in der Nähe von mit Misteln besetzten Kiefern gefangen. Lebt auf Misteln. Nach Schilsky (Küster, Bd. 42 S. 64) auf Korsika, in Frankreich, Tirol sehr selten. 2 St. von Lck. in meiner Sammlung, 1 ebendaher in der Schilskyschen Sammlung, welche vom Kgl. Zool. Museum in Berlin erworben wurde.
- * *Apion virens* Herbst a. *coeleste* Schils. Bei Lck. häufig.
- * *Diodyrhynchus austriacus* Ol. a. *castaneus* Schils. Bei Lck. selten, die Stammform dort häufig.
- * *Xyloterus signatus* F. a. n. *deletus* Schils., falls nom. i. litt = a. n. *deletus* Delahon. Flügeldecken ohne dunkle Zeichnung. 1 St. bei Lck., in meiner Sammlung.
- * *Aphodius borealis* Gyll. a. *Gyllenhali* Seidl. Bei Lck. selten.

B. Berichtigungen zum Schilskyschen Verzeichnis
von 1909.

- * *Cicindela campestris* L. a. *5-maculata* Beuthin (S. 1), * vergessen.
- * *Carabus clathratus* L. a. *cupreus* Schils. (S. 4), * vergessen.
- * *Dyschirius politus* Dej. a. *niger* Letzn. (S. 7). Ist im Verzeichnis überhaupt vergessen.
- * *Bembidium tenellum* Er. a. *triste* Schils. (S. 9), * vergessen.
- * *Panagaeus crux major* L. a. *trimaculatus* Dej. (S. 12), * vergessen.
- * *Chlaenius nigricornis* F. a. *cupreonitens* Letzn. (S. 12), * vergessen.
- * *Poecilus dimidiatus* Ol. a. *aeneus* Dej. (S. 18), * vergessen.
- * *Poecilus coerulescens* L. a. *subcyaneus* Prell. (S. 19), * vergessen.
- * *Hydroporus latus* Steph. (S. 25), * vergessen.
- * *Hydroporus halensis* F. (S. 25), * vergessen.
- * *Hydroporus rufifrons* Duft. (S. 25), * vergessen.

Die letzteren beiden Arten sind bei Lck. häufig, *rufifrons* sogar sehr. Sie werden auch bei Berlin gefangen; vgl. D. E. Z. 1913 S. 90, wo bereits auf den fehlenden * hingewiesen ist.

- * *Hydroporus memnonius* Nicol. (S. 26), * vergessen.
- * *Agabus biguttatus* Ol. a. *pauper* Schils. (S. 26), * vergessen.
- * *Dytiscus marginalis* L. v. ♀ *conformis* Kunze (S. 28), * vergessen.
- * *Dytiscus circumcinctus* Ahr. v. ♀ *dubius* Gyll. (S. 28), * vergessen.
- * *Glyptoma corticinus* Mot. (S. 29), * vergessen.
- * *Omalium rivulare* Payk. (S. 31), * vergessen.
- * *Trogophloeus fuliginosus* Grav. (S. 34), * vergessen.
- * *Stenus fuscicornis* Er. (S. 37), * vergessen.
- * *Paederus caligatus* Er. (S. 37), muß den * haben, welcher irrig zu *P. limnophilus* Er. gekommen ist.
- * *Staphylinus compressus* Marsh. v. *cerdo* Er. (S. 42), * vergessen.
- * *Emus hirtus* L. (S. 43), * vergessen.
- * *Quedius microps* Grav. (S. 43), * vergessen.
- * *Quedius ochripennis* Mén. v. *nigrocoeruleus* Fauv. (S. 43), * vergessen.
- * *Quedius ochropterus* Er. (S. 43), * vergessen.
- * *Mycetoporus brunneus* Marsh. (S. 44), * vergessen.
- * *Oligota atomaria* Er. (S. 47), * vergessen.
- * *Gyrophana pulchella* Heer (S. 47), * vergessen.
- * *Plaeusa adscita* Er. (S. 47), * vergessen.
- * *Atheta hygrotopora* Kr. (S. 50), * vergessen.
- * *Atheta picipennis* Mannh. (S. 52), * vergessen.
- * *Atheta clacula* Er. (S. 51), * vergessen.
- * *Atemeles emarginatus* Payk. (S. 54), * vergessen.
- Ilyobates brevicornis* Wasm. (Linz a. Rh., D. E. Z. 1902 S. 62)

ist versehentlich im Verzeichnis überhaupt nicht angeführt.
(S. 55.)

- * *Oxyptoda bicolor* Rey (S. 56), * vergessen.
- * *Dynarda dentata* Grav. (v.) Märkeli Kiesw. (S. 57), * vergessen.
- * *Aleochara crassicornis* Lac. (S. 57), * vergessen.
- * *Batriscus formicarius* Aub. (S. 59), * vergessen.
- * *Brachygluta xanthoptera* Reichb. (S. 59), * vergessen.
- * *Bryaxis longicornis* Leach (S. 59), * vergessen.
- * *Catops alpinus* Gyll. (S. 63), * vergessen.
- * *Necrophorus investigator* Zett. v. *microcephalus* Thoms. (S. 64), von mir mehrfach bei Lck. gefangen, im alten Verzeichnis mit *.
- * *Cantharis fulvicollis* a. *flavilabris* Fall. (S. 77), * vergessen.
- * *Cantharis lateralis* L. a. *notaticollis* Schils. (S. 77) ist versehentlich im Verzeichnis und im Catal. 1906 als syn. zu *xantholoma* gekommen. Notiz Schilskys. Vgl. auch D. E. Z. 1913 S. 92. Ich habe von Schils. det. Stücke bei Lck. gefangen.
- * *Charopus flavipes* Payk. (S. 79), * vergessen.
- * *Omosita depressa* L. (S. 85), * vergessen.
- * *Meligethes ovatus* Sturm (S. 85), * vergessen.
- * *Meligethes lugubris* Sturm v. *gagatinus* Er. (S. 86), * wohl auch nur vergessen. (Eigne Bemerkung.)
- * *Pocadius ferrugineus* F. (S. 86), * sicher nur vergessen. (Eigne Bemerkung.)
- * *Corticaria pubescens* Gyll. a. *piligera* Mannh. (S. 92), * vergessen.
- * *Corticaria impressa* Ol. a. *badia* Mannh. (S. 92), * vergessen.
- * *Mycetophagus 4-pustulatus* Müll. a. *antemacularis* Torre = *bipustulatus* Schils. (S. 93). Im alten Verzeichnis Schilskys (S. 54) mit *, nach D. E. Z. 1888 (S. 184): „Aus der Mark“. Schilsky notiert allerdings in meiner Zuschrift „nein“, ohne Angabe von Gründen.
- * (?) *Cis Perrisi* Ab. (S. 94), fehlt im neuen Verzeichnis Schilskys überhaupt. Die Art kommt nach Seidlitz: F. b. ed. II S. 268 bei Berlin vor. Schilsky notiert: „wohl falsch. Rtrr. D. E. Z. 78. 26. aus der Berliner Gegend. Im Nachtrag * aufführen als ?. Rtrr. im neuen Katalog führt P. auch nicht 'mal an.“ Im alten Verzeichnis (S. 88) mit *.
- * *Cis festivus* Gyll. (S. 94), von mir bei Lck. öfter an harten Baumschwämmen gefangen. Schilsky notiert: „finde kein Belegstück in meiner Sammlung“. Im alten Verzeichnis (S. 88 = Panz. ?) mit *. Meine Funde kannte Schilsky nicht.
- * *Hippodamia 7-maculata* Deg. a. *oblonga* Herbst (S. 97), * vergessen.
- * *Dermestes Erichsoni* Ganglb. (S. 103), * vergessen.
- Agritotes Esch. ustulatus* Schall. a. *flavicornis* Panz. (S. 107) fing ich im Juli 1910 mit der Stammform und a. *sputator* Redt.

bei Dessau. Im Verzeichnis ist bei *flavicornis* nur Els. angegeben.

- * *Cardiophorus rubripes* Germ. (S. 108), * vergessen.
- * *Athous niger* v. *scrutator* Herbst (S. 110), * vergessen.
- * *Ptinus brunneus* Duft. v. *hirtellus* Sturm (S. 116), * vergessen.
- * *Dryophilus longicollis* Muls. (S. 117), * vergessen
- * *Mesocoelopus niger* Müller (S. 118), * vergessen.
- * *Euglenes pygmaeus* Deg. (S. 120), * vergessen.
- * *Hapalus analis* Schaum a. *adustus* Schmidt (S. 122), * vergessen.
Mordella bisignata Redt. (S. 123), kommt nach D. E. Z. 1892 S. 200 in der Mark nicht vor, * fällt fort.
- * *Mordella fasciata* F. a. *briantea* Com. (S. 123), * vergessen.
- * *Mordella fasciata* F. a. *seriatoguttata* Muls. (S. 123), * vergessen.
- * *Mordella aculeata* L. a. *brevicauda* Costa (S. 123), * vergessen.
- * *Mordellistena stenidea* Muls. (S. 124), * vergessen.
- * *Anaspis pulicaria* Costa (S. 124). Schilsky notiert: „falsch bestimmt“, meine bei Lck. gefangenen Stücke werden aber sicher zu *pulicaria* gehören. Sie hatten Schilsky nicht vorgelegen.
- * *Orchesia acicularis* Reitt. (S. 125), * vergessen.
- * *Gonodera arenaria* Gerh. a. *testaceipennis* Gerh. (S. 126), kommt nach D. E. Z. 1909 S. 419 auch in der Mark vor. Schilsky notiert: „später erschienen“.
- * *Hypophloeus pini* Panz. (S. 129), * vergessen.
- * *Saperda perforata* Pall. (S. 138), * vergessen.
Aromia moschata L. (S. 135), kleines ♂ von schwärzlicher Färbung, von mir am 18. VII. 10 bei Dessau am Elbufer im Fluge gefangen. Es möchte der a. *nigra* Schils. angehören, welche nach dem Verzeichnis bisher nur von Metz bekannt war. Das Stück befindet sich zurzeit in der Bock-Sammlung des Böttchers Hermann Wieland hier, Haidestraße, welchem ich es überlassen hatte, weil ich vorzüglich märkische Käfer sammle.
- * *Crioceris merdigera* L. (S. 140), * vergessen.
- * *Crioceris asparagi* L. (S. 140) und Aberrationen. Vgl. hierzu das zuvor unter A. Bemerkte.
- * *Labidostomis humeralis* Schneid. (S. 141), * vergessen.
- * *Cryptocephalus pini* L. Stammform (S. 143), * vergessen.
- * *Cryptocephalus Moraei* L. (S. 143), * vergessen.
- * *Claysomela sanguinolenta* L. (S. 145), * vergessen.
- * *Phytodecta 5-punctata* F. a. *unicolor* Weise (S. 147), * vergessen.
- * *Plagioderia versicolora* Laich. (S. 148), * vergessen.
- * *Aphthona nigriceps* Redt. (S. 153), * vergessen.
- * *Aphthona lacertosa* Rosh. (S. 153), * vergessen.

- * *Longitarsus obliteratus* Rosh. (S. 153), * vergessen.
- * *Tropideres undulatus* Panz. (S. 157), nach D. E. Z. 1891 S. 156 in der Mark gefangen. Schilsky notiert hierzu: „war falsch bestimmt (= *sepicola*)“. Ich habe aber 3 Stücke bei Lck. gefangen, welche sicher zu *undulatus* und nicht etwa auch zu *sepicola* gehören; *sepicola* habe ich auch bei Lck. gefangen.
- * *Opanthribus tessellatus* Boh. (S. 158), * vergessen.
- * *Polydrosus pterygomalis* Boh. (S. 163), * vergessen.
- * *Chlorophanus viridis* L. (S. 167), fehlt überhaupt, vergessen.
- * *Acalles turbatus* Boh. (S. 174), * vergessen.
- * *Ceutorhynchus pyrhorhynchus* Marsh. (S. 176), * vergessen.
- * (?) *Sibinia femoralis* Germ. (S. 180), im alten und neuen Verzeichnis mit * angeführt, fehlt im Küster, Bd. 45, und in den Kuhntschens Tabellen. Schilsky notiert: „Irrtümlich in beiden Verzeichnissen mit * angegeben“. Zu einer früheren schriftlichen Bemerkung von mir (Februar 1910), dafs *S. femoralis* im Küster fehle, notiert Schilsky: „*S. femoralis* erst später als * erhalten“.
- * *Orchestes alni* L. a. *maculicollis* Schils. (S. 180), beschrieben D. E. Z. 1908 S. 607, fehlt im Verzeichnis überhaupt, vergessen.
- * *Mecinus janthinus* Germ. (S. 180), * vergessen.
- * *Gymnetron veronicae* Germ. a. *nigrum* Walton (nec Hardy!) (S. 181), * vergessen.
- * *Apion viciae* Payk. a. *Griesbachi* Steph. (S. 184), * vergessen.
- * (?) *Apion elongatum* Germ. (S. 184), im alten Verzeichnis mit *. Schilsky notiert hierzu nichts. Die Art ist weder nach Küster, Bd. 39 S. 45, noch nach den Kuhntschens Tabellen aus der Mark bekannt.
- * *Apion striatum* Kirby (S. 185), im alten Verzeichnis mit *. Schilsky notiert: „ich sah noch keine *“. Von mir sind aber 3 hierher gehörige Stücke bei Lck. gefangen, welche Schilsky nicht gesehen hatte.
- * *Apion meliloti* Kirby (S. 185), im alten Verzeichnis mit *. Schilsky notiert: „ich sah noch keine *“. Ich fing die Art bei Lck. nicht selten, wovon Schilsky keine Kenntnis hatte.
- * (?) *Apion alcyoneum* Germ. (S. 185), im alten Verzeichnis mit *. Schilsky notiert: „ich sah noch keine *“. Nach Seidlitz' Fauna balt. ed. II soll die Art bei Berlin vorkommen. Vielleicht beruht diese Angabe aber nur auf Schilskys altem Verzeichnis.
- * *Apion flavipes* a. ♂ *apicerostre* Desbr. (S. 184) ist mit * angeführt und nicht eingerückt. Die a. fällt nach Schilskys Beschreibung in Küster, Bd. 38 S. 81, mit der vorangehenden * a. *Lederi* Kirsch zusammen.

- * *Rhynchites interpunctatus* Steph. (S. 186), im alten Verzeichnis mit *. Schilsky notiert: „in der Mark?“. Ich habe 2 Schilsky unbekannt gebliebene Stücke bei Lck. gefangen.
- * *Dendroctonus micans* Kugel (S. 187), * vergessen.
- * (?) *Aphodius borealis* Gyll. (S. 191), im alten Verzeichnis mit * (vgl. *sedulus*). Da ich bei Lck. 2 zur a. *Gyllenhali* Seidl. gehörige Stücke gefangen habe (vgl. A.), möchte sich die Stammform auch noch in der Mark finden oder schon gefunden sein.
- * *Aphodius melanosticticus* Schmidt (S. 192), * vergessen.
- * *Aphodius sticticus* Panz. (S. 192), * vergessen.
- * *Aphodius luridus* a. *variegatus* (S. 193) ist im Verzeichnis doppelt angeführt.
- * *Aegialia rufa* F. (S. 193), * vergessen.
- * *Odontaeus armiger* Scop. (S. 193), * vergessen. Nach Schilskys Mitteilung laut Herbst I S. 302 vor 1785 einmal bei Berlin gefangen.
- * *Geotrupes mutator* Marsh. a. *violaceus* Westh. (S. 193), * vergessen.
- * *Maladera holosericea* Scop. a. *fusca* Muls. (S. 195), * vergessen.
- * *Anomala aenea* Dej. a. *cuprea* Westh. (S. 196), * vergessen.
„Vergessen“ habe ich bei dieser und der folgenden a. ergänzt, weil ich Schilsky seinerzeit Stücke von Lck. vorgelegt hatte, deren Determination von ihm nicht beanstandet worden war.
- * *Anomala aenea* Dej. a. *maculata* Schils. (S. 196), * vergessen.
Vgl. das bei a. *cuprea* Bemerkte.
- * *Anomala aenea* Dej. a. *cyanea* D. Torre (S. 196) kommt nach D. E. Z. 1888 S. 184 in der Mark vor. Ich habe auch 1 St. bei Lychen in der Mark gefangen.

C. Sonstige Bemerkungen.

In Schilskys Besprechung meiner früheren Funde aus der Mark, insbesondere aus der Umgegend Luckenwaldes, D. E. Z 1908 S. 599 ff., ist folgendes zu berichtigen bzw. nachzutragen:

- * S. 601. *Atomaria*: Druckfehler „*procoerulea*“. Es muß heißen: „*procerula*“.
- * S. 601. Statt *Paederus limnophilus* Er. muß stehen *P. caligatus* Er.; *limnophilus* ist aus der Mark noch nicht bekannt, vgl. B. (S. 37).
- * S. 601. *Micrambe abietis* Payk. Das Stück hatte ich bei Rheinsberg in der Mark unter Kiefern gefangen, später habe ich eins auch bei Lck. unter Kiefern gestrichen.
- * S. 603. *Lina collaris* v. *daurica* Weise hatte ich auf Espen-,

nicht auf Erlengesträuch gefangen. Weise erwähnt in *Chryso-*
melidae S. 562 nur Salixarten als Nährpflanzen.

S. 600 muß zwischen *Poecilus* und v. *subcyaneus* Letzn. stehen
„*versicolor*“.

**Hydroporus dorsalis* (S. 600), später öfter bei Lck., *v. *transversalis*
D. Torre (S. 600) noch 1 St. bei Lck., **Mycetoporus Mul-*
santi Ganglb. (S. 601) noch öfter bei Lck., **Rizophagus*
ferrugineus Payk. (S. 601) noch 2 St. bei Lck., **Cantharis*
oralis v. *notaticollis* Schils. (S. 602) noch 1 St. bei Lck.,
**Pedinus femoralis* L. (S. 602) noch 1 St. in Lck. auf einem
Gehöft, **Haltica oleracea* v. *nobilis* Weise (S. 604) öfter bei
Lck., **Aphthona euphorbiae* v. *cyaneus* Weise (S. 604) noch
1 St. bei Lck. gefangen.

**Pityophthorus Lichtensteini* Ratzeb. Das in der Besprechung nicht
erwähnte, von mir bei Lck. gefangene und Schilsky vor-
gelegte Stück ist das im folgenden XII. Beitrag zur deutschen
Käferfauna S. 608 erwähnte. (Notiz Schilskys zu einer
Anfrage von mir.) Schilsky hat das Exemplar behalten,
ein weiteres später von mir bei Lck. gefangenes befindet
sich in meiner Sammlung.

Ein für Deutschland neuer Käfer, sowie einige neue oder bemerkenswerte Fundorte deutscher Käfer. (Col.)

Von Bergreferendar **Riehn**, Clausthal.

Studium und Ausbildung führten mich in den letzten Jahren
in die verschiedensten Gegenden Deutschlands. Meist hatte ich
Zeit, von meinen Aufenthaltsorten ziemlich umfangreiches Coleo-
pterenmaterial mitzubringen, und es ist nicht verwunderlich, daß
ich dabei auch manche Beobachtung machte, die wohl weitere
Kreise interessieren wird. Ich möchte im folgenden eine kleine
Blütenlese von faunistisch mehr oder weniger bemerkenswerten
Funden veröffentlichen.

Zunächst macht es mir eine große Freude, die Zahl der in
Deutschland vorkommenden Arten um eine bereichern zu können.
Es handelt sich um *Bryoporus castaneus* Hardy¹⁾, den ich am
4. IV. 11 in Clausthal im Garten meines Elternhauses in 1 Exemplar
aus Laub siebte. Die Bestimmung des Tieres, die mir zuerst viel

¹⁾ Hardy et Bold. Trans. Tynes. Nat. Club. 1851. II. 78.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [1913](#)

Autor(en)/Author(s): Delahon Paul

Artikel/Article: [Nachträge zum Schilskyschen Verzeichnis der Käfer Deutschlands von 1909 und einige sonstige Bemerkungen über deutsche Käfer. \(Col.\) 529-539](#)