

die Flecke in den Feldern 3—6 bilden eine fast gerade, von den anderen Flecken meistens breit getrennte Reihe, worin der Fleck im Felde 5 immer kleiner ist und ausnahmsweise fehlen kann. Im Hinterflügel sind nur 2 Flecke, nämlich in 2 und 3. — Antennen ziemlich lang bipectinat. Hinterflügel normal und ebenso Stirn. Flügelspannung 17—18, Vorderflügelänge 9—10 mm.

Die Haftborste ist schwer zu erkennen, bei einigen jedoch unverkennbar geteilt, und ich glaube, daß alles ♀♀ sind.

2 Ex. von Kankau zeichnen sich dadurch aus, daß im Hinterflügel ein ganz kleiner dritter Fleck, und zwar hinter der Zelle, vorhanden ist (ab. *trifenestrata* Strd. n. ab.).

Gen. *Euchromia* Hb.

Euchromia orientalis Butl.

Keins der 7 vorliegenden Exemplare gehört der ab. *formosana* Btl. an, die wahrscheinlich auf Formosa wie anderswo als echte Aberration auftritt. — Sie stammen von Tainan, Kankau (Koshun) und „Formosa“.

Ob man mit Hampson diese Form als Subspecies von *E. polymena* L. oder als gute Art auffassen will, ist fast eine Geschmacksache.

Die von Hampson als „Ab. 2“ bezeichnete Form von Nieder-Burma (Cat. Lep. Phalaenae Brit. Mus. I. p. 298), die folgenderweise charakterisiert wird: „Tegulae and bands of Abdomen orange, the bands on 4th segment interrupted by black lobes from the 3^d, uneven on the two sides (♂)“ nenne ich ab. *burmana* m.

Propylaea 14-punctata L. a. *Merkeri* nov. (Col.)

Von H. Wendeler, Berlin.

Das Tier ist, bis auf geringe Reste der Gelbfärbung, schwarz. Clypeus-Vorderrand gelb. Bei dem Halsschild sind die Vorderecken, in den Randkanten, schmal gelb gesäumt. Desgleichen die Schulterrundung und das letzte Drittel der Seitenrandkante der Flügeldecken. Die Epipleuren der Flügeldecken weisen Gelbfärbung auf, die nach der Flügeldecken-Randkante zu verdunkelt wird. Beine vollkommen schwarz.

Das beschriebene Tier, ♂, wurde in copula mit ♀ der Stammform, in einem Garten in nächster Nähe der Jungfernheide (Berlin-Siemensstadt) erbeutet.

Ich widme diese anscheinend seltene Aberration meinem lieben Freunde Kurt Merker, von dem ich diesen interessanten Käfer erhielt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [1915](#)

Autor(en)/Author(s): Wendeler Hans

Artikel/Article: [Propylaea 14-punctata L. a. Merkeri nov. \(Col.\) 35](#)