


Actinobolus talpipes n. sp. (Col. lamell. Dynastin.)

Von Dr. F. Ohaus, Berlin-Steglitz.

Oblongus, cylindricus, fuscobrunneus, nitidus, supra glaber, subtus pectore et coxis dense et breviter rufopilosus. Tibiae anteriores lobatim dilatatae. Long. 27, lat. 12 mm. ♀. Paraguay.

Gestreckt, zylindrisch, oben etwas heller, unten dunkler rotbraun, glänzend, Oberseite und Afterdecke kahl, unten die Brust und Hüften dicht behaart, die Schenkel und Bauchringe nur mit Querreihen sehr kurzer roter Borsten. Kopfschild direkt von oben gesehen nahezu halbkreisförmig, der Rand sehr hoch aufgeworfen, in der Mitte gleichmäßig etwas niedriger, sonst ohne alle Zacken, Zähne oder Ausbuchtungen, nur hinten beiderseits über der Wurzel der Augenkiele scharf rechtwinklig abfallend, seine Höhe vorn über der Oberlippe etwa so lang wie 2 Fufstarsenglieder; die Oberfläche ist vertieft, mit einzelnen und zusammenstossenden seichten Ringpunkten bekleidet; Stirnnaht verloschen, Stirn und Scheitel gröber skulptiert.



Halsschild kaum $\frac{1}{3}$ breiter als lang, die Seiten in der Mitte erweitert, die spitzen Vorderecken nur ganz kurz, aber scharfwinklig vorspringend, die stumpfen Hinterecken gerundet, der Vorder- und Hinterrand gerade, ringsum mit feiner Randfurche, die mittlere Längsfurche sehr seicht, nur in der Mitte deutlich, vorn und hinten verloschen, vorn mit 2 kräftigen breiten Höckerchen; die Oberfläche ist zumal vorn mit groben tiefen Ringpunkten bedeckt, die hier vielfach seitlich zusammenstossen, an den Seiten nach hinten zu vereinzelt stehen und flacher werden, um hinten beiderseits neben den groben Punkten der Mittellinie in einfache flache Punkte überzugehen. Schildchen nur in den Vorderecken mit je 2—3 Punkten. Die Deckflügel sind gefurcht und in den Furchen mit Reihen grosser Ringpunkte, das erste oder subsuturale Interstitium nur mit einigen wenigen Punkten vorn, das zweite mit einigen mehr auf dem Spitzenbuckel. Propygidium und Pygidium dicht mit einzelnen grossen Ringpunkten bedeckt, matt bis auf den Hinterrand des ersteren. Bauchringe mit einer Querreihe, Brust und Hüften dicht einzeln mit grossen Ringpunkten bedeckt. Die Vorderschienen sind ganz auffallend breit, mit 3 grossen Zähnen, deren basaler bis zum Kniegelenk lappenartig verbreitert ist; ihre Dorsalseite trägt 2 Längsfurchen, die mit Ringpunkten und kurzen Bosten besetzt sind; der Sporn ist auffallend lang und stark. Mittel- und Hinterschienen mit je 2 grossen gezähnten schiefen Querkanten, ihr Spitzenrand mit 3 grossen Zähnen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [1915](#)

Autor(en)/Author(s): Ohaus Friedrich

Artikel/Article: [Actinobolus talpipes n. sp. \(Col. lamell. Dynastin.\) 608](#)