

Ein neuer *Hoplorhinoides* (Curcul.) aus Zentral-Amerika.  
(6. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.)

Von Eduard Vofs, Waldsiedlung Spandau.

*Hoplorhinoides palmarum* n. sp.

Der f. *macropa* Redtb. unseres *Dorytomus longimanus* Forst nicht unähnlich; die Vorderbeine sind viel länger als die übrigen.

Kopf klein, breiter als lang; Stirn schwach eingedrückt; Schläfen seicht gerundet, beim ♀ so lang, beim ♂ kürzer als die Augen. Punktierung fein und dicht. Rüssel des ♂ so lang wie Kopf und Halsschild zusammen, wenig gebogen, kräftig; der des ♀ länger, viel dünner und stärker gebogen; beim ♂ der Länge nach gekielt, seitlich mehrfach längsgerinnt, an der Fühler-einlenkung knotig verstärkt, in der Mitte zwischen dieser und der Spitze seitlich mit schwachem Buckel. Fühlerfurche tief, nach hinten verbreitert und zu den Augen gerichtet. Mandibeln innen kräftig dreizählig. Rüssel des ♀ durchaus glatt, rund und glänzend, an den Seiten nur sehr fein punktiert. Fühler des ♂ vor, des ♀ hinter der Rüsselmittle eingelenkt. Schaftglied so lang wie die Geißel. 1. Geißelglied am längsten; 2. Glied kürzer; 3., 4., 6. und 7. Glied nur halb so lang wie das 2.; 5. Glied etwas kürzer, aber noch deutlich länger als breit. 1. Glied der Keule lang, die nächsten sehr kurz. — Halsschild so breit wie die Flügeldecken, seitlich gerundet, zum Vorderrand stark verengt, hier so breit wie der Kopf an seiner Basis; zur Basis wenig verschmälert. Punktierung sehr fein und dicht. — Schildchen dreieckig. — Flügeldecken mehr als zweimal so lang wie breit, seitlich parallel, hinten gerundet zugespitzt. Punktreihen mäsig stark und sehr flach; Zwischenräume breiter als die Streifen, durchaus flach. — Schenkel gezähnt. Klauen nicht gezähnt, sondern vor der Basis nur stumpf gebuckelt.

Färbung gelb; Rüssel tiefschwarz. — Behaarung auf den Decken kaum erkennbar, äußerst kurz anliegend.

L. = 5,5—7,5 mm (s. r.).

Ein ♀ und einige ♂♂ aus Costa Rica<sup>1)</sup>: Surrubres (400 Fufs Höhe), in meiner Sammlung. Im Juni in Palmenblüten gefunden.

<sup>1)</sup> Während der Drucklegung erhielt ich ein weiteres ♀ von Herrn A. Heyne aus Turrialba (Costa Rica).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [1921](#)

Autor(en)/Author(s): Voß Eduard

Artikel/Article: [Ein neuer Hoplorhinoide \(Curcul.\) aus Zentral-Amerika. \(6. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.\) 80](#)