

Die Deutung der Walkerschen Brenthiden.

Von R. Kleine, Stettin.

Walker hat 6 Brenthiden, sämtlich von Ceylon, beschrieben (Ann. Mag. Nat. Hist. (3), III, 1859, p. 262). Die Deutung war nach den gegebenen Beschreibungen unmöglich, nur soviel war festzustellen, daß sie sämtlich nicht in die Gattungen hineingehörten, in denen sie im Catal. Col. von Junk zu finden sind. Ich habe daher die Walkerschen Brenthiden auch ganz außer Betracht gelassen, weil eine Identifizierung ohne Vergleichsmaterial nicht möglich war. Durch gütige Vermittlung von Herrn Prof. Arrow vom Britischen Museum in London konnte ich die Walkerschen Arten richtigstellen.

1. *Cerobates aciculatus* = *Euphenges aciculatus*, also zu den Belopherini und nicht zu den Stereodermini gehörig. Von *E. ceylonicus* Calabr. durch andere Anlage der Deckenzeichnung verschieden.
 2. *Arrhenodes approximatus* = ♀ von *Baryrrhynchus miles* Boheman.
 3. *Arrhenodes facilis* ist nach Mitteilung Prof. Arrows nicht mehr in der Sammlung und seiner Meinung nach überhaupt keine Brenthide.
 4. *Ceocephalus cavus* = *Opisthenoplus cavus*.
 5. *Nemocephalus planicollis* ist im Cat. Col. in der Gattung *Ithystenus* zu finden. Es ist *Caenorychodes indus* Kirsch, welcher Name damit synonym wird.
 6. *Nemocephalus spinirostris* findet sich im Cat. Col. sowohl unter *Ithystenus* wie *Ectoцемus*. Es handelt sich um *Ectoцемus cinnamomi* Herbst (*quatuordentatus* Desbr., *spathulirostris* Chev.-Lacord., *pubens* Kirsch). Also eine oft beschriebene Art von weiter Verbreitung im orientalischen Gebiet.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [1923](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Die Deutung der Walkerschen Brenthiden. 90](#)