

daraus, daß der vorliegende Zuchtversuch nicht dem *Lionotus*, sondern der *Ensliniella* galt, so daß auf das Wohlbefinden des *Lionotus* als „Nebenperson“ hier nicht die Sorgfalt verwandt wurde, die ihm eigentlich hätte zukommen müssen.

---

### Nachschrift.

Die hier niedergelegten, im Juli 1924 abgeschlossenen Beobachtungen müssen noch dahin ergänzt werden, daß das Berliner Museum mir dankenswerterweise am 15. November 1924 Gelegenheit gab, festzustellen, daß in seinen Beständen mehrere Exemplare von Imagines von *Odynerus (Lionotus) rossii* Lepeletier de St. Fargeau, die am 12. Juni 1918 in Bialowies in Rußland erbeutet wurden, mit den gleichen Deutonymphae behaftet sind, wie hier beschrieben. Der Parasitismus von *Ensliniella parasitica* scheint also weder örtlich noch speziell allzu eng begrenzt zu sein.

---

Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus  
Deutschland.

Von Paul Delahon, Luckenwalde, Treuenbrietzener Str. 122.

### XIV.

\* = kommt in der Mark Brandenburg vor.

Lck. = Luckenwalde.

### I. Im Verzeichnis Schilskys ohne \* oder überhaupt nicht angeführte Nominatformen und benannte Abweichungen<sup>1)</sup>.

\* *Cicindela hybrida* L. f. *bipunctata* Letzn., bei Lck. öfter mit der Nomf. von mir gef., dürfte auch sonst in der Mark vorkommen.

\* *Calesoma sycophanta* L. f. *purpureo-aurea* Letzn. (F. germ., neu für Schilskys Verz.), bei Lck. in manchen Jahren mit der Nomf., auch in der Nähe von Berlin gef. G. Reineck!

\* *Hygrotus versicolor* Schall. f. *collaris* Panz., bei Lck. öfter von mir mit der Nomf. gef. 4 St. ex coll. G. Reineck erh., bez.: Bredow. Forst-Nauen, G. Reineck, 24. 5. 22.

---

<sup>1)</sup> Wo nichts anderes bemerkt, befinden sich Belegst. in meiner Sammlung.

- \**Stenus melanopus* Mrsh. kommt nach F. germ. in der Mark vor.
- \**Cryptobium fracticorne* Payk. f. *brevipennis* Rey, von mir öfter bei Lck. mit der Nomf. gef.
- \**Necrophorus humator* Goeze f. (nova) *signiceps* m. Der sonst wie die Nomf. gefärbte Käfer hat auf dem Scheitel einen ziemlich scharf begrenzten und deutlich hervortretenden runden roten Fleck. In Entom. Bl. 1909 p. 73 ff. sind die bisher bekannt gewordenen Formen der Art zusammengestellt und beschrieben. Die f. n. findet sich dabei nicht erwähnt. Sie wird sicher sehr selten vorkommen und dürfte einen eigenen Namen verdienen, da nach der Zusammenstellung auch geringfügiger gefleckte Formen benannt sind. Das einzige wohl bisher bekannte St. wurde mir von Herrn G. Reineck gütigst überlassen. Es trägt die Bezeichnung: Karow-Berlin, 24. 4. 24, G. Reineck. Verfasser der oben genannten Zusammenstellung ist H. Bickhardt.
- \**Dasytes aerosus* Kiesw. f. *variicornis* Schils., bei Lck. von mir vereinz. mit der Nomf. gef.
- \**Dasytes plumbeus* Müller f. *nigrofemoralis* Schils., ebenso.
- \**Atomaria proluxa* Er. f. *pulchra* Er., 1899 von mir 1 St. bei Lck. gef., Näheres nicht erinnerlich.
- \**Olibrus millefolii* Payk., im Verzeichnis Schilskys von 1909 ist der im Verz. von 1888 vorhandene Stern offenbar nur vergessen. Der Käfer ist wohl überall in der Mark häufig auf Achillea.
- \**Exochomus flavipes* Thunb., 4 St. ex coll. G. Reineck, bez. Bork Mk. Brand., 16. 9. 23, blüh. Erica, G. Reineck.
- \**Leptura maculata* Poda f. *sinuata* F., 1 St. ex coll. G. Reineck, bez.: Brieselang-Nauen, 8. 6. 24, G. Reineck.
- \**Chrysomela cerealis* L. f. *ornata* Ahr. wurde nach Mitt. des Herrn G. Reineck von Herrn Karl Schubert bei Tegel-Berlin gef. Kein Belegst. in m. S.
- \**Chrysomela graminis* L. f. *fulgida* F., 4 St. ex coll. G. Reineck, bez. Brieselang-Nauen, G. Reineck.
- \**Phytodecta viminalis* L. f. *gradli* Heyd., 1 St. ex coll. G. Reineck, bez.: Brieselang-Nauen, 27. 5. 23, G. Reineck.
- \**Melasoma collaris* L. f. *thoracica* Ws. wurde nach Mitt. des Herrn G. Reineck in der Mark gef., Näheres steht noch aus, kein Belegst. in m. S.
- \**Galerucella calvariensis* L. f. *lythri* Gyll., bei Lck. und Sperenberg i. d. Mark von mir öfter, auch mit der Nomf., auf Lythrum gef. Nach Weise (*Chrys.*) meist unausgefärbte St.

- \* *Acanthoscelides obtectus* Say  $\times$  (eingeschleppt), 3 St. ex coll. G. Reineck, bez.: Berlin, II. 23, G. Reineck.
- \* *Pachymerus chinensis* L.  $\times$ , 7 St. ex coll. G. Reineck, bez.: Berlin, II. 23, aus China  $\times$ , G. Reineck.
- \* *Cryptorrhynchus lapathi* L. f. *obsoleta* Reitt. (F. germ., neu für Schilskys Verz.), 1 St. ex coll. G. Reineck, bez.: Hohen-Schönhausen-Berlin, 3. 6. 21, G. Reineck.
- \* *Sibinia primita* Herbst f. *signata* Gyll., im alten Verz. Schilskys nicht, im neuen ohne \*, in Küster K. Eur. Bd. 45 von Schilsky als syn. angef., fing ich in einem von Schilsky determ. St. etwa 1904 bei Lck. Näheres nicht erinnerlich.
- \* *Sibinia pellucens* Scop. f. *roelofsi* Desbr., bei Lck. öfter, bei Jüterbog am 3. 6. 21 ein St. von mir mit der Nomf. auf Melandryum (Lychnis) gef. Kommt wohl mit der Nomf. überall vor. (F. germ., neu für Schilskys Verz.).
- \* *Eccoptogaster carpini* Rtz. f. *peregrina* Eggers, durch H. Wieland hier ein von ihm IV. 21 bei Lck. (Stärtchen) unter Eichen und Hainbuchen gef. St. erh. (F. germ., neu für Schilskys Verz.).
- \* *Pityophthorus micrographus* L., am 24. 6. 05 von mir 1 St. bei Lck. (Teerofen) im Kiefernwald gestr.
- \* *Balanobius crux* F. f. *flavotomentosa* Fiedler (D. E. Z. 1914, S. 625). 1. St. von mir bei Lck. gestr.
- \* *Gnorimus nobilis* L. f. *cuprifulgens* Reitt., nach einer Notiz von Herrn G. Reineck am 19. 6. 19 bei Buch-Berlin auf Heckenrosen und am 19. 6. 22 dort auf Hollunderblüten gef.

## II. Sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland.

- \* *Lorocera pilicornis* F.; Flgd. seitlich und zur Spitze gelbbraun, völlig ausgehärtet, Oberseitesonst schwarz, kaum erzschimrend, von Schaum in Naturgeschichte p. p. als selten vorkommend angeführt. Solche St. fing ich Ende Juli 24 bei Lck. (Waldschloß) in Anz. mit gewöhnlichen auf nasser Sandstelle einer moorigen Waldwiese.
- \* *Pterostichus lepidus* Leske: In Fauna germ. und Kuhnts Tab. wird die häufige oben kupferrote Form als f. (a.) *ferrea* Letzn. bezeichnet, was aber nicht zutrifft. Letzner hat unter v. *ferrea* s. St. beschrieben, deren Oberflächenfärbung aus „schwarz, grün und schwachem Kupferschimmer zusammengesetzt zu sein scheint“, die kupferrote Form aber v. *cuprea* benannt. Solche St. sind wohl als die eigentliche Hauptform zu betrachten, nicht die grüne Nominatform. Vgl. Zeitschr. für Entomologie, Breslau, 1847, S. 192.

- \* *Ptinella aptera* Guér. f. *ratisbonensis* Gillm.: In Schilskys Verz. ist nach einer Notiz des Herrn G. Reineck zu ergänzen „Anh.“ Herr Heidenreich sammelte die Form öfter bei Aken a. d. Elbe in Anhalt. 1 Belegst. in m. S.
- \* *Nephanes titan* Newm: Desgleichen; von Herrn Reineck bei Dessau gef. 1 Belegst. in m. S., bez.: Wörlitz, 19. 6. 20, Baumchwamm, G. Reineck.
- \* *Cercyon nigriceps* Mrsh.: ganz gelbe St., von mir vereinz. bei Lck. mit der Nomf. gef., fand ich noch nicht erwähnt; wohl unausgefärbte St.
- \* *Olibrus flavicornis* Sturm: In Schilskys Verz. zu ergänzen „Thür.“, da von Herrn G. Reineck in 7 St. im Juli, Aug. 18 bei Bad Berka und bei Buchfart in Thüringen gef. 2 Belegst. in m. S.
- \* *Athonomus varians* Payk., fast einfarbig braun, 1 St. von mir VIII. 1917 bei Lck. (Teerofen) gestr. Vielleicht unausgefärbtes St. der ganz schwarzen Form (vgl. D. E. Z. 1914 S. 623).
- \* *Apion rufulum* Wenck. Flgd.-Behaarung einfarbig weiß, am 18. 9. 24 von mir 1 St. im Dorfe Holbeck bei Lck. auf *Urtica urens* mit subsp. \*zoufali Wagn. gef. Von Herrn H. Wagner wird diese Färbung in Suppl. Entom. VII, 1918, S. 92 ff. nur der subsp. *rolphi* Wagn. zugeschrieben, zu welcher das fragl. St. wegen der abweichenden Grundfärbung kaum gehören wird. Zudem ist subsp. *rolphi* bisher nur aus Nordafrika bekannt. Zur sp. *urticarium* gehört das St. nicht, macht auch nicht den Eindruck der Defloration.

---

### Berichtigungen.

- Ontholestes murinus* L. f. *haroldi* Epp. (vgl. D. E. Z. 1913, S. 638) ist für die Mark zu streichen. Es handelt sich um ein sehr kleines Ex. von *O. tessellatus* Geoffr. und eine mir leider z. Zt. unterlaufene augenblickliche Verwechslung der Bestimmungsmerkmale.
- Aleochara breiti* Glb. (vgl. D. E. Z. 1920, S. 355) ist für die Mark zu streichen, von mir verkannt.
- \* *Euconnus hirticollis* Ill. f. *sanguinipennis* Reitt. ist entgegen der Angabe in D. E. Z. 1924, S. 259 nicht neu für Schilskys Verz.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [1925](#)

Autor(en)/Author(s): Delahon Paul

Artikel/Article: [Nachträge zu "Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands" von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie](#)

einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. 305-308