

Rhipidonyx Reitter.Novum genus *Mycetophagidarum*.

*Antennae filiformes, apicem versus haud incrassatae. Oculi transversi, antrorsum submarginati. Labrum magnum, transversim subquadratum, corneum. Mandibulae apice bidentatae. Palpi maxillares tenues, articulo ultimo magno, valde transverso, submoniliato, apice truncato-excavato. Palpi labiales articulo ultimo incrassato. Mesosternum carinatum. Tibiae anticae extus crenulatae. Tarsi 5, postici 4 articulati, articulis penultimis bilobatis; unguiculus intus pectinatis. Corpus ut in gen. *Mycetophago*, sed prothorax ante basin utrinque vix foveolatus. Elytra dense punctata, substriata.*

Körperform einem *Mycetophagus* sehr ähnlich, dem Halsschilder fehlen jedoch die grubchenartigen Eindrücke vor der Basis. Fühler von halber Körperlänge, ziemlich dünn, fadenförmig, ohne gegen die Spitze dicker werdende Glieder. Dieselben sind von den ziemlich großen queren Augen, und zwar knapp vor der vorderen kleinen Ausbuchtung derselben eingefügt. Clypeus kaum abgesetzt, Oberlippe sehr groß, hornig, quer viereckig, die Mandibeln fast bedeckend. Mandibeln wie bei *Mycetophagus*, mit 2zähliger Spitze. Mentum klein, beiderseits am Vorderrande tief ausgeschnitten. Kiefertaster scheinbar viergliederig, ziemlich dünn, das Endglied sehr quer, reichlich dreimal so breit als in der Mitte lang, halbmondförmig, an der Aufsenkante abgestutzt und ausgehöhlt. Die Lippentaster mit ebenfalls verdicktem Endgliede. Prosternum kurz, zwischen den Hüften ziemlich schmal, nicht über dieselben hinwegragend. Mesosternum gekielt. Die beiden vorletzten Bauchringe an der Seite mit gebuchteter Naht. Vorderschienen aussen gegen die Spitze fein gekerbt. Füße wie bei *Mycetophagus*, nur ist das vorletzte Glied deutlich, an den hintersten Füßen stark gelappt. Die Vorderfüße sind schwach erweitert, die hintersten einfach, mit langem ersten Gliede. Alle Klauen innen dicht kammartig bedornt.

Trotz der mit *Mycetophagus* sehr übereinstimmenden Körperform unterscheidet sich diese neue Gattung von dieser sehr wesentlich durch die Form der Füße, Klauen, Maxillartaster etc.

Rhipidonyx adustus n. sp.: *Oblongus, leviter convexus, sat dense fulvo-pubescens, antennis fuscis, basi ferrugineis, articulis elongatis; capite thoraceque rufo-fuscis, confertissime punctatis, hoc antrorsum rotundatim angustatis, angulis posticis rectis, basi vix evidenter sinuato; scutellum fuscum, minutum, triangulare; elytris nigro-fuscis, crebre distincteque irregulariter punctatis, leviter striatis et striis punctatis; subtus cum pedibus piceo-rufis dense punctatis et pubescentibus.* — Long. 5 Mm.

Patria: Ceylon. (Mus. Dr. C. A. Dohrn.)

Edm. Reitter in Paskau.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [20_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Rhipidonyx Reitter. 304](#)