

Neue Peruanische Nitidularier

der Kirsch'schen Sammlung

beschrieben von

Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Chalepopeplus morio: *Elongatus, nitidus, glaber, nigerrimus, antennis fusco-ferrugineis, pedibus nigro-piceis; capite thoraceque dense sat fortiter punctatis, hoc longitudine paulo brevior, lateribus aequaliter subrotundato basi que tenuiter marginato, angulis omnibus rotundatis; scutello subsemicirculari, subtiliter punctulato; elytris prothorace aequilatis et plus sesqui longioribus, striato-punctatis, interstitiis uniseriatim subtiliter punctulatis, abdomine supra crebre punctato.* Long. 5,1 Mm. — Peru.

Dem *Ch. vorax m.* verwandt und in der Färbung ähnlich, aber größer und durch andere Sculptur der Oberseite abweichend.

Chalepopeplus suturalis: *Elongatus, nitidus, glaber, nigropiceus, antennis pedibusque rufis; capite thoraceque sat crebre punctatis, hoc longitudine parum brevior, subtilissime marginato, lateribus leviter rotundato et paulo dilutior, angulis omnibus rotundatis; scutello subtransverso, piceo, subtilissime punctato; elytris rufis, sat profunde striato-punctatis, interstitiis uniseriatim, interstitio primo biseriatis subtilissime, vix perspicue punctulatis, sutura marginisque apice sat late infuscatis; abdomine sat crebre punctato, lateribus pygidioque dilutioribus.* Long. 3,3 Mm. — Peru.

Dem *Ch. dimidiatus* nahe verwandt, ein wenig kleiner u. durch andere Färbung abweichend.

Chalepopeplus conoteloides: *Elongatus, nitidus, glaber, obscure brunneo-piceus, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite thoraceque dense fortiter punctatis; hoc transverso, coleopteris aequilato, tenuiter marginato, lateribus et angulis omnibus rotundatis; scutello fere semicirculari, fusco, subtilissime punctulato; elytris dilute brunneis, lateribus apiceque et nonnunquam sutura subinfuscatis, sat fortiter striato-punctatis, interstitiis uniseriatim, interstitio*

primo biserialim subtilissime vix perspicue punctulatis; abdomine supra subtusque fuscis crebre distincteque punctatis. Long. 4 Mm. — Peru.

Einem glänzenden *Conotelus* täuschend ähnlich, aber die Rückensegmente, namentlich das letzte, kürzer, die hinteren beiden Fußpaare stark bedornt; hierdurch sind die *Chalepopeplus*-Arten namentlich von den *Brachypepliden* leicht zu unterscheiden.

Dem *suturalis* am nächsten verwandt, kleiner, die Färbung schmutzigbraun mit helleren Flügeld., die Seiten, der feine Hinter- rand und wohl auch die Naht schwach dunkler, das Halssch. kürzer als bei *suturalis*, die Punktirung desselben stärker, dagegen die Sculptur der Flügeld. diesem sehr ähnlich.

Chalepopeplus Kirschi: Elongatus, nitidus, glaber, rufus, capite dense, prothorace minus confertim subtiliter punctatis, hoc leniter transverso, medio coleopteris aequalato, lateribus levissime rotundatis, basique tenuiter marginatis, angulis haud rotundatis, obtusis, posticis fere rectis; scutello parce punctulato; elytris prothorace fere duplo longioribus, striato-punctatis, interstitiis vix punctulatis, apice dimidio nigris; abdomine supra subtilissime confertim punctatis. Long. 5,7 Mm. — Peru.

Zunächst mit *Ch. dimidiatus* Kirsch verwandt, aber größer, einfarbig roth und nur die hintere Hälfte der Flügeld. schwarz. Diese Art entfernt sich von allen bekannten Arten durch die nicht abgerundeten Ecken des Halsschildes. Die Seiten bilden knapp vor den nahezu rechteckigen Winkeln eine kleine geschwungene Ausrandung.

Cychrampus variegatus: Nitidus, vix alutaceus, minus dense subtiliter punctatus et pubescens, nigro-fuscus, prothorace testaceo, disco fusco-maculato, elytris nigris, ferrugineo-variegatis; antennis pedibusque testaceis. Long. 4 Mm. — Peru.

Eine reizende kleine, durch die Färbung der Flügeld. leicht kenntliche Art. Diese sind schwarz, der Seitenrand und zahlreiche unregelmäßige, gelappte Querbinden und verschiedene Flecken rost-roth. Die Behaarung auf gelber oder rostrother Färbung ist gelblich, auf dunklem Grunde schwarz.

Camptodes Kirschi: Subovalis, convexus, nitidissimus, rufotestaceus; supra valde purpureo- aut subviolaceo-micans; clava antennarum infusca, capite parce subtiliter punctato, prothorace parce subtilissime punctulato, scutello lateribus subviridi-micante, elytris

substriatis, sat dense subtiliter punctatis, stria suturali nulla, sutura tenuissime viridiaenea. Pygidio crebre distincte punctato. Unguiculis vix evidenter dentatis. Long. 5,1 Mm. — Peru.

Ist in meiner Bestimmungstabelle hinter *detritus* einzureihen.

Die Oberseite des gelbrothen Käfers ist mit einem sehr starken, violet schillernden Glanze übergossen, wie es mir noch bei keiner zweiten Art vorgekommen ist. Die Oberseite am Grunde ist nicht glatt, sondern wie bei den meisten Arten sculptirt.

Camptodes lateralis: Breviter ovatus, sat convexus, nitidus, niger, subviridi-micans, subtiliter aequaliterque punctatus, prothorace lateribus lato rufis, elytris substriatis, stria suturali nulla, subtus niger, sternum antrorsum, antennis (clava fusca excepta) pedibusque rufis, unguiculis vix evidenter dentatis. Long. 4 Mm. — Peru.

Hinter *Erichsoni* und *rubripes* zu stellen.

Bezüglich der Färbung unter den Camptoden mit nicht gezähnten Klauen ganz vereinzelt dastehend. Oberseite schwarz mit sehr geringem grünen Erzglanze, durchaus fein und nicht besonders dicht punktiert, die breiten Ränder des Halsschildes gelbroth. Vorder- und Mittelbrust auf der Unterseite, die Fühler, mit Ausnahme der braunen Keule, und Beine gelbroth, Hinterbrust und Bauch tief schwarz, fein behaart.

Erinnernd an *C. marginatus*; dieser ist aber halbkugelig, stark metallisch mit gezähnten Klauen, und hat einen vertieften Nahtstreifen auf den Flügeldecken.

Camptodes aerumnosus: Breviter ovalis, parum convexus, opacus, rufo-testaceus, obsolete subtilissime vix perspicue punctatus, scutello rufo, elytris nigris, indistincte subviridi aeneis, substriatis, stria suturali nulla, lateribus subfusco-limbatis, antennarum clava fusca, unguiculis vix dentatis. Long. 4,6 Mm. — Peru.

Kommt zwischen *C. Czwalinai* m. u. *bicolor* Er. einzureihen.

Mit *C. atripennis* m. sehr nahe verwandt, aber kleiner u. kürzer gerundet, mit überall erloschener Punktirung, die schwarzen Flügeldecken mit einem trüben grünlichen Glanze und die Seiten schmutzig braun. Die Hinterecken des Halssch. sind auch nicht scharf rechteckig, wodurch sich diese Art schon hinlänglich von *atripennis* unterscheidet.

Strongylus rotundatus: Fere rotundatus, convexus, nitidus, brunneo-testaceus, antennarum clava fusca, capite crebre sub-

tiliter punctato, inter antennas leviter biimpresso, prothorace longitudine triplo brevior, antrorsum angustato, sat dense obsolete punctulato; elytris seriatim punctatis, interstitiis latis, parce subtilissime punctulatis, tibiis simplicibus, minus latis. Long. 4 Mm. — Peru.

Einem braungelben *Pallodes* täuschend ähnlich, aber durch die Bildung der Hinterfüße und das gekielte Mesosternum zu *Strongylus* gehörend. In dieser Gattung zunächst mit *St. pallodoides* Rt. verwandt, aber durch die gleichmäßig runde, weniger gewölbte Gestalt abweichend. Die letztere ist bei *pallodoides* hochgewölbt, ziemlich eiförmig. Von allen Arten entfernt sich jedoch diese Art durch die einfachen schmalen Schienen, welche bei den andern Arten breit und abgeplattet sind.

Neue Nitidularier der Dohrn'schen Sammlung.

Carpophilus (Nitops) Murr.) Dohrni: Oblongus, sat latus, convexus, subopacus, fusco-testaceus, dense, longius fulvo-pubescentis, confertim subtilissime aequaliterque punctatus, thorace transverso, longitudine fere duplo brevior, lateribus subparallelis, angulis omnibus rotundatis; elytris prothorace aequalitatis et fere duplo longioribus. Long. 3—3,3 Mm. — Patria: Cordova (La Plata).

Mit *C. ophthalmicus*, *crassicollis* und *sordidus* verwandt, wie die beiden ersten einfarbig gelbbraunlich, nur die Fühler, Beine u. der umgeschlagene Rand der Flügeld. etwas heller. Er unterscheidet sich von *ophthalmicus* durch kleinere Augen und längere, dichtere, gelbliche Behaarung; von *crassicollis* durch weniger breites Halsschild, längere und dichtere Behaarung und die Längen-Dimensionen der Flügeld.; von *sordidus* durch hellere Färbung und einfarbige gelbliche Behaarung. Kommt zwischen *ophthalmicus* und *sordidus* zu stehen.

Lasiodactylus subproductus: Elongato-subovalis, tenuiter pubescens, nitidulus, nigro-fuscus, subtus, antennis, pedibus, capite apice, lateribus prothoracis elytrorumque ferrugineis; elytris crebre seriatim punctatis, seriatim pubescentibus et subpilosis, obsolete costulatis, ferrugineo-maculosis, angulo suturali obtuso subproducto. Long. 4,5—5 Mm. — Isla de Principe (Guinea-Küste).

Länglich-oval, wenig gewölbt, braunroth, Fühler, Beine u. der umgeschlagene Rand der Flügeld. etwas heller, die Scheibe d. Hals-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [20_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Neue Peruanische Nitidularier der Kirsch'schen Sammlung 305-308](#)