

cifisch ab und wurde von B. als *Kiesenwetteri* eingesendet, welcher mir zugleich mittheilte, der Käfer vom Schalbus Dagh sei *Pachyta Beckeri* Desbrochers in litt.; er selbst sendete die Art als *daghestanica* in litteris ein. G. Kraatz.

In die Gattung *Grammoptera* Serv. (Halsschild länger als breit) gehören:

1) *tabacicolor* DeGeer (*laevis* F.), 2) *rufo-cornis* F., 3) *analis* Panz., 4) *ustulata* Schall (*praeusta* F.), 5) *femorata* F.

Das Männchen ad 3 *Gr. analis* ♂ (ich fand ♂ u. ♀ mehrfach in copula) ist ganz schwarz; beim ♀ ist die Mitte aller Schenkel, sowie die 2 letzten und Spitze des drittletzten Hinterleibssegments lebhaft roth. No. 5 wurde als schwarze Var. zu *Cortodera 4-guttata* gestellt. Die Flügeld. sind aber bei *fem.* viel länger; Glied 1 der Hinterfüße ist fast so lang als die andern mit der Klaue, bei *4-guttata* nur so lang als 2 u. 3. Zur *fem.* gehört die so lange ungedeutete *Leptura variegata* Germ. No. 1—5 kommen bei Frankfurt vor, unbekannt ist mir.

6) *bicarinata* Arnold Hor. ross. 1869. p. 137 mit *tabacicolor* verwandt, aber der Hinterleib des ♀ roth, ♂ mit 2 erhabenen Leisten auf dem Metasternum. — Südrussland, am Dnieper.

### Die Longicornen-Gattung *Vadonia* Muls.

In der Berliner Ent. Ztschr. 1859. p. 96 gab Dr. Kraatz eine Besprechung der mit *Leptura unipunctata* F. verwandten Arten, welche zu Mulsant's Gattung *Vadonia* gehören, die sich durch kugeliges Halssch. und gewölbte Flügeld. charakterisirt; ich füge hier Folgendes hinzu:

Meine *V. bipunctata* F. (= *Fischeri* Zoubk., alle aus Kasan von Eversmann) mit krokusgelben Flügeld. haben ein sehr weitläufig fein punkirtes Halsschild.

Bei *unipunctata* F. ist das Halssch. gröber punkirt als bei *Steveni*. Küster fand von dieser Art und nicht von *bip.* ganz schwarze Stücke in Dalmatien (1 ♂ in meiner Sammlung). Meine normalen Stücke sind aus Dalmatien (Parreyss, als *monostigma* Parr.), Südfrankreich (Winthem), Kirgisensteppe (Heller), Sibirien (Faldermann) und Dalmatien (Küster).

Die *adusta* Kraatz (1859) = *Steveni* Sperck (1835) = *saucia* Muls. (1855) ist in beiden Geschlechtern viel breiter, die Flügeld. sind länger, das Halssch. runder. Meine ganz schwarzen Stücke sind ♀, die Naht ist bei einem türkischen Stück vorn nicht schwarz. — Meine Stücke sind aus Croatien (Stenz), europ. Türkei (Dr. Michabelles), Ungarn (Dahl).

*V. litigiosa* Muls. mit schwarzer Behaarung von Kopf u. Halssch. wird zuerst 1863 von Mulsant (*Longic. ed. II.*), später 1870 in der Abeille von Desbrochers als *globo-collis* beschrieben. Ich besitze einen Desbr. typ. ♂ aus Kustendje und ♂♀ aus Dultscheck an der Donaumündung von Mann gesammelt. Dr. L. v. Heyden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [20\\_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: [Die Longicornen-Gattung Vadonia Muls. 320](#)