

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXI. 1877. Heft II.]

Beschreibungen einiger *Oedionychis*-Arten

von

E. v. Harold in Berlin.

Nachstehende Diagnosen einiger Arten der Gattung *Oedionychis* schicke ich einer monographischen Bearbeitung dieser Gruppe hiermit voraus.

Oed. Kiesenwetteri: *Nitida*, *luteo-testacea*, *capite clypeo excepto nigro*, *thorace lateribus rotundatis*, *angulis anticis non mucronatis*, *elytris subtiliter punctulatis*, *apicem versus laevibus*, *basi et utriusque macula oblonga magna nigris*; *corpore subtus cum pedibus fusco-badio*, *abdominis apice et lateribus dilutioribus*. — Long. 5—6 mill. Brasilia.

Oed. generosa: *Dilatato-ovalis*, *nitida*, *rufo-testacea*, *elytris dense et sat fortiter punctatis*, *cyaneis*, *fasciis duabus sat angustis flavis*, *una subarcuata ante apicem*, *altera nonnihil ante medium*, *hac lateraliter per limbum usque circum humerum conducta*; *epipleuris antice concavis*, *omnino testaceis*; *corpore subtus cum pedibus rufo-testaceo*, *femoribus posticis apice nigris*. — Long. 9 mill. Brasilia: Bahia.

Oed. florigera: *Nigra*, *thorace testaceo*, *medio transversim nigro-signato*, *elytris testaceis*, *vario modo nigro- vel rufopiceo-signatis*, *plerumque basi*, *macula subhumerali affixa*, *fascia transversa media*, *lata*, *irregulari et apice ipso nigris vel rufo-piceis*, *interdum omnino fere piceis*, *maculis tunc 6 in circulum fere dispositis*, *2 oblongis ad suturam ante medium*, *2 marginalibus in medio*, *2 majoribus apicalibus flavis*. — Long. 6—7 mill. Brasilia.

Oed. formosa: *Capite nigro*, *oculis flavo-marginatis*, *thorace flavo*, *nigro-fasciato*, *elytris subtiliter dense punctulatis*, *violaceis*, *vittis utriusque tribus angustis flavis*, *una subsuturali*, *una laterali*, *tertia marginali*; *epipleuris flavis*, *corpore subtus cum pedibus antennisque piceo*. — Long. 9 mill. Montevideo.

Oed. Fairmairei: *Capite nigro*, *thorace punctulato*, *flavo*, *transversim nigro-fasciato*, *elytris dense punctulatis*, *cyaneis vel cyano-viridibus*, *vitta marginali alteraque discoidali*, *circa humerum at non apice cum illa connexa*, *flavis*; *epipleuris flavis*; *corpore subtus cum pedibus aeneo-nigro*, *abdominis segmento ultimo utrinque flavo-maculato*. — Long. 5,4 mill. Chili.

Oed. magica: *Subnitida*, *rufo - testacea*, *vertice fusco - aeneo*, *elytris dense punctatis*, *macula communi oblonga scutellari et utrius-*

434 E. v. Harold: Beschreibungen einiger *Oedionychis*-Arten.

que alteris tribus, una humerali, altera magna transversa pone medium, tertia apicali nigro-aeneis; epipleuris latissimis concavis; antennis filiformibus, articulo 2 minuto, 3 illo plus duplo longiore; metatarso postico articulis 2 sequentibus multo longiore. — Long. 7 mill.

Darjeeling. Propter antennarum structuram, metatarsi longitudinem et prosternum subdilatum planum, novum genus *Hypassis* formans.

Oed. coccinelloides: *Nigra*, clypeo flavo, thorace margine laterali maculisque duabus basalibus mediis albido-testaceis, elytris testaceis, utriusque maculis duabus parvulis albidis, nigro-annulatis, una submarginali media, altera apicali. — Long. 6,5 mill. Brasilia.

Oed. lativittis: Capite nigro-aeneo, ad oculos flavo, thorace nigro, lateribus flavis, elytris fortiter punctatis, flavis, sutura late vittaque laterali, apice angustiore, nigro-viridiaeneis, corpore subtus cum pedibus piceo. — Long. 9 mill. Brasilia.

Oed. sanguinipes: Valde convexa, modice nitida, densissime punctata, capite, corpore subtus antennisque ferrugineis, pedibus rubris, thorace elytrisque flavis, his vitta utriusque discoidali, postice abbreviata, picea, humeris intus non sulcatis, epipleuris flavis. — Long. 7—8,5 mill. Brasilia.

Oed. longula: Oblonga, ferruginea, thorace flavo, obsolete punctato, ferrugineo-fasciato, elytris humeris intus non sulcatis, asperulato sat dense punctulatis, sutura vittaque discoidali fusco-ferrugineis; epipleuris flavis, intus ferrugineis; antennis fuscis, articulis 1—3 rufescentibus, 3 quarto dimidio breviore. — Long. 6,5 mill. California.

Oed. Dejeani: Nitida, rufa, thorace punctulato, elytris obscure viridi-aeneis, rufo-marginatis, dense punctulatis; corpore subtus cum pedibus rufo-piceo. — Long. 6,5 mill. Buenos-Aires.

Oed. rustica: Nitida, flava, capite postice piceo, elytris basi fasciaque ante medium, postice ad suturam emarginata, vitta marginali inter se connexis rufo-piceis; metasterno infuscato, antennis fuscis, articulo 1—3 testaceis, 3 quarto aequilongo. — Long. 5 mill. Bahia.

Oed. lineola: Capite piceo, thorace elytrisque flavis, illo media transversa, his sutura vittaque laterali piceis; humeris intus non sulcatis; elytris sat dense punctulatis, epipleuris flavis; corpore subtus cum pedibus, abdomine rufo-testaceo excepto, rufo-piceo. — Long. 8 mill. Montevideo, Corrientes.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift
\(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche
Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [21_1877](#)

Autor(en)/Author(s): Harold Edgar Freiherr von

Artikel/Article: [Beschreibungen einiger Oedionychis-Arten
433-434](#)