

Lobogestoria nov. gen. *Latrididarum*

beschrieben von

Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Antennae 11-articulatae, *clava* biarticulata, *subsolida*. *Frons* longitudinaliter biimpressa. *Prosternum* pone *coxae* deflexum. *Coxae* haud contiguae. *Thorax* quadrato-elongatus, *toris* duobus dorsalibus, *parum* arcuatis, fortissime elevatis et antice in lobos valde productis, instructus. *Scutellum* vix perspicuum. *Elytra* elongata, cylindrica, dense punctato-striata. *Tibiae* breves, leviter trigonatae. *Tarsi* triarticulati, articulis duobus primis brevibus. *Abdomen* segmentis quinque, immobilibus et subaequalibus. *Corpus* elongatum, subcylindricum, subglabrum, fere ut in genere *Pycnometro*.

Diese neue Gattung scheint am nächsten mit der *Pynomerin*-Gruppe der *Colydier* verwandt zu sein, entfernt sich aber von derselben wegen der durchgehends dreigliedrigen Füße, und dürfte ihre systematische Stellung demnach in der Nähe von *Langelandia* und *Anommatus* finden.

Länglich - cylindrisch, fast unbehaart, glänzend. Die Fühler 11gliedrig, an den Seiten des Kopfes vor den Augen eingefügt; das erste Glied groß, kugelig, das zweite etwas kleiner, rundlich quer, die nächsten ziemlich gleichbreit, wenig schmaler als das 2te, transversal, die beiden letzten eine gedrungene rundliche Keule bildend. Stirn jederseits mit einem Eindrucke. Halsschild länger als breit, die Scheibe mit 2 großen, stark erhabenen, leicht gebogenen Längswülsten, welche meist über den Vorderrand in Form zweier lappiger Höcker verlängert sind. Schildchen nicht sichtbar. Flügeldecken kaum doppelt so lang als das Halsschild, cylindrisch, tief und dicht punktirt gestreift, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet. *Prosternum* zwischen den Vorderhüften ziemlich schmal, knapp hinter denselben nach abwärts gebogen. Alle Bauchringe von ziemlich gleicher Länge, scheinbar immobil. Schenkel und Schienen kurz und kräftig, die letzteren gegen die Spitze nach außen leicht erweitert; die Tarsen dreigliederig, die ersten zwei gleich geformt, sehr kurz, die Klauen einfach.

Lobogestoria gibbicollis n. sp.: *Subcylindrica, ferruginea, nitida, prothorace quadratim-elongato, toris duabus dorsalibus, parum arcuatis, fortissime elevatis et antice in lobos valde productis, instructo, medio canaliculato, fovea sublaterali media profunde impressa, angulis anticis subacutis, extus subprominulis; elytris fortiter dense punctato-striatis.* — Long. 3,5 Mm.

Patria: Cuba. (Mus. Berol.)

Camptodes biformis n. sp. *Nitidulidarum.*

Oblongiusculus, convexus, niger, nitidus, subviridimicans, elytris rufo-brunneis, substriatis, interstitiis subtiliter punctatis, stria suturali ad medium usque fere producta, unguiculis dentatis. — Long. 5,5 — 6 Mm.

Var. a. *Niger, subviridimicans, unicolor.*

Patria: Bolivia. (Mus. Berol. et Reitter.)

Von der länglichen Körperform des *C. vittatus*, aber noch etwas gestreckter, ziemlich gleichbreit, tief schwarz, glänzend, oben mit schwach grünlichem Scheine. Die Fühler manchmal mit röthlicher Geißel. Kopf fein punktirt, zwischen den Fühlern mit drei in querer Linie stehenden Grübchen. Halsschild stark quer, am Grunde von der Breite der Flügeldecken, nach vorn gerundet verengt, oben dicht und fein punktirt, die Ecken stumpf, die hinteren nicht sehr weit verrundet. Schildchen schwarz, sehr fein u. weitläufig punktirt. Flügeldecken gewöhnlich hell rothbraun, selten schwarz mit grünlichem Scheine, höchst subtil gestreift, die breiten Zwischenräume ziemlich dicht und fein punktirt, die Nahtstreifen von der Spitze bis knapp über die Mitte herauf reichend. Pygidium schwarz, stark punktirt. Unterseite und Beine tief schwarz, nicht sehr fein greis behaart, überall kräftig. Die oberen Bauchringe etwas feiner und spärlicher punktirt; bei dem Männchen befindet sich ein Grübchen in der Mitte des dichter punktirten Metasternums. Fußklauen gezähnt.

Ist neben *C. rubripennis* Reitt. einzureihen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [22_1878](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Lobogestoria nov. gen. Latrididarum 31-32](#)