

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXII. 1878. Heft I.]

Bemerkungen zur: *Catalogi Coleopterorum Europae*
editio secunda, auctoribus Dr. J. P. E. Frdr. Stein
et Jul. Weise. Berol. 1877.

Ich glaube, daß den meisten Lesern der Deutschen Entomol. Zeitschrift die Zusammenstellung der nachfolgenden Bemerkungen angenehm sein wird, und hoffe denselben später noch mehr anschließen zu können; namentlich würden auch die Berichtigungen etwaiger falscher Vaterlands-Angaben willkommen sein.

Die laufenden Nummern bei den Bemerkungen der einzelnen Autoren ermöglichen es, in den Catalogen kurz die Quelle der Berichtigung anzudeuten, indem der Zusatz (E 1.) beispielsweise bedeutet: No. 1 der Eppelsheim'schen Bemerkungen u. s. w.

G. Kraatz.

I. Von Dr. L. v. Heyden. ¹⁾

1. *Leistus Koziorowiczi* Brûl. nicht von S, sondern von C.
2. *Leistus abdominalis* Rehe. ist var. von *montanus* und nicht von *spinibarbis*. Nur Syrien und Cypern! str. ²⁾
3. *Leistus angulatus* Brûl.; Castilien! fehlt.

¹⁾ Da diese ebenso reiche als dankenswerthe Serie von Nachträgen vielleicht auch noch Andere zu ähnlichen veranlaßt, so möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß es höchst wünschenswerth wäre, wenn die Herren Autoren deutlich bemerkbar machten, ob die Rectification von ihnen selbst stammt oder einem anderen Autor entlehnt ist; dies kann kurz durch dessen Namensangabe oder noch besser durch ein genaueres Citat geschehen.

H. v. Heyden citirt meist nach anderen Autoren, zuerst namentlich nach Piochard de la Brûlerie.

Es ist selbstverständlich, daß die HH. Stein und Weise nur, um mich so auszudrücken, für Nichtberücksichtigung derjenigen Publikationen verantwortlich gemacht werden können, welche etwa bis Mitte des Jahres 1876 erschienen sind. Später publicirte Arten gehören nicht zu den hier zu verzeichnenden; wohl aber scheinen mir syn. und andere Bemerkungen über die im Catalog bereits aufgeführten Arten hier am Orte. G. Kraatz.

²⁾ bedeutet: zu streichen.

4. *Elaphrus angustus* Chaud. muß *angustatus* heißen.
5. *Nebria nigricornis* Villa u. *Parreyssi* Chaud. sind Synonyme der var. *Höpfneri* Dej.
6. *Calosoma severum* Chaud. = *rapax* Motsch. und var. von *sycophanta* L.
7. *Carabus lamprus* Chaud.; von Amasia! str.
8. *Car. reperiatus* Drap.; str.
9. *Car. blandus* Krtz. = *Vellepiticus* Hampe.
10. *Car. trabuccarius* Fairm. = *helluo* Dej.
11. *Scarites abbreviatus* Dej.; Madeira!
12. *Dyschirius protensus* Putz. = *macroderus* Chdr.
13. *Dyschirius nanus* Putz., *bacillus* Schaum u. *clypeatus* Putz. sind var. von *pusillus* Dej.
14. *D. riparius* Mhm. ist var. von *thoracicus* Rossi. (Typ in coll. Heyden); ebenso *obscurus* Gyll., *numidicus* Putz. u. *humeralis* Chdr.; vide Brûlerie Coleopt. Syr., Ann. France 1875.
15. Die Putzeys'schen Arten: *D. apicalis*, *remotepunctatus*, *chalybaeus* u. *hispanus* sind = *aeneus* Dej. var.
16. *Clivina sacra* Putz. (Nachtrag) str., da sie nicht aus Sa., sondern von Brûlerie bei Jerusalem entdeckt wurde, woher auch der Name.
17. *Cl. scripta* Putz.; Algier! str.
18. *Cl. lobata* Bon.; Bengalen! str.
19. *Masoreus affinis* Küst. ist var. von *aegyptiacus* Dej.
20. *M. testaceus* Luc. und *rotundipennis* Rche. ebenso.
21. *Lebia lepida* Brullé ist var. von *humeralis* Strm.
22. *Cymindoides alternans* Rbr. ist die bekannte *Cymindis alt.*
23. *Blechnus maurus* Strm. ist nur eine der vielen Formen des in ganz Europa häufigen *glabratus* Dft.
24. Unter *Metabletus fuscomaculatus* Motsch. stehen 2 Arten:
 - 1) *fuscomac.* = *exclamat.* = *virgatus* = *patruelis*,
 - 2) *vittula* = *arenicola*; erstere habe ich nur aus Persien! die zweite nur von Aegypten!
25. *Pogonus Grayi* Woll. = *fulvus* ist ein *Syrdenus*.
26. *Omphreus* nur in Montenegro!
27. *Brachynus efflans* Dej. *verus* aus Portugal! = *crepitans* var.
28. *Brachynus longicollis* Walzl = *crepitans* var. (bei *immaculicorn.* ist Fühlerglied 3 länger als bei *crepitans*).
29. *Br. bombardata* Dej. = *psophia* Dej. var.
30. *Br. strepens* Fisch. = *nitidulus* Muls. = *explodens* Dft. var.
31. *Br. italicus* Dej. = *bellicosus* Duf.

32. *Brachynus Hispalensis* Ramb. = *angustatus* Dej., der seither mit *andalusiacus* Ramb. vermengt wurde.
33. *Cymindis ruficeps* Chdr. = *melanocephala* Dej. var. von der Guadarrama!
34. *Cym. Chevrolati* Perez (Typ in coll. Heyden) = *ruficeps*.
35. *Cym. monticola* Chevr.; gute Art aus Asturien!
36. *Cym. baetica* Ramb. = *scapularis* Schaum var.
37. Bei *Cryptotrichus* fehlt *alpinus* Dej. Alp. it. und var. *chalybaeus* Dej.
38. *Calathus deplanatus* Chdr. ist aus Rumelien! nicht Ca. — Typ in meiner Sammlung, von Parreyß gef.
39. *Cal. caucasicus* Chdr. (mit dicken Fühlern) bildet die Gattung *Pristodactyla* Chaud.
40. *Anchomenus banaticus* Friv. ist ein *Platynus*.
41. *Orthomus longulus* Rche. mit Synonymen ist zu streichen, weil nur asiatische Art.
42. *Orth. 4-foveolatus* Chdr. = *hispanicus* Dej. *verus*. Ich habe ein typ. Stück aus Gallaecia!
43. *Poecilus dux* Schfs. ist ein ächter *Pterostichus* bei *cristatus*.
44. *Pterostichus Sacheri* Friv. = *Jurinei* Panz. var.
45. *Pt. Susae* Vuillfr. = *brevipennis* Chevr. (ein *Pterostichus*, kein *Omaseus*).
46. *Pt. ambiguus* Fairm.; str. (= *Tapinopterus ambiguus*).
47. *Pt. Baldensis* Schaum (bei *Mühlfeldi*) ist nicht = *Transsylvanicus* Chaud. (bei *Kokeili*), sondern = *Brunii* Cristof. i. l., der nach Gredler var. von *metallicus* ist.
48. *Haptoderus Fairmairei* Chdr. von T., nicht S.
49. *Adelosia pulchella* Faldm. ist ein *Haptoderus*; die Prosternalspitze ist ohne Kante.
50. *Molops Sturmi* Krtz. = *orthogonius* Chdr.
51. *Percus Giraoi* muß heißen *Giraoi*.
52. *Zabrus consanguineus* Chevr. fehlt; bekannte Art.
53. *Leiocnemis dichroa* Putz. = *dalmatina* Dej.
54. *Leiocn. diversa* Putz. = *eximia* Dej.
55. *Leiocn. corpulenta* Putz., *rotundata* Dej., *arcuata* Putz. = *brevis* Dej.
56. *Leiocn. testudinea* Putz. = *gravidula* Roshr.
57. *Amathitis rufescens* Dej. = *aegyptiaca* Zmmr., fehlt; Carthagen!
58. *Carterus gilvipes* Pioch. = *dama* var. Original habe ich.
59. *Pachycarus Latreillei* Sol. str.; nur Kleinasien!

60. *Dichirotrichus ustulatus* Dej., *pallidus* Dej., *chloroticus* Dej. und *dorsalis* Dej. gehören als Varietäten zu *obsoletus* Dej.

61. *Anisodactylus microthorax* Motsch. ist ein *Harpalus*.

62. *Harpalus Perezi* Vuillfr. ist = *microthorax*.

63. *Ophonus diffinis* Dej. und *rotundicollis* Fairm. sind zwei Rassen einer Art.

64. *O. cribricollis* Dej. = *azureus* F. var.

65. *O. cordicollis* Dej. = *meridionalis* Dej. var.

66. *O. distinctus* Ramb. = *pumilio* Dej.

67. *O. parallelus* Dej. = *puncticollis* Payk. var.

68. *O. hispanus* Ramb. u. *suturalis* Chdr. = *planicollis* Dej. var.

69. *O. fallax* Peyr. = *planicollis* Dej.

70. *Harpalus Pharisaeus* Reche. = *seriatus* Chaud. var.; ich kenne nur kleinasiatische Stücke.

71. *H. polyglyptus* Schaum = *seriatus* Chdr. var.

72. *H. sculus* Dej. ist ein großer *punctatostratus* Dej. Ich habe typische Stücke.

73. *H. semipunctatus* Dej. = *aeneus* F. var.

74. *H. fulvus* Dej. (= *litoralis* Ramb.) ist *melancholicus* Dej. var.

75. *H. cyanellus* Krtz. = *kirghisicus* Motsch.; nach Typen von Motschulsky in meiner Sammlung.

76. *Trechus glacialis* Putz.; str. Der Autor beschreibt die Heer'sche Art.

77. *Tachys dimidiatus* Motsch. = *scutellaris* Germ. var.

78. *T. rubicundus* Chdr. = *fulvicollis* Dej. var.

79. *T. 4-striatus* Dft. et *apristoides* Rottbg. = *sexstriatus* Dft. var.

80. *Ocys subtile* Schaum = *5-striatum* Gyll.

81. *Philochthus rectangulus* Duv. = *obtusius* Sturm var.

82. *Lopha semipunctata* Grlls. (Hispan. Lu.) = *callosa* Küst. (Sard.) var.

83. *L. tetragramma* Chdr. = var. *specularis* Küst.

84. *Leja curtula* Duv. = *ambigua* Dej. var.

85. *Notaphus Guadarramensis* Gaut. ist eine *Leja*.

86. *Leja agilis* Duv. = *Grapei* Gyll. var.

87. *L. 4-fossulata* Schaum = *bipunctata* L. var.

88. Zu *Peryphus nitidulus* Marsh. gehören als Varietäten *praeustus* Dej., *monticola* Sturm, *sculus* Dej., *brunnicornis* Dej., *Milleri* Dej., *deletus* Dej. und *alpinus* Heer.

89. *Peryphus maritimus* Küst. nach Typ in meiner Sammlung = *hypocrita* Dej. var.

90. *Hydrovatus clypealis* Sharp; Gall. bor.! fehlt.

91. *Hydroporus inconspectus* Lepr.; J. Lu. Ga.! fehlt hinter *opatrinus* Germ.

92. *Hyd. Brannani* Schfs. = *moestus* Fairm.; selbstständ. Art.

93. *Hyd. vestitus* Fairm. nec *auctorum* = *Fairmairei* Lepr.

94. *Philhydrus marginatus* Dft. = *marginellus* F. (*ovalis* Thoms.)

95. *Ph. affinis* Gyll. = *marginellus* Thoms. nec F.; nur in Schweden!

96. *Ph. fulvus* Marsh. gehört keinesfalls zu *marginatus* Dft., da er $2\frac{1}{2}$ lin. Länge und elytra fulva, lineis obsoletis longitudinalibus nigris haben soll und auch thorax fulvus, antice niger? zu *melanocephalus* F., wie auch Harold angiebt. Scheint Mischart; zu str. Harold Cat. führt *fulvus* Marsh. Ent. Brit. p. 408 bei *lividus* an, und dieselbe Art pag. 406 bei *melanocephalus*. Die Marsham'sche Beschreibung steht auf p. 408 (auf p. 406 nur *bipunctatus*, *minutus* und *bipustulatus*).

97. *Ph. ochropterus* Marsh. ist ♀ *melanocephalus* = var. ε Gyll. Thoms. (dunkel mit hellem Fleck vor Augen).

98. *Ph. margipallens* Marsh. ist nach der kurzen Beschreibung: piceus totus nitidus, thoracis marginibus pallidioribus, Long. $\frac{3}{4}$ lin., nicht zu entziffern, ? eine *Anacaena*; str.

99. *Ph. nitidus* Heer paßt nach Beschreibung auf *courcatus* Gredl. = *suturalis* Sharp.

100. *Helochaeres punctatus* Sharp; Br. G.! fehlt.

101. *Laccobius Emeryanus* Rottbg. nicht *Emeryi*.

102. *Limnebius picinus* Marsh. und *sericans* Muls. sind 2 Arten (teste Gerhardt).

103. *Quedius robustus* Scriba aus Asturien! nicht Alp.

104. *Pholeuon Querilhaci* und *caudatum* bilden die Gattung *Androdietus* Abeille, zu der *caudatissimus* Ab. (Ga.) tritt.

105. *Hister bipunctatus* Payk.; Hi. Tu.! fehlt.

106. *Saprinus cruciatus* Payk.; von Jenison in Catalonien gef.

107. *Cercus metallescens* Schfs. Nachtrag ist ein *Brachypterus* und = *pallipes* Murray.

108. *Melanophthalma ovalipennis* Reitt. Das Unicum ist von mir im Engadin, Schweiz, nicht Ti. gefunden.

109. *Atomaria Herminea*, nicht *Herminae*.

110. *Coxelus* statt *Coxcehus*.

111. *Airaphilus laricis* Chev. ? ist nach einem Typ meiner Sammlung = *Silvanus bidentatus* F.

112. *Typhaea angusta* statt *angustata*.

113. *Thorictus gallicus* Peyr. ist = (nicht einmal Varietät) *grandicollis* Germ.

114. *Thorictodes Heydeni* Reitt. stammt aus Aegypten! ich erhielt ihn auch als *Arachnidiphaga Rhodomagensis* ohne Autor aus Rouen!

115. *Anthrenus Goliath* Muls., nicht Sauley; str. Nur in Aegypten!

116. *Ammonoecius transsylvanicus* Küst.? aus Tr.! nicht Si.

117. *Thorectes reflexus* Jekel (Typ) fand Walzl in Andal. und Getschmann bei Huelva!

118. *Trox Morticini* Fald. habe ich von Eversmann aus Kasan!

119. *Tr. granulipennis* var. *4-maculatus* Balliou (Stücke vom Autor in meiner Samml.); nur in Asien: Chodshent! str.

120. *Hymenophia Hungarica* Blanch.; str. Siehe meine Revision.

121. *Melolontha nigripes* Com. = *hippocastani* F. var.

122. *Anomala luculenta* Er. aus Mongol.! *arcuata* Gebl. und var. *lunata* Faldm. aus Daurien! str.

123. *Anthaxia Midas* Ksw. = *Croesus* Villers.

124. Zu *Anth. viminalis* Lap. et var. gehört *Croesus* Ksw.

125. *Trachykele* einmal in Paris aus einem Cedernstamm vom Libanon entwickelt; ist doch wohl vorerst noch zu streichen.

126. *Heteroderes grisescens* Germ.; nordafrik. Küste! str.

127. *Melanoxanthus nigropunctatus* Motsch. kommt noch einmal als *Cardiophorus melanox.* Cand. vor; das Thier gehört zur letzteren Gattung. *Melanoxanthus* ist also zu streichen. — Der Autor ist Motsch.

128. *Megapenthes divaricatus* Desbr. = *tibialis* Lac.

129. *Limonijs suturalis* Gebl. kommt noch einmal als *Elater sutur.* vor; das Thier ist ein *Limonijs*.

130. *Denticollis Kiesenwetteri* Schfs. ist ein *Athous*.

131. *Trichodes gulo* Krtz. (nicht Parreyfs, der nie etwas selbst beschrieben hat) ist *crabroniformis* F. var.

132. *Tr. Irkutensis* Laxm.; nur in Sibirien! str.

133. *Eurostus minimus* Heyd. = *Niptus constrictus* Ksw.

134. *Erodium Fabricii* Sol.; str. Nur asiatisch!

135. *Tentyria scabripennis* Sol.; str. Persien!

136. *Hegeter amaroides* Sol.; str. Canaria, Tanger!

137. *Pimelia monilifera* Sol.; Anatolien!

138. *Pim. denticulata* statt *denticula*; str. Aegypten!

139. *Pim. sericea* Ol.; Balear.! nicht T. Gr.

140. *Pim. Latreillei* Sol.; Gr. T.!

141. *Crypticus obesus* Luc.; str. Algier!

142. *Pedinus punctulatus* statt *punctatus*; str. Nur in Anatolien! (Kindermann.)

143. *Heliopates simulans* Chvr. (1865) = *Perroudi* Muls. (1855).

144. *H. foveolatus* Grlls. (1858) = *foveipennis* Muls.

145. *H. nivalis* (Ramb. i. l.) Baudi (1877) = *indiscretus* Muls.

146. *H. viaticus* Muls. = *planiusculus* Muls.

147. *Diaperis quercana* und *morio* Baudi sind zu streichen, weil Stentz'sche *artefacta*, wie ich a. O. schon gesagt habe.

148. *Palorus Ratzeburgi* Wissm. ist das oft verkannte ächte *Tribolium bifoveolatum* Dft., das ein *Palorus* ist.

149. *Podonta atrata* Ksw.; str. Smyrna, Aleppo!

150. *P. turcica* Ksw. kommt hinzu; europ. Türkei! ebenso:

151. *P. Heydeni* Ksw.; Tu.! — Die Originale stammen aus meiner Sammlung. Der Autor verwechselte in der Beschreibung die Vaterländer.

152. *P. alpina* (Kndrm.) Muls.; str. Kleinasien (Kindermann)!

153. *Omophlus nigripennis* F.; str. Algier!

154. *Halosimus elegantulus* Muls.; str. Anatolien!

155. *Lagorina* statt *Legorina*.

156. *Epicauta flabellicornis* Germ. = *sibirica* Pallas.

157. *Mylabris bivulnera* Pallas von Sarepta fehlt.

158. *Coryna Syriaca* Klug u. *cincta* Ol. sind *Mylabris*.

159. *Apion curtulum* Desbr.; Co.! nicht Ga.

160. *A. distincticolle* Desbr. muß heißen *distinctirostre* und nicht Hi., sondern C. Ich habe Typ.

161. *Orchestes rhamphoides* Duv. ist der *Ramphus tomentosus* Ol.

162. *Otiorhynchus Caunicus* Stierl. = *amputatus* Chevr. Von Brûlerie entdeckt, der mir ein Stück gab.

163. *Ot. corticalis* Stierl. fehlt. Bei Hyères nicht selten von mir gefunden; es ist nicht *civis* Stierl. Die Streifen sind unregelmäßig.

164. *Ot. laevigat.* var. *cornicinus* Mars. muß Stierl. heißen.

165. Genus *Laparocerus* str. Nicht in Europa, sond. Madeira!

166. Die Gattung *Heydeneonymus* Desbr. p. 136 ist = *Cneomorphus* Seidl. p. 140. — Das Thier muß *Heydeneon. amplicollis* Schb. heißen.

167. *Barynotus alternans* Bohem. u. *squalidus* Gyll. sind ♂♀ derselben Art.

168. *B. illaesirostris* Fairm. = *squamosus* Germ.

169. *Cneorhinus sculus* Rottbg. = *meridionalis* Duv.

170. *Cn. tumidus* Desbr. = *Cordubensis* Kirsch e typis.

171. *Liophloeus chrysopterus* Bohem. = *gibbus* Bohem. var.
172. *Sciaphilus bellus* Rosh. = *viridis* Bohem.
173. *Sitones seriesetosus* Schh.; str. Aegypten!
174. *Polydrosus Emeryi* Desbr. = *Neapolitanus* Desbr. = *frater* Rottbg. nach Desbrocher's Mittheilung.
175. *Pol. cephalotes* Desbr. et *convexifrons* Desbr. = *bellus* Krtz.
176. *Pol. pallidivestis* Desbr. = *dilutus* Motsch. e typis.
177. *Thylacites fullo* Er.; str. Algier!
178. *Th. araneiformis* Chevr. = *heliophilus* Chevr.
179. *Th. Schönherrii* Desbr. = *tesselatus* Gyll. var.
180. *Th. glabratus* Gyll. ebenfalls.
181. *Tanymecus metallinus* Fairm.; str. Tanger!
182. *Chlorophanus sibiricus* Gyll. = *salicicola* Germ.
183. *Barynotus caucasicus* Desbr. ist ein *Meleus* bei *silphoides* Hrbst.
184. *Scythropus argenteolus* Chevr. = *squamosus* Ksw.
185. *Phytonomus brunnipennis* Bohem.; str. Aegypten! Aehnlich gefärbte Stücke aus Sicilien, die für die Bohemann'sche Art gehalten werden, gehören zu *murinus* F.
186. *Lithocryptus* Desbr. ist zu streichen, da der *L. helveticus* der allbekannte *Otiorynchus septentrionis* Hbst. u. *arvernica* Desbr. auch diese oder eine andere verwandte Art ist.
187. *Conorrhynchus Heydeni* Desbr. ist zu streichen. Meine Typen sind aus Chodshent!
188. *Gonocleonus Weisei* Reitt. = *angulatus* Chevr.
189. *Pachytychius subasper* Fairm.; str. Tanger!
190. *Erirhinus Brancsikii* Tourn. et *Gerhardti* Letzn. = *Phloeophagus aterrimus* Hampe; gehört zu *Erirhinus* und muß den Hampeschen Namen führen.
191. *Magdalis quercicola* statt *9. uecicola*.
192. *Cionus Villae* Comolli = *Blattariae* F. var.
193. *Ceuthorhynchus carneus* Perris = *Bertrandi* Perris.
194. *Rhyncolus exiguus* Bohem. = *culinaris* Germ.
195. *Callidium aeneipenne* Kriechb. muß heißen *cupripenne*.
196. *Allocerus fulvus* Mls. (*ferrugineus* Krtz.) = *Hesperophanes moesiacus* Friv. — Das Thier muß heißen *Alloc. moesiaca*.
197. *Clytus Zebra* Lap.; str.
198. *Cl. Sternii* Krtz. und *Auboueri* Desbr. sind doch = *cineus* Lap.; der letzte Name der älteste.
199. *Dorcadion divisum* Germ.; str. Asiatische Türkei!

200. *Agapanthia flum* Rossi nach Abbildung und Beschreibung sicher = *Calamobius gracilis* Cr., ebenso *hirta* F. Fabricius bezieht sich auf Rossi.

201. *Menesia 4-pustulata* Muls. = *bipunctata* Zoubk. Varietät mit 4 Flecken, wie sie unter normalen Stücken nicht selten ist.

202. *Phytoecia fuscicornis* Heyd. ist aus Algier! wie l. c. Index richtig angegeben ist; im Text Berl. Ent. Ztschr. 1863. p. 130 ist Vaterland irrthümlich weggelassen.

203. *Oxymirus testaceus* Gredl. 1866 = *Verneulii* Muls. 1839 (einfarbig gelbe, goldgelb tomentirte *cursor* ♀).

204. *Pachyta borealis* Gyll.; Lapponia! fehlt.

205. *P. balcanica* Hampe; Balkan! fehlt.

206. *Judolia erythrura* Küst. = *erratica* Dalm. var. hat mit 6-maculata L. (= *trifasciata* F.) gar keine Verwandtschaft.

207. *Acmoeops strigilata* F. = *pratensis* Laich.

208. *Strangalia approximans* Rosenh. (= *purpuripennis* Muls.) mit purpurrothen einfarbigen Decken bei ♂♀ hat mit der blutroth schwarzgefleckten *distigma* Charp. gar nichts zu thun. Siehe meine spanische Reisebeschreibung.

209. *Leptura Jaegeri* Hummel u. Synonym ist eine *Leptura*.

210. *Grammoptera femorata* F. u. *monticola* Abeille gehören zu *variegata* Germ., *femorata* älteste Name.

211. *G. discolor* Fairm. var. *Kiesenwetteri* Krtz.; Sarepta! fehlt.

212. *G. pilosa* Forst. ist der *Clytus glabromaculatus* Goeze (= *glaucus* F.).

213. *Dryocoetes Alni* Georg; G.! fehlt.

214. *Mycetoporus elegans* zu *Bryoporus*.

215. *Labidostomis senicula* Krtz. = *metallica* Lef.

216. *L. chalybeicornis* Brull., Mischart.; str.

217. *L. maculipennis* Lef.; Kleinasien! str.

218. *Barathraea* zu streichen. Nur Nordküste Afrika! Spanische, von Suffrian dafür gehaltene Stücke sind *Lachnaea vicina* Lac.

219. *Gynandrophthalma gratiosa* Luc.; str. Algier! früher mit der spanischen *amabilis* Lac. verwechselt.

220. *G. thoracica* Küst. nach Typ in meiner Samml. = *xanthaspis* Germ. var.

221. *Coptocephala bistrinotata* F. (= *melanocephala* Ol.); nur Algier!

222. *Pachnephorus ruficornis* Lef.; str. Meine Originale aus Bagdad!

223. *Pachnephorus lepidopterus* Küst. = *tesselatus* Dft. Ich habe Typ.

224. *Cryptocephalus 10-maculatus* L. var. *bothnicus* L.; doppelt.

225. *Timarcha Lomnickii* Mill. = *rugulosa* Herr.-Sch.

226. *Chrysomela fulgens* Duf. = *cerealis* L. var.

227. *C. cantabrica* Heyd.; Astur.! fehlt nach *coriacea* Suffr.

228. *Phyllodecta atrovirens* Cornel. = *laticollis* Suffr.

229. *P. pumila* Rehe. ist die *Prasocuris Suffriani* Küst.

230. *Galleruca Macchoi* statt *Maecochi*.

231. *Malacosoma Gaudioni* Rehe.; str. Syrien!

232. *Calomicrus foreolatus* Rsh. = *Luperus sulphuripes* Graëlls.

233. *Lithonoma Favieri* Fairm. = *immaculata* Kiesw.; aus Malaga! fehlt.

234. *Phyllotreta fallax* All. gehört zu *flexuosa* Ill. Ich habe Typ.

235. *Longitarsus rubenticollis* All.; Lu.! fehlt.

236. *Cassida angusticollis* Hagb. ist eine monströse bekannte Art; str. Siehe Mitth. Schweiz. Ent. Ges.

237. *Combocerus fasciatus* Kol.; str. Ist = *Loberogosmus fasciatus* Kol. auf p. 73.

238. *Hylaia rubricollis* statt *rubicollis*.

239. *Coccinella decempunctata* L.; str. Gleich nachher noch einmal als *10-punctata* L.

240. *Propylaea 14-guttata* L.; str. Kommt schon als *Calvia* vor.

241. *Exochomus* var. *nigripennis* Er.; str. Aegypten!

242. *Platysyllus Castoris Ritsema* ist zu streichen, da das merkwürdige Thier nur einmal im Amsterdamer Zool. Garten auf dem amerikanischen Bieher schmarotzend gefunden wurde.

2. Ueber Staphylinen; von Dr. Eppelsheim in Grünstadt.

Nach langem Harren ist das täglich dringender gewordene Bedürfnis nach einem neuen Verzeichniss der europäischen Käfer befriedigt, und gewiss haben mit mir viele Entomophilen das Erscheinen der 2ten Auflage des Stein'schen Catalogs mit Freuden begrüßt. Dieselbe entspricht in ihrer erweiterten Gestalt wohl nicht bloß billigen, sondern selbst strengen Anforderungen. Auch die allerneueste Literatur ist mit einer Sorgfalt und Sachkenntnis benutzt, daß der Catalog als auf der Höhe der neuesten entomologischen Wissenschaft stehend betrachtet werden kann. Wenn ich mir daher bezüglich der Familie der Staphylinen einige Bemerkun-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [22_1878](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Bemerkungen zur: Catalogi Coleopterorum Europae editio secunda, auctoribus Dr. J. P. E. Frdr. Stein et Jul. Weise. Berol. 1877. 161-170](#)