

## Sammelberichte. <sup>1)</sup>

### 1. Von J. Gerhardt in Liegnitz. (1876.)

*Haliphus Heydeni* Wehncke. In Lehmümpeln z. s. Die Interstitien der Punktstreifen in beiden Geschlechtern glatt, ohne Chagrini rung.

*Hal. ruficollis* de Geer und *fluviatilis* v. Kiesw. Die hintere Hälfte der Decken bei den Weibchen äußerst fein und dicht chagriniert (punktirt).

*Hal. immaculatus mihi*. Mit dem vorigen zusammen, doch, wie es scheint, nur in stehenden Gewässern. In beiden Geschlechtern ohne Chagrini rung. Von *fluviatilis*, dem er am nächsten steht, durch nur selten unterbrochene schwarze Punktstreifen unterschieden. Carina des Prosternums rinnenförmig, nicht eben.

*Hal. fulvicollis* Er. ist in beiden Geschlechtern glattdeckig.

*Hydroporus dorsalis* Fabr. Im Ausflus des großen Grundsees z. h.; sonst in Schlesien s. s.

*Laccophilus variegatus* Germ. Im Frühjahr, s. s.

*Hydrobius bicolor* Payk. liebt die Conferven der Lehmümpel (80 Stück).

*Philhydrus maritimus* Thoms. 3 St. in einem Sandgrubentümpel.

*Philhydrus suturalis* Sharp. Selten; namentlich im Frühjahr anzutreffen.

*Helochares dilutus* Er. Zahlreich unter gleichen Verhältnissen wie *Hydrobius bicolor*.

*Laccobius biguttatus mihi*. Zu Rottenberg's Gruppe A, neben *L. viridiceps* Rottb. gehörend, in Gröfse und Sculptur der Decken, auch in der kugeligen Form dem *L. globosus* Rottb. ganz nahe stehend, durch die fehlende Chagrini rung des Halsschildes, hellere Grundfarbe und einen großen, gut markirten helleren, ovalen Fleck vor der Spitze der Decken etc. ausgezeichnet. — Nach Vergleich der Rottenberg'schen Typen unterliegt es mir keinem Zweifel, daß *Lac. nigriceps* Rottbg. mindestens in 3 gute Arten zerfällt.

*Lac. nigriceps* Thoms., *maculiceps mihi*, *obscurus mihi*.

*Helophorus Erichsoni* Bach. S. s. in Sandgrubentümpeln.

*Hel. strigifrons* Thoms. Bei Kanth (noch von Herrn E. Schwarz entdeckt).

---

<sup>1)</sup> Näheres über die in diesem Sammelbericht aufgeführten Nova s. Zeitschrift für Entomologie. Heft VI. Breslau.

*Ochthebius pygmaeus* Fabr. Das ♀ hat matte, das ♂ glänzende Decken.

*Xantholinus picipes* Thoms. (*atratus* Redt.) unter *Formica congerens* s.

*Xanth. atratus* Thoms. und *punctulatus* Thoms. halte ich für gut unterschiedene Arten. Beide hier n. s.

*Stenus littoralis* Thoms. Aus Laub an einem Weiher. s. s.

*St. montivagus* Heer. Von H. Habelmann n. s. im Iser-, von mir im Riesengebirge gefunden.

*Orochares angustatus* Er. Zahlreich im Decbr. und Jan. an Planken in der Nähe frisch gebreiteten Düngers.

*Omalius affine mihi*. 1 Ex. im Nov. v. J. an Planken; dem *Om. florale* äußerst nahe stehend, Decken kürzer und zwischen den Punkten derselben eine sehr feine, aber deutliche, netzartige Chagriniung.

*Meligethes Moravicus* Redt. 1 St.

*Agrilus viridis* Lin. Zwei aus den Vorbergen durch Hrn. Hegemeister Hochhäusler, einem sehr aufmerksamen Beobachter, erhaltene Ex. zeigen einen tiefen Ausschnitt am Seitenrande des Halsschildes, der bei dem einen Stücke nur an einer Seite vorhanden ist.

*Coraebus elatus* liebt besonders die Blüthenkörbe von *Chrysanthemum Leucanthemum*.

*Trachys nanus* fehlt hier, *pumilus* ist n. s.

*Athous porrectus* Thoms. s. s. mit *hirtus*.

*Cis microgonus* Thoms. In Fichtenschwämmen; Falkenberge bei Fischbach. Riesengrund.

*Anaspis (Silaria) palpalis* Gerh. Auch in Blüthen von *Peucedanum Oreoselinum* mit *brunnipes* zusammen, jedoch viel seltener.

*Sitones punctiger* Thoms., mit *flavescens* n. s.

*Bagous muticus* Thoms. Häufig am Seedorfer See.

*Cassida Seladonia* Gyll. Bisher mit *C. rufo-virens* verwechselt. Plantener Höhen zwischen den Stengeln der *Carex ericetorum*; s. s.

*Longitarsus fusco-aeneus* Redt. Ziemlich häufig Anfang Mai von *Lithospermum arvense* gestrichen.

*Plectroscelis confusa* Boh. Auf sumpfigen Haidewiesen häufig. Aendert ab mit ganz dicht runzlig-punktirter Oberfläche.

*Plectr. chalcites* Först. Mit dem vorigen; einige Ex.

## 2. Von J. Weise in Berlin. (1877.)

## A. Mark Brandenburg.

*Placusa atrata* Sahlb. zahlreich unter Birkenrinde im Finkenkrüge (neu für Berlin).

*Oligota granaria* Er. mit *Tritoma 4-guttata* Müll. häufig in den unteren Räumen von Wassermühlen bei Sommerfeld.

*Quedius chrysurus* Ksw., *Batrisus formicarius* Aub. (neu f. B.) und *venustus* Rchb., *Conoderus conicicollis* Fairm. (neu f. Deutschl.) selten, *Plegaderus discisus* Er., *dissectus* Er., *caesus* Ill., *Abraeus globosus* Crtz., *granulum* Er. und *Rhyncolus gracilis* Rsh. h. in hohlen Buchen bei Eberswalde.

*Euthia plicata* Gyll. zieml. zahlr. in einem Haufen von *Formica rufa* im Finkenkrüge.

*Necrophorus germanicus* L. h. var. *speciosus* Schulze s. in einem todtten Hunde von Hrn. Moritz gefunden.

*Ditoma obscura* Redtb. im Finkenkrüge gekäschert (v. Harold) (neu f. B.).

*Trixagus brevicollis* Bonv. aus Eichenlaub gesiebt bei Moabit (neu f. B.).

*Corticeus rufulus* Rosh. (neu f. B.) mit *Nemosoma elongatum* u. *Sacium obscurum* in den Bohrlöchern von *Taphrorychus bicolor* Hbst. in trockenen Buchen bei Eberswalde.

*Gasterocercus depressirostris* s. h. in trockenen Eichenscheiten bei Köpenick (Moritz).

*Acalles camelus* L. und *turbatus* Boh. (neu f. B.) gesiebt aus dem Moose an Buchenstämmen bei Eberswalde.

*Phytobius Waltoni* Boh. (neu f. B.) s. h., *Litodactylus leucogaster* Mrsh. selten an Erlenwurzeln bei Friedrichshagen.

*Bradybatus Kellneri* Bach. gesiebt an den Wurzeln einer hohlen Rüster bei Tegel.

*Ceutorrhynchus macula-alba* mit *albosignatus*, *lycopi* Gyll. und *Phytoecia molybdaena* Dalm. (neu f. B.) auf blühendem Papaver rhoeas bei Moabit.

*Apion filirostre* Kirb. im Oct. zahlr. in Pankow gekäschert.

*Apion Spencei* Kirb. auf jungen Lindentrieben im Finkenkrüge.

*Pityophthorus glabratus* Eichh. in dürren Kieferzweigen h. bei Berlin.

*Trypodendron signatum* Fabr. in Birkenrinde im Finkenkrüge.

*Lema Duftschmidi* Redt. gekäschert im Finkenkrüge (v. Harold) und bei Salzbrunn in Schlesien (Schilsky).

B. Altvater in Schlesien im Juli (Wetter sehr schlecht).

*Homalium ferrugineum* Kraatz. Kergle. Petersteine.

*Eudectus Giraudi* Redt. 1 Ex. am Petersteine.

*Coryphium angusticolle* Steph. mit *Curimus hispidus*, *Phloeostichus denticollis* und *Mycetina cruciata* gesiebt aus dem Moose an Buchenstämmen.

*Choleva nivalis* Kr. 1 Ex. unter einem Steine am Petersteine.

*Colon latum* Kr. 1 Ex. u. *Hydnobius punctatissimus* nebst *punctatus* am Rothen Berge gekäschert.

*Liodes serricornis* Gyll. 1 Ex. gesiebt. Rother Berg.

*Xylophilus alni* Fabr. zahlr. in einem Fichtenstubben am Rothen Berge. *Prionocyphon serricornis* Mll. selten.

*Cis lineatocribratus* Mell. s. am Rothen Berge.

*Salpingus mutilatus* Beck. u. *Orchesia blandula* Branes. an trocknen Buchenästen. Rother Berg.

*Omius forticornis* Boh. s. h. unter modernden Fichtennadeln im ganzen Gebirge.

*Cryptocephalus Wydleri* Fald. Rother Berg.

*Tomicus amitinus* Eichh. Salzbrunn in Schlesien (Schilsky).

C. Lissa hora in Mähren. 21. Juli.

*Oligota apicata* Er. gesiebt bei Althammer.

*Enicmus carpathicus* Rtt. s. in alten Buchenschwämmen.

*Ceruchus tenebrioides* F., *Serropalpus barbatus* u. *Acanthocinus costatus* F. in der dicken Rinde geschlagener Fichtenstämmen.

*Mordella perlata* Sulz. 1 Ex. an einem alten Fichtenstocke.

*Rhyncolus crassirostris* Perris in einem Fichtenstocke.

D. Die Herren Reitter und Leder durchforschten im Juni das östliche Ungarn, die Czerna hora etc. und brachten eine reiche Ausbeute an seltenen und noch unbekanntem Thieren mit nach Hause; z. B. *Oxypoda montana*, *Niphedodes Redtenbacheri*, *Platynus glacialis*, *Bembidion cardionotum*, *Laena Reitteri* etc. Hierüber wird ein ausführlicher Bericht in den Brünner Verhandl. erscheinen.

E. Von H. Becker wurden folgende *Stenus* gesammelt.

A. bei Sarepta: *Juno*, *canaliculatus*, *argentellus*, *unicolor*, *fuscipes*, *cordatus*, *plantaris*.

B. bei Astrachan: *bupthalmus*, *circularis*.

*Haltica Atropae* E. H. unterscheidet sich von *H. pubescens* außer dem bekannten hellen Spitzenfleck der Decken auch durch die nur ein halb Mal so lang wulstförmig verdickten Seitenränder des Halsschildes und den Mangel einer netzartigen Chagriniung auf diesem und dem Schildchen. (Mittheil. von Gerhardt.)