

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXIII. 1879. Heft I.]

Systematisches Verzeichniß
der
Schmetterlinge Berlin's und der Umgegend
von
Julius Pfützner.

In dem nachfolgenden, vervollständigten und berichtigten Verzeichnisse der Schmetterlinge Berlin's und Umgegend (in Jahrgang XI. 1867. dieser Zeitschrift) sind die seit jener Zeit von mir und meinen hiesigen entomologischen Freunden in der Umgebung Berlin's neu aufgefundenen Arten und Varietäten sorgfältig nachgetragen.

Dasselbe ist nach Dr. Staudinger's Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebiets von 1871 entworfen.

Die Anzahl der im eigentlichen Europa daselbst aufgezählten Groß-Schmetterlinge beträgt

292	<i>Rhopalocera</i> ,
136	<i>Sphinges</i> ,
297	<i>Bombyces</i> ,
881	<i>Noctuae</i> ,
681	<i>Geometrae</i> ,

in Summa 2287 Arten.

Von diesen kommen auf die Fauna Berlin's und Umgegend:

<i>Rhopalocera</i> :	98	Arten,
<i>Sphinges</i> :	45	-
<i>Bombyces</i> :	127	-
<i>Noctuae</i> :	285	-
<i>Geometrae</i> :	192	-

im Ganzen 747 Arten,

welche mithin nahezu $\frac{1}{3}$ aller, innerhalb der Grenzen Europa's vorkommenden Arten repräsentiren.

Der Raumersparniß wegen habe ich mich folgender Abkürzungen bedient:

g. = gemein, h. = häufig, z. h. = ziemlich häufig, n. h. = nicht häufig, s. = selten, z. s. = ziemlich selten, s. s. = sehr selten.

RHOPALOCERA.

Papilio L.

Podalirius L., s., seit mehreren Jah-
Machaon L., h. [ren fehlend.

Aporia Hb.

Crataegi L., g., in manchen Jahren
fehlend.

Pieris Schrk.

Brassicae L., g., meist schädlich.
Rapae L., g., desgl.
Napi L., g., oft schädlich.
var. Napaeae Esp., g., desgl.
Daplidice L., h.
var. Bellidice O., h.

Antiocharis B.

Cardaminis L., h.

Leucophasia Stph.

Sinapis L., h.

Colias F.

Hyale L., h.
Edusa F., s., nur in einzelnen Ex.

Rhodocera B.

Rhamni L., g.

Thecla F.

Betulae L., n. h.
Spini Schiff., in manchen Jahren n. s.
W album Knoch., z. h.
Quercus L., z. h.
Rubi L., h.

Polyommatus Latr.

Virgaureae L., h.
Dispar Hw. var. Rutilus Wernb., an
wenigen Stellen zuw. n. s.
Hippothoë Hb.
Hippothoë L., h.
Chryseis Bkh.
ab. Confluens Gerh., einzeln unt. d.
Alciphron Rott., h. [Stammart.
Hipponoë Esp.
Dorilis Hufn., h.
Circe Schiff.
Phlaeas L., überall g.

Lycaena F.

Argiades Pall., n. h.
Amyntas F.
var. Polysperchon Bergstr., n. h.
Aegon Schiff., h.
Argus L., h. [Grunewald zuw. n. s.
Optilete Knoch., an einz. Stellen im
Baton Bgstr., z. h.
Hylas Hb.
Astrarche Bgstr., z. h.
Agestis Hb.
Icarus Rott., überall h.
Alexis Hb.
Eumedon Esp., zuw. z. h. Brieselang.
Amanda Schn., im Brieselang h.
Icarius Esp.
Coridon Poda, z. h.
Argiolus L., h.
Minima Fuessl., n. s.
Alsus F.
Semiargus Rott., überall h.
Acis Schiff.
Cyllarus Rott., s.
Alcon F., n. s.
Euphemus Hb., s.
Arion L., n. s.
Arcas Rott., s.
Erebus Knoch.

Apatura F.

Iris L., s.
Ilia Schiff., zuw. z. h. Brieselang.
ab. Clytie Schiff., desgl.

Limnitis F.

Populi L., z. s.
Sibylla L., n. h.

Vanessa F.

Levana L., h.
ab. Porima O., s.
var. Prorsa L., h.
C album L., h.
Polychloros L., g.
Xanthomelas Esp., s. s. Brieselang;
Urticae L., g. [fehlt seit viel. Jahren.
Io L., h.
Antiopa L., h.
Atalanta L., h.
Cardui L., in manchen Jahren h.

Melitaea F.

- Maturna L., s. s., fehlt seit viel. Jahr.
 Aurinia Rott., h.
 Artemis Hb.
 Cinxia L., h.
 Didyma O., h.
 Dictynna Esp., h.
 Athalia Rott., h.
 var. Melicerta Pfützner (? hibr. ex
 Athal. et Dictynna) einz. Brieselang.
 Aurelia Nick., h.
 Parthenie Hbst. [lang.
 var. Britomartis Assm., z. s. Briesel-

Argynnis F.

- Selene Schiff., h.
 Euphrosyne L., z. h.
 Pales Schiff. var. Arsilache Esp., spar-
 Dia L., n. s. [sam; Grunewald.
 Daphne Schiff., n. h.
 Ino Rott., h.
 Lathonia L., h.
 Aglaja L., h.
 Niobe L., h.
 ab. Eris Meig., n. s.
 ab. Pelopia Bkh., s.
 Paphia L., z. h.
 ab. ♀ Valesina Esp., z. s.

Melanargia Meig.

- Galathea L., h.

Erebia B.

- Aethiops Esp., h.
 Medea Hb.

Satyrus F.

- Aleyone Schiff., h.
 Semele L., g.
 Statilinus Hufn., n. s.

Pararge Hb.

- Maera L., s. s., fehlt seit viel. Jahr.
 Megera L., h.
 Aegeria L. var. Egerides Stgr., h.
 Achine Sc., s. s., fehlt seit viel. Jahr.
 Dejanira L.

Epinephele Hb.

- Lycaon Rott., h.
 Eudora Esp.
 Janira L., g.
 Tithonus L., s.
 Hyperantus L., h.

Coenonympha Hb.

- Iphis Schiff., h.
 Arcania L., h.
 Pamphilus L., überall g.
 Tiphon Rott., h. auf nassen Wiesen.
 Davus F.

Spilothyrus Dup.

- Alceae Esp., z. h.
 Malvarum Hfsgg.

Syrichthus B.

- Carthami Hb., z. s.
 Alveus Hb., z. s.
 Malvae L., g.
 Alveolus Hb.
 ab. Taras Meig., n. s.

Hesperia B.

- Thaumas Hufn., h.
 Linea F.
 Lineola O., h.
 Acteon Rott., s.
 Sylvanus Esp., h.
 Comma L., z. h.

Cyclopides Hb.

- Morpheus Pall., z. h. Bredower Forst.
 Steropes Schiff.

HETEROCERA.**A. Sphinges L.****Acherontia O.**

- Atropos L., z. s.

Sphinx O.

- Convolvuli L., z. s.
 Ligustri L., h.
 Pinastri L., h.

Deilephila O.

- Galii Schiff., n. s.
 Euphorbiae L., h.
 hibr. Phileuphorbia Mütz. (2 Ex. gez.)
 Livornica Esp. (2mal als Zugvogel
 Lineata F. [gefangen.)
 Celerio L., als Zugvogel einigemal
 gef. u. 1mal als Raupe a. Weinstock.
 Elpenor L., n. s.
 Porcellus L., z. h.
 Nerii L., erscheint nur zeitweise, die
 Raupen in einzelnen Jahren n. s.

Smerinthus O.

Tiliae L., überall h.
Ocellata L., h.
Populi L., überall h.

Macroglossa O.

Stellatarum L., h.
Bombyliiformis O., n. h.
ab. Milesiformis Tr., s.
Fuciformis L., z. h.

Trochilium Sc.

Apiforme Cl., h.
Melanocephalum Dalm., z. s.
Laphriaeformis Hb.

Sciapteron Stgr.

Tabauiforme Rott., h.
Asiliformis Schiff.

Sesia F.

Scoliaeformis Bkh., n. h.
Sphecoformis Ger., n. s.
Tipuliformis Cl., h.
Conopiformis Esp., n. s.
Asiliformis Rott., n. h.
Cynipiformis Esp.
Myopaeformis Bkh., z. s.
Mutillaeformis Lasp.
Cuculiformis L., h.
Formicaeformis Esp., h.
Ichneumoniformis F., s.
Empiformis Esp., h.
Tenthrediniformis Lasp.
Musciformis Vw., h.
Philanthiformis Lasp.
Leucopsiformis Esp., n. s.

Bembecia Hb.

Hylaeiformis Lasp., n. s.

Ino Leach.

Pruni Schiff., n. h.
Statice L., g.

Zygaena F.

Pilosellae Esp., h.
Minos Fuessl.
Achilleae Esp., z. s.
Meliloti Esp., h.
Trifolii Esp., h.
ab. Confluens Stgr., n. s.
ab. Orobi Hb., n. s.
Lonicerae Esp., h.
Filipendulae L., h.
Ephialtes L. var. Peucedani Esp., h.

Carniolica Scop., s. bei Rüdersdorf.
Onobrychis Schiff.
var. Berolinensis, h. bei Rüdersdorf.

Syntomis Ill.

Phegea L., an manchen Stellen z. h.
Bredower Forst.

Naelia B.

Ancilla L., n. s.

B. Bombyces.

Sarrothripa Gn.

Undulana Hb., mit ihren mannichfa-
Revayana Tr. [cheu Varietät. z. s.

Earias Hb.

Vernana H., s.
Clorana L., überall h.

Hylophila Hb.

Prasinana L., n. s.
Bicolorana Fuessl., h.
Quercana Schiff.

Nola Leach.

Togatulalis Hb., s.
Cucullatella L., z. s.
Strigula Schiff., z. s.
Confusalis H.-S., z. s.
Albula Hb., h.
Centonalis Hb., s.

Nudaria Stph.

Senex Hb., s. Jungfernheide.

Calligenia Dup.

Miniata Forst., h.
Rosea F.

Setina Schrk.

Irrarella Cl., h.
Mesomella L., h.
Eborina Hb.

Lithosia F.

Muscicarda Hufn., h.
Griseola Hb., z. h.
Deplana Esp., s.
Depressa Esp.
Lurideola Zinck., n. s.
Complana L., h.
Unita Hb. var. Arideola Hering, s.
Lutarell L., h.
Luteola Schiff.
Sorocula Hufn., h.
Aureola Hb.

Gnophria Stph.

Quadra L., in manchen Jahren h.
Rubricollis L., n. h.

Emydia B.

Striata L., h.
Grammica L.
Cribrum L., n. s.

Deiopeia Stph.

Pulchella L., 2mal 1 Ex. gef. bei Köp-
Pulchra Schiff. [nick u. Spandau.

Euchelia B.

Jacobaeae L., h.

Nemeophila Stph.

Russula L., h.

Callimorpha Latr.

Dominula L., h., Brieselang. [ant.
ab. Rossica Kol., s. s. unt. d. Stamm-

Aretia Schrk.

Caja L., überall h.
Villica L., z. h.
Purpurata L., n. h.
Purpurea L.
ab. Flava Stgr., s.
Hebe L., n. h.

Spilosoma Stph.

Fuliginosa L., h.
Luctifera Esp., z. h.
Mendica Cl., n. h.
Lubricipeda Esp., h.
Menthastri Esp., h.
Urticae Esp., z. h.

Hepialus F.

Humuli L., z. s.
Hecta L., h., Finkenkrug.

Cossus F.

Cossus L., h.
Ligniperda F.

Zenzera Latr.

Pirina L., n. s.
Aesculi L.

Phragmatoccia Newm.

Castaneae Hb., n. s.
Arundinis Hb.

Heterogenea Knoch.

Limacodes Hufn., h.
Testudo Schiff.
Asella Schiff., z. h.

Psyche Schrk.

Unicolor Hufn., h.
Graminella Schiff.
Villosella O., n. h.
Viciella Schiff., Raupe h., ♂ s.
Graslinella B., s. Jungfernheide.
Atra Frr.
Hirsutella Hb., h.
Calvella O.

Epichnopteryx Hb.

Pulla Esp., z. s., Fuchsberge.

Fumea Hb.

Intermediella Brd., überall g.
Nitidella Hoff.
Betulina Z., z. s., Thiergarten.
Sepium Spr., n. h., Grunewald.

Orgyia O.

Gonostigma F., n. s.
Antiqua L., überall h.

Dasychira Stph.

Fascelina L., h.
Pudibunda L., h.

Laelia Stph.

Coenosa Hb., s., Jungfernheide.

Laria Hb.

L nigrum Mueller, z. s.
V nigrum F.

Leucoma Stph.

Salicis L., g., meist schädlich.

Porthesia Stph.

Chrysorrhoea L., g., oft schädlich.
Similis Fuessl., h.
Auriflua F.

Psilura Stph.

Monacha L., g., zuweilen schädlich.
ab. Eremita O., n. s. unt. d. Stammart.

Oenieria H.-S.

Dispar L., g., oft schädlich.

Bombyx B.

Crataegi L., z. s.
Populi L., n. s.
Castrensis L., h.

Neustria L., g., oft schädlich.
 Lanestris L., h.
 Trifolii Esp., z. h.
 ab. Medicaginis Bkh., s.
 Quercus L., h.
 Rubi L., h.

Crateronyx Dup.

Dumi L., z. s.
 Dumeti L.

Lasiocampa Latr.

Potatoria L., zuweilen h.
 Pruni L., s.
 Quercifolia L., n. s.
 ab. Alnifolia O., z. s.
 Populifolia Esp., z. s.
 Tremulifolia Hb., s.
 Betulifolia O.
 Pini L., g., zuweilen schädlich.

Endromis O.

Versicolora L., n. h.

Saturnia Schrk.

Pavonia L., z. h.
 Carpini Schiff.

Aglia O.

Tau L., zuw. h. Brieselang.

Drepana Schrk.

Falcatoria L., h.
 Curvatula Bkh., z. s.
 Harpagula Esp., s.
 Sicula Hb.
 Lacertinaria L., h.
 Binaria Hufn., n. h.
 Hamula Esp.
 Cultraria F., s.
 Unguicula Hb.

Cilix Leach.

Glauca Sc., z. s.
 Spiniula Schiff.

Harpyia O.

Bicuspis Bkh., s. s.
 Furcula L., n. h.
 Bifida Hb., h.
 Vinula L., h.

Stauropus Germ.

Fagi L., z. s. Brieselang.

Hybocampa Ld.

Milhauseri F., s. Thiergarten.

Notodonta O.

Tremula Cl., n. s.
 Dictaea Esp.
 Dictaeoides Esp., n. s.
 Ziezac L., z. h.
 Tritophus F., z. s.
 Dromedarius L., n. s.
 Chaonia Hb., z. s.
 Querna F., s.
 Bicolaria Schiff., s. Brieselang.

Lophopteryx Stph.

Carmelita Esp., s. Finkenkrug.
 Camelina L., h.
 Cuculla Esp., s. Finkenkrug.
 Cucullina Hb.

Pterostoma Germ.

Palpina L., h.

Gluphisia B.

Crenata Esp., 1 Ex. Finkenkrug.

Ptilophora Stph.

Plumigera Esp., s. Brieselang.

Cnethocampa Stph.

Processionea L., n. h. [lend.
 Pinivora Tr., s., seit viel. Jahren feh-

Phalera Hb.

Bucephala L., überall h.

Pygaera O.

Anastomosis L., z. h.
 Curtula L., h.
 Anachoreta F., h.
 Pigra Hufn., n. s.
 Reclusa F.

Gonophora Brd.

Derasa L., in manchen Jahren n. s.

Thyatira O.

Batis L., h.

Cymatophora Tr.

Or F., n. s.
 Duplaris L., n. s.
 Bipuncta Bkh.
 Fluctuosa Hb., z. s. Finkenkrug.

Asphalia Hb.

Flavicornis L., h.
 Ridens F., z. s.
 Xanthoceros Hb.

C. Noctuae.**Diloba** Stph.

Caeruleocephala L., g., oft schädlich.

Simyra O.

Nervosa F., z. s.

Arsilonche Ld.Albovenosa Göze, in manch. Jahr. h.
Venosa Bkh.**Demas** Stph.

Coryli L., z. h.

Acronyeta Tr.

Leporina L., n. h.

Aceris L., g.

Megacephala F., n. s.

Alni L., s., stets nur einzeln.

Strigosa F., s. s., Jungferheide.

Tridens Schiff., n. h.

Psi L., überall g.

Cuspidata Hb., s.

Menyanthidis View., h.

Auricoma F., n. h.

Abseondita Tr., n. h.

Euphorbiae F., z. s.

Rumicis L., überall g.

Ligustri F., s., Finkenkrug.

Bryophila Tr.

Frandatricula Hb., s.

Algae F., n. h.

Spoliaticula Hb.

Muralis Forst., s.

Glandifera Hb.

Perla F., h.

Moma Hb.

Orion Esp., h.

Panthea Hb.

Coenobita Esp., s., Jungferheide.

Agrotis O.

Strigula Thnb., n. h.

Porphyrea Hb.

Signum F., n. h.

Sigma Hb.

Janthina Esp., n. h.

Linogrisea Schiff., z. h.

Fimbria L., h.

Sobrina Gu., s. s., Köpnick Forst.

Augur F., z. s.

Obscura Brahm., n. s.

Ravida Hb.

Pronuba L., h.

ab. Innuba Tr., h.

Orbona Hufn., n. s.

Subsequa Hb.

Triangulum Hufn., h.

Baja F., z. s.

Candelarum Stgr., z. s.

Candelisequa Hb.

Cnigrum L., h.

Xanthographa F., h.

Umbrosa Hb., s., Finkenkrug.

Rubi View., n. h.

Bella Bkh.

Dahlia Hb., s. s., Finkenkrug.

Brunnea F., n. s.

Festiva Hb., n. h.

Glareosa Esp., s., Müggelberge.

Hebraica Hb.

Plecta L., h.

Simulans Hufn., z. h.

Pyrophila F.

Putris L., h.

Cinerea Hb., s., Finkenkrug.

Exclamationis L., z. h.

Cursoria Hufn., z. s.

Nigricans L., z. s.

Fumosa Hb.

Tritici L., h.

Obeliscus Hb., s.

Ypsilon Rott., h.

Suffusa Hb.

Segetum Schiff., g.

Clavis Rott.

Corticea Hb., z. s.

Crassa Hb., s. s.

Vestigialis Rott., h.

Valligera Hb.

Praecox L., h.

Prasina F., n. h.

Herbida Hb.

Occulta L., n. s.

Characaeas Stph.

Graminis L., n. h.

Neuronia Hb.

Popularis F., n. s.

Cespitis F., n. h.

Mamestra Tr.

Leucophaea View., h.

Tincta Brahm., z. s.

Nebulosa Hufn., g.

Contigua Vill., z. h.

Thalassina Rott., z. h.

Dissimilis Knoch., z. s.

Suasa Bkh.

Pisi L., h.

Brassicae L., überall g.

Persicariae L., h.

ab. Unicolor Stgr., h.

Albicolon Hb., z. s.

Aliena Hb., 1 Ex. Jungfernheide.

Splendens Hb., s.

Oleracea L., g.

Genistae Bkh., n. s.

Glaucia Hb., s.

Dentina Esp., g.

Trifolii Rott., g.

Chenopodii F.

Reticulata Vill., z. s.

Saponariae Bkh.

Chrysozona Bkh., h.

Dysodea Hb.

Serena F., z. h.

Dianthoeccia B.

Nana Rott., z. s.

Conspersa Esp.

Compta F., h.

Capsincola Hb., h.

Cucubali Fuessl., n. s.

Carpophaga Bkh., s., bei Köpnick.

Perplexa Hb.

Irregularis Hufn., z. s.

Echii Bkh.

Aporophylla Gn.

Lutulenta Bkh., s. s.

Nigra Hw., 1 Ex. Spandauer Forst.

Aethiops O.

Ammoconia Ld.

Caecimacula F., n. h.

Polia Tr.

Polymita L., 1 Ex. Köpnick Forst.

Chi L., n. s.

Dryobota Ld.

Protea Bkh., h.

Dichonia Hb.

Aprilina L., h.

Miselia Stph.

Oxyacanthae L., z. h.

Apamea Tr.

Testacea Hb., z. h.

Luperina B.

Haworthii Curt., an einz. Stellen im
Erupta Germ. [Grunewald zuw. h.

Matura Hufn., n. s.

Texta Esp.

Virens L., n. s.

Zollikoferi Frr., vor vielen Jahren
2 Ex. bei Moabit gefangen.

Hadena Tr.

Porphyrea Esp., n. h.

Satura Hb.

Adusta Esp., z. s., Jungfernheide.

var. Baltica Hering, z. s., Jungfern-

Ochroleuca Esp., s. [heide.

Furva Hb., s., Köpnick Forst.

Lateritia Hufn., h.

Monoglypha Hufn., h.

Polyodon L.

Lithoxylea F., z. s.

Sordida Bkh., n. h.

Infesta Tr.

Basilinea F., z. s.

Rurea F., h.

ab. Alopecurus Esp., n. s.

Scolopacina Esp., z. s.

Gemina Hb., h.

ab. Remissa Tr., h.

Unanimis Tr., n. s.

Didyma Esp., h.

Oculea Gn.

ab. Nictitans, Esp., n. s.

Pabulatricula Brahm, s., Jungfern-

Connexa Bkh. [heide.

Ophiogramma Esp., n. s.

Strigilis Cl., z. h.

ab. Latruncula Lang., z. h.

ab. Aethiops Hw., n. h.

Aerata Esp.

Bicoloria Vill., h.

Furuncula Tr.

ab. Furuncula Hb., n. s.

Dipterygia Stph.

Scabriuscula L., h.

Pinastri L.

Hyppa Dup.

Rectilinea Esp., s.

Chloantha B.

Polyodon Cl., s., Brieselang.

Perspicillaris L.

Eriopus Tr.

Purpureofasciata Piller, zuweilen h.,
Pteridis F. [oft sparsam.

Trachea Hb.

Atriplicis L., h.

Euplexia Sph.

Lucipara L., h.

Brotolomia Ld.

Meticulosa L., n. s.

Naenia Sph.

Typica L., h.

Jaspidea B.

Celsia L., s., Jungfernheide.

Helotrophia Ld.

Leucostigma Hb., n. h.
ab. Fibrosa Hb., z. s.

Hydroecia Gn.

Nictitans Bkh., z. h.
var. Lucens Frr., s., Grunewald.
Micacea Esp., n. h.

Gortyna O.

Ochracea Hb., h.
Flavago Esp.

Nonagria O.

Nexa Hb., n. s.
Cannae O., n. s.
Algae Esp.
Sparganii Esp., h.
Arundinis F., h.
Typhae Esp. [Stammart.
ab. Fraterna Tr., einzeln unter der
Geminipuncta Hatchett, h.
Paludicola Hb.
ab. Nigricans Stgr., n. s.

Coenobia Hw.

Rufa Hw., s.
Despecta Tr.

Senta Sph.

Maritima Tausch., n. h.
Ulvae Hb.
ab. Bipunctata Hw., z. s.
ab. Wismariensis Schmidt, s.

Tapinostola Ld.

Fulva Hb., meist h.
ab. Fluxa Tr., meist h.

Hellmanni Ev., an einzelnen Stellen
im Brieselang n. s.

Calamia Hb.

Lutosa Hb., n. h.
Bathyerga Frr.
Phragmitidis Hb., 1 Ex. vor mehre-
ren Jahren, auch einzeln Ranpen.

Meliana Curt.

Flammea Curt., z. s.
Dubiosa Tr.

Leucania O.

Impudens Hb., n. h.
Pudorina Hb.
Impura Hb., n. h.
Pallens L., h.
Obsoleta Hb., h.
Straminea Tr., z. s.
Comma L., s.
Conigera F., h.
L album L., z. h.
Albipuncta F., z. h.
Lythargyria Esp., h.
Turca L., z. h.

Grammesia Sph.

Trigrammica Hufn., n. s.
Trilinea Bkh.

Caradrina O.

Morpheus Hufn., h. in Gärten.
Quadripunctata F., z. h.
Cubicularis Bkh.
Selini B., s., Jungferuheide.
Respersa Hb., z. s.
Alsines Brahm., h.
Ambigua F., 1 Ex. Jungfernheide.
Taraxaci Hb., s.
Lenta Tr., 1 Ex. Hasenheide.
Gluteosa Tr., 1 Ex. im schles. Busch.
Arcuosa Hw., s.
Airae Frr.

Rusina B.

Tenebrosa Hb., z. h.

Amphipyra O.

Tragopoginis L., h.
Livida F., s. s.
Pyramidea L., z. h.

Taeniocampa Gn.

Gothica L., h.
Miniosa F., z. h.

Pulverulenta Esp., h.
 Cruda Tr.
 Stabilis View., h.
 Gracilis F., s.
 Incerta Hufn., h.
 Instabilis Esp.
 Opima Hb., s. Jungfernheide.
 Munda Esp., s.

Panolis Hb.

Piniiperda Panz., h., zuw. schädlich.

Pachnobia Gn.

Rubricosa F., z. s.

Mesogona B.

Acetosellae F., 1 Ex. Jungfernheide.

Dicycla Gn.

Oo L., n. h.

Calymnia Hb.

Pyralina View., s., Finkenkrug.
 Diffinis L., s., Finkenkrug.
 Affinis L., s., bei Rixdorf.
 Trapezina L., überall g.

Cosmia O.

Paleacea Esp., s., Brieselang.
 Fulvago Hb.

Dyschorista Ld.

Suspecta Hb., s., Brieselang.
 Fissipuncta Hw., z. h.
 Ypsilon Bkh.

Plastenis B.

Retusa L., z. h.
 Subtusa F., n. h.

Orthosia O.

Lota Cl., z. h.
 Macilenta Hb., n. h.
 Cellularis Hufn., h.
 Ferruginea Esp.
 Helvola L., n. s.
 Rufina L.
 Nitida F., s.
 Laevis Hb., n. h.
 Litura L., z. h.

Xanthia Tr.

Citrargo L., n. s.
 Aurago F., s., Jungfernheide.
 ab. Fucata Esp., s.

Flavago F., h.
 Silago Hb.
 Fulvago L., h.
 Cerago F.
 ab. Flavescens Esp., n. h.
 Gilvago Esp., s.
 ab. Palleago Hb., s. s.

Orrhodia Hb.

Erythrocephala F., z. h.
 ab. Glabra Hb., z. h.
 Vau punctatum Esp., n. h.
 Silene Hb.
 Vaccinii L., h.
 ab. Spadicea Hb., z. h.
 ab. Mixta Stgr., n. s.
 Rubiginea F., in manchen Jahr. n. s.

Scopelosoma Curt.

Satellitita L., g.

Scoliopteryx Germ

Libatrix L., g.

Xylina O.

Socia Rott., n. h.
 Petrificata F.
 Furcifera Hufn., h.
 Conformis F.
 Lambda var. Somniculosa Hering, n.
 h. an einz. Stellen im Grunewald.
 Ornitopus Rott., h.
 Rhizolitha F.

Calocampa Stph.

Vetusta Hb., h.
 Exoleta L., h.
 Solidaginis Hb., s.

Xylomiges Gn.

Conspicillaris L., z. s. Grunewald.

Asteroscopus B.

Nubeculosus Esp., s. Finkenkrug.
 Sphinx Hufn., h.
 Cassinea Hb.

Calophasia Stph.

Lunula Hufn., h.
 Linariae F.

Cucullia Schk.

Verbasci L., s.
 Scrophulariae Capieux, h.
 Thapsiphaga Tr., z. s.
 Asteris Schiff., bisweilen h.
 Umbratica L., g.

Tanaceti Schiff., n. h.
 Artemisiae Hufn., g.
 Abrotani F.
 Absinthii L., n. s.
 Argentea Hufn., h.
 Artemisiae Schiff.

Plusia O.

Triplasia L., n. s.
 Asclepiades Schiff., s. Jungfernheide.
 Tripartita Hufn., n. s.
 Urticae Hb.
 C aureum Knöch., bisweilen h.
 Concha F.
 Chrysitis L., h.
 Festucae L., in manchen Jahren h.
 Pulchrina Hw., zuweilen n. s.
 V aureum Gn.
 Gamma L., g.
 Interrogationis L., s.

Anarta Tr.

Myrtilli L., h.
 Cordigera Thnb., s. Grunewald.

Heliaca H.-S.

Tenebrata Sc., n. s.
 Heliaca Bkh.

Heliothis Tr.

Ononis F., s. Felder bei Reinicken-
 Dipsaceus L., z. h. [dorf].
 Scutosus Schiff., n. s.

Chariclea Stph.

Delphinii L., sehr sparsam.
 Umbra Hufn., h.
 Marginata F.

Acontia O.

Lucida Hufn., n. h.
 Solaris Esp.
 Luctuosa Esp., n. h.

Talpocharis Ld.

Paula Hb., h.

Erastria O.

Argentula Hb., h.
 Bankiana F.
 Uncula Cl., h.
 Unca Schiff.
 Pusilla View., s.
 Candidula Bkh.
 Venustula Hb., s. Thiergarten.
 Deceptor Sc., h.
 Atrata Bkh.

Fasciana L., h.
 Fuscata Bkh.

Prothymia Hb.

Viridaria Cl., n. s. auf Wiesen.
 Aenea Hb.

Agrophila B.

Trabealis Sc., überall g.
 Sulphurea Schiff.

Euclidia O.

Mi Cl., überall auf Wiesen h.
 Glyphica L., desgl.

Pseudophia Gn.

Lunaris Schiff., s.

Catopha O.

Alchymista Schiff., s.

Catocala Schrk.

Fraxini L., n. h.
 Elocata Esp., n. s.
 Nupta L., h.
 Sponsa L., n. h.
 Promissa Esp., n. h.

Toxocampa Gn.

Pastinum Tr., n. h. Brieselang.

Aventia Dup.

Flexula Schiff., n. s.

Boletobia B.

Fuliginaria L., n. h.
 Carbonaria Esp.

Helia Gn.

Calvaria F., s. Jungfernheide.

Zanclognatha Ld.

Grisealis Hb., s. Finkenkrug.
 Nemoralis F.
 Tarsipennalis Tr., s.
 Emortualis Schiff., z. s.

Herminia Latr.

Cribrumalis Hb., z. s.
 Cribralis Hb.
 Tentacularia L., auf Wiesen überall g.
 Tentacularis L.
 Derivalis Hb., s.

Pechipogon Hb.

Barbalis Cl., g.

Bomolocha Hb

Fontis Thnb., h.

Crassalis F. [art n. s.

ab. Terricularis Hb., unt. d. Stamm-

Hypena Tr.

Rostralis L., n. h.

Proboscidalis L., h.

Rivula Gn.

Sericealis Sc., h.

Brephos O.

Parthenias L., h.

D. Geometrae.**Pseudoterpna** H.-S.

Pruinata Hufn., n. h.

Cythisaria Schiff.

Geometra B.

Papilionaria L., n. s.

Phorodesma B.

Pustulata Hufn.; z. s.

Bajularia Schiff.

Nemoria Hb.

Viridata L., n. s.

Cloraria Hb.

Strigata Muell., n. s.

Aestivaria Hb.

Thalera Hb.

Fimbrialis Sc., n. s. Cölnische Heide.

Bupleuraria Schiff.

Jodis Hb.

Putata L., h.

Lactearia L., n. s.

Aeruginaria Hb.

Acidalia Tr.

Perochraria F. R., h.

Ochrata Sc., s.

Muricata Hufn., n. s.

Auroraria Bkh.

Dimidiata Hufn., n. s.

Scutulata Bkh.

Virgularia Hb., h.

Incarnaria Hb.

Straminata Tr., n. s.

Pallidata Bkh., z. s.

Bisetata Hufn., n. s.

Humiliata Hufn., überall g.

Osseata F.

Dilutaria Hb., n. h.

Inornata Hw., n. h.

Suffusata Tr.

var. Deversaria H.-S., z. h.

Aversata L., n. s.

var. Spoliata Stgr., h.

Aversata Tr.

Emarginata L., h.

Immorata L., zuweilen h.

Rubiginata Hufn., n. h.

Rubricata F.

Marginepunctata Göze, z. s. Rüders-

Immutata Tr. [dorfer Heide.

Fumata Stph., n. s.

Commutata Frr.

Remutaria Hb., n. s.

Nemoraria Hb., s.

Immutata L., h.

Sylvestraria Hb.

Corrivalaria Kretschmar, z. s. auf

Strigilaria Hb., n. s. [Moorwiesen.

Prataria B.

Ornata Sc., h.

Decorata Bkh., z. h.

Zonosoma Ld.

Pendularia Cl., h.

Orbicularia Hb., s. s.

Annulata Schulze, einige Expl. im

Omicronaria Hb. [Brieselang.

Porata F., n. s.

Punctaria L., z. h.

Linearia Hb., s.

Trilinearia Bkh.

Timandra Dup.

Amata L., g.

Amataria L.

Pellonia Dup.

Vibicaria Cl., s.

Abraxas Leach.

Grossulariata L., g.

Sylvata Sc., n. h.

Ulmata F.

Adustata Schiff., z. s.

Marginata L., g.

Bapta Stph.

Bimaculata F., z. s.

Taminata Hb.

Temerata Hb., s.

Cabera Tr.

Pusaria L., überall g.

Exanthemata Sc., h.

Numeria Dup.

Pulveraria L., z. s.

Ellopie Tr.

Prosapiaria L., n. s.

Fasciaria Schiff.

Metrocampa Ltr.

Margaritaria L., s.

Eugonia Hb.

Quercinaria Hufn., s.

Angularia Bkh.

ab. Carpinaria Hb., s.

Autumnaria Wern., z. s.

Alniaria Esp.

Alniaria L., überall n. s.

Tiliaria Hb.

Erosaria Bkh., s.

ab. Tiliaria Hb., s. s.

Quercinaria Bkh.

Selenia Hb.

Bilunaria Esp., z. s.

Illunaria Hb.

Tetralunaria Hufn., n. h.

Illustraria Hb.

Pericallia Stph.

Syringaria L., z. s. Jungfernheide.

Odontopera Stph.

Bidentata Cl., s. Grunewald.

Himera Dup.

Pennaria L., n. s.

Eurymene Dup.

Dolabraria L., n. s.

Angerona Dup.

Prunaria L., z. h.

ab. Sordata Fuessl., n. s.

Urapteryx Leach.

Sambucaria L., z. s.

Rumia Dup.

Luteolata L., n. h.

Crataegata L.

Epione Dup.

Apiciaria Schiff., n. s.

Paralellaria Schiff., n. s.

Vespertaria Stph.

Advenaria Hb., z. h.

Macaria Curt.

Notata L., überall h.

var. Alternaria Hb., n. h.

Liturata Cl., z. h.

Hybernia Latr.

Leucophaearia Schiff., g. Thiergarten.

ab. Marmorinaria Esp., n. s. desgl.

Nigricaria Hb.

Aurantaria Esp., z. s.

Marginaria Bkh., z. h.

Progemmaria Hb.

Defoliaria Cl., h.

Anisopteryx Steph.

Aceraria Schiff., z. s.

Aescularia Schiff., h.

Phigalia Dup.

Pedaria F., z. h. Thiergarten.

Pilosaria Hb.

Biston Leach.

Hispidarius F., s. Thiergarten; bei

Pomonarius Hb., z. s. [Spandau.

Hirtarius Cl., überall g.

Stratarius Hufn., n. s.

Prodromaria Schiff.

Amphidasis Fr.

Betularius L., h.

Boarmia Tr.

Cinctaria Schiff., n. h.

Repandata L., z. h.

ab. Conversaria Hb., s.

Roboraria Schiff., n. h.

Consortaria F., n. s.

Angularia Thnb., z. s.

Viduaria Bkh.

Lichenaria Hufn., n. s.

Glabraria Hb., s.

Biundularia Bkh., einzeln.

Crepuscularia Hb., überall h.

Luridata Bkh., n. s.

Extersaria Hb.

Punctularia Hb., überall g.

Tephronia Hb.

Sepiaria Hufn., n. h.

Gnophos Tr.

Obscuraria Hb., 1 Ex. b. Rüdersdorf.

Ambiguata Dup., s. Jungfernheide.

Ophthalmicata Ld.

Fidonia Tr.

- Fasciolaria Rott., h.
Cebraria Hb.
Famula Esp., s.
Concordaria Hb.

Ematurga Ld.

- Atomoraria L., überall h.

Bupalus Leach.

- Piniarius L., *g.

Halia Dup.

- Wanaria L., h. in Gärten.
Wavaria F.
Brunneata Thnb., n. h.
Pineteria Hb.

Phasiane Dup.

- Petraria Hb., an einzelnen Stellen im
Grunewald zuw. n. s.
Glarearia Brahm., desgl., z. s.
Clathrata L., fast überall h.

Aspilates Tr.

- Strigillaria Hb., n. s. Cölnische Heide.

Aplasta Hb.

- Ononaria Fuessl., n. h.

Lythria Hb.

- Purpuraria L., überall g.

Ortholitha Hb.

- Plumbaria F., h.
Limitata Sc., h.
Mensuraria Schiff.
Moeniata Sc., n. h.

Mesotype Hb.

- Virgata Rott., n. s.
Lineolata Hb.

Minoa B.

- Murinata Sc., überall g.
Euphorbiata F.

Lithostege Hb.

- Griseata Schiff., auf Brachfeldern n. h.
Farinata Hufn., desgl. n. h.

Anaitis Dup.

- Plagiata L., zuweilen h.

Chesias Tr.

- Spartiatia Fuessl., n. s.

- Rufata F., s. Köpnicker Heide.
Obliquaria Bkh.

Lobophora Curt.

- Carpinata Bkh., z. s.
Lobulata Hb.
Halterata Hufn., n. s.
Hexapterata Schiff.
Sexalisata Hb., z. s.
Sexalata Vill.
Viretata Hb., s.

Cheimatobia Stph.

- Brumata L., überall g., oft schädlich.
Boreata Hb., Jungfernheide n. s.

Triphosa Steph.

- Dubitata L., z. s.

Eucosmia Stph.

- Certata Hb., n. s.
Undulata L., zuweilen h.

Scotosia Stph.

- Vetulata Schiff., h. an feuchten Gräben der Waldwiesen.
Rhamnata Schiff., z. s. im Brieselang.
Transversata Rott.

Lygris Hb.

- Prunata L., n. s. in Gärten.
Testata L., z. s.
Achatinata Hb.
Populata L., n. h.
Associata Bkh., z. s.
Marmorata Hb.

Cidaria Tr.

- Dotata L., n. s.
Pyraliata F.
Fulvata Forster, s. bei Rüdersdorf.
Ocellata L., überall h.
Bicolorata Hufn., n. s.
Rubiginata F.
Variata Schiff., n. s.
var. Obeliscata Hb., n. s.
Juniperata L., n. h.
Siterata Hufn., z. s.
Psittacata Schiff.
Truncata Hufn., z. h.
Russata Bkh.
Firmata Hb., s.
Viridaria F., n. s.
Miaria Bkh.
Fluctuata L., überall g.

Montanata Bkh., z. h.
 Quadrifasciaria Cl., z. s.
 Ligustrata Hb.
 Ferrugata Cl., überall g.
 ab. Spadicearia Bkh., Jungfernh. z. h.
 ab. Unidentaria Hw., einz. unter der
 Designata Rott., n. h. [Stammart.
 Propugnata F.
 Fluviata Hb., 1 Ex. bei Steglitz.
 Gemmata Hb.
 Vittata Bkh., z. s.
 Lignata Hb.
 Dilutata Bkh., n. s.
 Picata Hb., s. Finkenkrug.
 Cuculata Hufn., n. h.
 Sinuata Hb.
 Galiata Hb., n. s.
 Rivata Hb., s.
 Sociata Bkh., überall h.
 Alchemillata Hb.
 Albicillata L., h.
 Hastata L., n. h.
 Tristata L., n. s. Brieselang.
 Alchemillata L., n. h.
 Rivulata Hb.
 Albulata Schiff., auf Waldwiesen g.
 Candidata Schiff., n. h.
 Decolorata Hb., s.
 Luteata Schiff., zuweilen h.
 Obliterata Hufn., g.
 Heparata Hw.
 Bilineata L., überall g.
 Trifasciata Bkh., h.
 Impluviata Hb.

Corylata Thnb., z. h.
 Ruptata Hb.
 Berberata Schiff., n. s. Friedrichshain.
 Sagittata F., z. s.
 Comitata L., z. h.
 Chenopodiata L.
 Polygrammata Bkh., z. s.
 Aequata Hb., z. s.

 Eupithecia Curt.
 Oblongata Thnb., n. s.
 Centaureata F.
 Subnotata Hb., 1 Ex. in Steglitz.
 Linariata F., n. s.
 Debiliata Hb., n. s.
 Rectangulata L., in Gärten zuw. h.
 Scabiosata Bkh., n. s.
 Piperata Stph.
 Succenturiata L., n. s.
 Subfulvata Hw., n. s.
 ab. Oxydata Tr., n. s.
 Nanata Hb., n. s.
 Innotata Hufn., h.
 Tenuiata Hb., n. h.
 Plumbeolata Hw., h.
 Satyrata Hb., z. h.
 Castigata Hb., h.
 Vulgata Hw., h.
 Austeraria H.-S.
 Minutata Gn., n. s. Jungfernheide.
 Absinthiata Cl., n. h.
 Pimpinellata Hb., z. s. Jungfernheide.
 Indigata Hb., n. s.
 Sobrinata Hb., sparsam.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [23_1879](#)

Autor(en)/Author(s): Pfützner Julius

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge Berlins und der Umgegend 33-47](#)