©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXIII. 1879. Heft I.]

Neue Amur-Käfer

von

H. v. Kiesenwetter in Dresden.

Agrilus peregrinus: *Viridis, mento abdomineque apice integro, vertice convexo, vix sulcato, fronte plana, rugoso punctata sericante, prothorace transverso basin versus angustato, angulis posticis breviter distincte carinatis, lateribus impressis, rugoso punctatis, elytris dense subtiliter granulatis, parce pubescentibus, macula pubis sericeae pone medium, interdum obsoleta subinaequalibus, sutura et basi subdepressis.* — Long. 7 lin.

Variat sutura nigra, prothoracis disco aureo.

Hab. Amur.

Corymbites Christophi: Articulis tarsorum simplicibus, terito parum minore, libero; antennis articulis 3 — 11 *fortiter dentatis; capite prothoraceque fortius dense punctatis, prothorace latidudine dimidio longiore, convexiore fortiter late canaliculato, angulis posticis divaricatis, haud carinatis, subdepressis, elytris prothorace duplo longioribus, brunneis, dense striato-punctatis, interstitiis dense rugoso punctatis, densius pubescentibus.* — Long. 8 mill.

Kopf mäfsig grofs mit gewölbter, im flachen Bogen steil abfallender Stirn. Die Augen mäfsig grofs, gewölbt. Die Fühler ziemlich grofs, mit grofsem leicht erweiterten erstem, sehr kleinem rundlichem zweitem, deutlich 3eckigem, das erste an Länge übertreffendem dritten Gliede. Das 4te Glied kleiner als das 3te, die folgenden wieder etwas kürzer, aber nicht schmaler als das 4te und etwas schärfer zugespitzt, vom 7ten Gliede an wieder länger werdend, das letzte länglich oval. Halsschild beträchtlich länger als breit, mit fast parallelen Seiten, die Hinterecken nach hinten verlängert, etwas verflacht, ohne deutlichen Kiel, leicht auswärts gebogen und etwas flach gedrückt, die Scheibe des Halsschildes mit einer ziemlich breiten Längsfurche, die nicht ganz bis an den Vorderrand des Halsschildes reicht. Flügeldecken ziemlich schmal, mit parallelen Seiten, etwa $1\frac{1}{2}$ mal so lang als zusammen breit, braun, greisbehaart. Beine röthlich braun, Hintercoxen schmal nach innen zu nur wenig erweitert.

Amur.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Malachius (?) *Sibiricus*: *Aeneus, subnitidus, capite pedibusque ex parte testaceis, prothoracis lateribus anguste testaceis, elytrorum apice rufa, simplice.* — Long. 4 mill.

Capite lato, basin versus parum angustato, oculis rotundatis, labro et ore testaceis, antennis basin versus testaceis, fronte leviter excavata. Prothorax subnitidus, latera testacea, basin versus latiora, apice in marginem anteriorem dilatata, pube tenui sericante, tenuiter punctulatus. Elytra minus dense punctulata, apice testaceo maculata, oblongo ovata, convexa. Pedes nigro aenei, ex parte testacei.

Femina, antennis simplicibus, Mas latet. Amur.

Malachius (?) *Christophi: Capite, prothoracis fascia elytrisque testaceis, his apice rufa labro ore, pedibusque anticis testaceis, posticis ex parte testaceo maculatis.* — Long. 4 mill.

Ore labroque testaceis, antennis basin versus testaceis extrorsum infuscatis. Capite vertice fronteque viridibus, hoc leviter convexo. Prothorax latitudine vix longiore lateribus testaceo, media fascia longitudinali aequilato, ad marginem anteriorem et posteriorem pertingente. Elytra obscura, viridia latitudine triplo longiora, apice rufa, leviter verrucosa, pubescentia. Femina antennis et elytrorum apice simplicibus. Mas latet.

Attalus xanthopus. Cyaneus, vel viridi-cyaneus, pube brevissima parca cinerascente elytrorum his subrugosis, apice subrotundata, concolore, capite maris labro flavo, fronte latiore, varie impresso, antennis maris pedibusque anticis pallidis, posticis cyaneis ex parte testaceis.

Mas: *capite subdilatato, antennis basi nigro maculatis, articulo primis nigro maculatis.*

Femina: *capite minore, labro cyaneo pedibus cyaneis, parum testaceo maculatis.* — Long. 3 mill.

Die helle Färbung der Vorderbeine bei dem Männchen ist für diese Art ziemlich auffallend, ebenso die flache etwas erweiterte Stirn mit starken Unebenheiten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 23_1879

Autor(en)/Author(s): Kiesenwetter Ernst August Helmuth [Hellmuth] von

Artikel/Article: Neue Amur-Käfer 145-146