

Elatérides du Tarbagatai.

Corymbites anxius Gebl. Bull. Ac. Petersb. 1843. I. p. 38.

Le *C. coerulescens* Motsch. est le même.

Corymbites depresso Caud. nov. sp.: *Fuscus, parum nitidus, brunneo-pubescentis; antennis brunneis, articulo tertio quarto angustiori et paulo breviori; prothorace latitudini longitudine aequali, basi apiceque aequaliter angustato, lateribus arcuato, crebre punctato, angulis posticis brevibus, divaricatis, extus tenuiter carinatis; elytris depresso*, *punctato-striatis, interstitiis convexis, rugose punctatis; pedibus brunneis.* — Long. 10 mill.

A classer dans le même groupe que le précédent, à la suite des *C. melancholicus*, *laevicollis*, *spretus* etc. Il rappelle, pour l'aspect général, le *Cryptohypnus depresso*, à la taille près.

Corymbites corpulentus Cand. nov. sp.: *Latus, obscure aeneus, nitidus, cinereo-pilosus; antennis moniliformibus, nigris; prothorace transverso, convexo, subinaequali, punctato, angulis posticis divaricatis, valde carinatis; elytris latis, convexis, punctato-striatis, interstutiis planis.* — Long. 8—10 mill.

Il ressemble en petit au *C. latus*, à côté duquel il doit être classé; il se trouve aussi en Daourie. Candèze.

Corymbites (Diacanthus) songoricus n. sp.

Corymb. aeneo similis et affinis, antennis tenuioribus, ater, capite confertim rugoso-punctato, thorace multo densius quam in specie allata punctato, subopaco, elytris vix punctulatis. — Long. 11—12 mill.

var. *elytris coerulecentibus*.

Vom Targabatai; vom *Cor. aeneus* durch die angegebenen Merkmale unterschieden, welche bei meinen fünf Ex. genau übereinstimmen.

Cor. atratus Ball. (Bull. Mosc. 1878. I. Heft 2. p. 293) von Wernoje ist jedenfalls sehr ähnlich, hat aber eine ziemlich dicht und stark punktierte Stirn, fein und dicht punktierte Fld., während die des *songoricus* kaum bemerkbar punktiert ist.

Zu beachten ist, dass der echte *Cor. aeneus* nach v. Solsky (Hor. Ross. VII. [1870] p. 364) und die var. *germanus* L. bei Irkutsk vorkommen, der letztere bis in die südlichen Gegenden des Amurgebietes hinein nicht selten ist.

Cor. nigrita Mannh. (Cand. Mon. IV. p. 140) von Daurien scheint sehr ähnlich, aber kleiner, und gehört in Candèze's sect. V, der *songoricus* in sect. VI (Fühlerglied 3 länger als 4).

G. Kraatz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift
\(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche
Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [23_1879](#)

Autor(en)/Author(s): Candeze Ernest

Artikel/Article: [Elaterides du Tarbagatai. 283](#)