

## Elatérides du Targabatai.

*Corymbites anxius* Gebl. Bull. Ac. Petersb. 1843. I. p. 38.

Le *C. coerulescens* Motsch. est le même.

*Corymbites depressus* Cand. nov. sp.: *Fuscus, parum nitidus, brunneo-pubescentis; antennis brunneis, articulo tertio quarto angustiori et paulo breviori; prothorace latitudini longitudine aequali, basi apiceque aequaliter angustato, lateribus arcuato, crebre punctato, angulis posticis brevibus, divaricatis, extus tenuiter carinatis; elytris depressis, punctato-striatis, interstitiis convexis, rugose punctatis; pedibus brunneis.* — Long. 10 mill.

A classer dans le même groupe que le précédent, à la suite des *C. melancholicus, laevicollis, spretus* etc. Il rappelle, pour l'aspect général, le *Cryptohypnus depressus*, à la taille près.

*Corymbites corpulentus* Cand. nov. sp.: *Latus, obscure aeneus, nitidus, cinereo-pilosus; antennis moniliformibus, nigris; prothorace transverso, convexo, subinaequali, punctato, angulis posticis divaricatis, valde carinatis; elytris latis, convexis, punctato-striatis, interstitiis planis.* — Long. 8—10 mill.

Il ressemble en petit au *C. latus*, à côté duquel il doit être classé; il se trouve aussi en Daourie. Candèze.

*Corymbites (Diacanthus) songoricus* n. sp.

*Corymb. aeneo similis et affinis, antennis tenuioribus, ater, capite confertim rugoso-punctato, thorace multo densius quam in specie allata punctato, subopaco, elytris vix punctulatis.* — Long. 11—12 mill.

var. *elytris coerulescentibus.*

Vom Targabatai; vom *Cor. aeneus* durch die angegebenen Merkmale unterschieden, welche bei meinen fünf Ex. genau übereinstimmen.

*Cor. atratus* Ball. (Bull. Mosc. 1878. I. Heft 2. p. 293) von Wernoje ist jedenfalls sehr ähnlich, hat aber eine ziemlich dicht und stark punktirte Stirn, fein und dicht punktirte Fld., während die des *songoricus* kaum bemerkbar punktiert ist.

Zu beachten ist, daß der echte *Cor. aeneus* nach v. Solsky (Hor. Ross. VII. [1870] p. 364) und die var. *germanus* L. bei Irkutsk vorkommen, der letztere bis in die südlichen Gegenden des Amurgebietes hinein nicht selten ist.

*Cor. nigrita* Mannh. (Cand. Mon. IV. p. 140) von Daurien scheint sehr ähnlich, aber kleiner, und gehört in Candèze's sect. V, der *songoricus* in sect. VI (Fühlerglied 3 länger als 4).

G. Kraatz.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [23\\_1879](#)

Autor(en)/Author(s): Candeze Ernest

Artikel/Article: [Elaterides du Tarbagatai. 283](#)