

### 3. Cassididen von B. Wagener in Kiel.

1. *Aspidomorpha quadrimaculata* Oliv. 4 Stücke.
2. *Asp. madagascarica* Bohem.

var. nova. ramulo elytrorum postico deficiente.

Obgleich das vorliegende einzelne Stück unter einer grösseren Reihe gut ausgefärbter Stücke meiner Sammlung der einzige Vertreter dieser Varietät bleibt, kann ich ihm, da alle Merkmale im Uebrigen übereinstimmen, keine Artrechte einräumen. Der hintere Randast ist übrigens unterseits durch einen schwärzlichen Fleck dicht am Körper, und oben wenigstens rudimentär angedeutet.

3. *Asp. silacea* Bohem. 1 Stück.

4. *Asp. bimaculata* Fabr. 12 Stücke, welche, in der Färbung sehr constant, bemerkenswerthe Abweichungen in den Umrissen, namentlich in der bis zur Zuspitzung gehenden Spitzenabrundung der Flügeldecken zeigen.

5. *Asp. Simonis* n. sp. Siehe Beschreibung am Schlufs.

6. *Asp. quadriramosa* Bohem. 1 Stück.

7. *Asp. bioculata* Wagener (Mittheil. d. Münchener Entomol. Vereins, Jahrg. 1877. p. 63 No. 14.). 1 Stück.

8. *Asp. semiramosa* n. sp. Siehe Beschreibung am Schlufs.

9. *Asp. signatipennis* Bohem. 1 Stück.

10. *Asp. hepatica* Bohem. 1 Stück.

11. *Laccoptera intricata* Klug. 1 Stück.

12. *Coptocycla Kraatzi* n. sp.: *Rotundata, convexa, flavo-testacea, antennis articulo ultimo apice infuscato; prothorace laevi, basi plaga magna semicirculari nigra, postice maculis duabus testaceis ornata; scutello nigro transversim foveolato; elytris pone scutellum compressis, haud gibbosis, punctato-seriatis, sutura usque ad apicem versus introrsum arcuata, ad suturam cum opposita, connexa, nigris.* — Long. 7, lat. 6 mill. 5 Stücke.

Mit *C. aequinoctialis* und *fausta* nahe verwandt, aber leicht dadurch zu unterscheiden, daß die ganze Unterseite constant ungefärbt ist und die helleren Abzeichen der Halsschildmakel sich auf zwei Basalflecke beschränken; auch die Quergrube des Schildchens fehlt den verwandten Arten.

Die vorher erwähnten beiden neuen Arten lassen sich folgendermaßen charakterisiren:

*Aspidomorpha Simonis* n. sp.: *Subovata, modice convexa, dilute testacea, subnitida, antennis articulo ultimo basi infuscato, prothorace semicirculari, laevi; elytris dorso saturatiore, haud gibbosis, seriebus decem regularibus e punctis mediocribus sat crebris brunneis; sutura apice infuscata; corpore testaceo, prosterno, pectore abdomineque mediis nigris.* — Long. 8,75—9,5, lat. 7,25—7,5 mill. 2 Stücke.

Der *A. indistincta* zunächst stehend, jedoch kleiner; die Färbung der Fühler, der Unterseite und die braunen Punktreihen auf dem gelbbraunen Grunde des Rückens kennzeichnen die Art, von der mir beide durch Gröfse unterschiedene Geschlechter vorliegen.

*Aspidomorpha semiramosa* n. sp.: *Rotundata, parum convexa, nitidissima, pallide flava; prothorace semicirculari, laevi; elytris obsolete seriato-punctatis, dorso breviter acute gibbosis, plaga maxima nigra, utrinque pone medium ramulum latum in limbum emittente; scutello lineaque antica suturali, usque in gibbi acumen extensa, flavis.* — Long. 8,5, lat. 7,5 mill.

Eine ausgezeichnete Art, der einzige bekannte Vertreter einer Gruppe, in welcher die Flügeldecken nur einen dunkelgefärbten Randast (hinter der Mitte) haben. Die gelbe Farbe des Schildchens setzt sich in einer Nahtlinie bis auf die Höhe des Buckels fort; Fühler, Unterseite und Beine sind einfarbig gelb. 1 Stück.

---

#### 4. Brenthides nommés par Mr. Power.

1. *Eupsalis gentilis* Thoms. 5 ex. (pas rare).
  2. *Ceocephalus depressus* Lund. 2 ex. (pas rare).
  3.       -       *picipes* Ol. 2 ex. (commun).
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [24\\_1880](#)

Autor(en)/Author(s): Wagener B.

Artikel/Article: [Cassididen 161-162](#)