

Das Vorkommen eines Zopheriden im palaearctischen Gebiet ist von hohem Interesse. Die nächst verwandten *Nosoderma*-Arten kommen an der Westküste Amerikas, in Mexico und Californien vor, und nur eine Art *obcordatum* Kirby findet sich auf der Ostküste im Norden, in Neu-Schottland, eine weitere *echinatum* Guérin in Cuba und *N. furcatum* Kirsch in Bogota. Die californische *N. diabolicum* Lec. hat in mancher Beziehung Aehnlichkeit mit der Amurensen Art.

### Verzeichnifs der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen.

- Falagria sulcata* Pk. — Bl.<sup>1)</sup>.  
 - *fovea* Sharp. — Ch.  
*Silusa minor* Epp. n. sp. — Ch.  
*Aleochara sanguinea* L. — Bl.  
 - *curta* Sahlb. — Ch.  
 - *nitida* Grv. — Bl.  
*Homalota approximans* Epp. n. sp.<sup>2)</sup> — Ch.  
 - *rudiventris* Fauv. i. l. — Ch.  
 - *analís* Grv. — Ch.  
 - *cavifrons* Sharp. — Ch.  
 - *melanaria* Mannh. — Ch.  
 - *pygmaea* Grv. — Ch.  
 - *fungi* Grv. — Bl.  
 - *orphana* Er. — Bl.  
*Dasyglossa prospera* Er. — Ch., Bl.  
*Oxyopoda ferruginea* Er. — Bl.  
*Tachyporus ruficeps* Kr. — Ch., Bl.  
 - *macropterus* Steph. — Ch., Bl.  
 - " " var. *Abner* Sauley — Bl.  
*Conurus pedicularius* Grv. — Ch.  
 - *humeralis* Epp. n. sp. — Ch.  
*Mycetoporus additus* Epp. n. sp. — Bl.

<sup>1)</sup> Bl. = Blagowestschensk. — Ch. = Chabarofka. — Nic. = Nicolajefsk. — PM. = Permskoi-Muleki. — Pr. = Pochrofka. — W. = Wladiwostok.

<sup>2)</sup> Die Beschreibungen der neuen Arten folgen im nächsten Hefte.

- Heterothops nitens* Nordm. — Bl.  
 - *binotata* Grv. — Ch.  
*Quedius fasciculatus* Epp. n. sp. — Nic., Ch.  
*Creophilus* var. *ciliaris* Steph. (*fulvago* Motsch.) — Nic.  
*Lëistotrophus* var. *inauratus* Mannh. — Nic.  
*Ocypus fuscatus* Grv. — Nic.  
*Philonthus aeneus* Rossi — Nic., Ch.  
 - *proximus* Kr. — Ch.  
 - *cephalotes* Grv. — Ch., Nic., P.M.  
 - *sordidus* Grv. — Ch.  
 - *rotundicollis* Mén. — Pr.  
 - *varians* Pk. — Nic.  
 - *albipes* Grv. — Bl.  
 - *micans* Grv. — P.M.  
 - var. *gilvipes* Er. — Bl.  
 - *vernalis* Grv. — Ch.  
*Xantholinus ochraceus* Gyll. — Ch.  
*Leptacinus batychrus* Gyll. — Bl.  
*Cryptobium fracticorne* Pk. — Ch.  
 - *Koltzei* Epp. n. sp. — Ch.  
*Lathrobium* var. *volgense* Hochh. — Ch.  
 - var. *luteipes* Fauv. — P.M.  
*Domene procera* Epp. n. sp. — W.  
*Sunius melanopygus* Epp. n. sp. — Ch.  
*Paederus littoralis* Grv. — P.M., Ch.  
*Stenus humilis* Er. — Bl.  
 - *rugosulus* Fauv. — Ch.  
 - *clavicornis* Scop. — Ch.  
 - *amurensis* Epp. n. sp. — Bl.  
 - *morio* Grv. — Bl.  
 - *crassus* Steph. — Bl.  
 - *tarsalis* Ljungh. — P.M.  
 - *conformis* Epp. n. sp. — Ch.  
*Oxytelus nitidus* Grv. — Bl.  
 - *rugosus* F. — Bl.  
*Oxyporus* var. *angularis* Gebl. — Pr.  
*Pycnoglypta Heydeni* Epp. n. sp. — Ch.

Dr. L. v. Heyden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [29\\_1885](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius  
Dominicus von

Artikel/Article: [Verzeichnifs der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen. 307-308](#)