©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Das Vorkommen eines Zopheriden im palaearctischen Gebiet ist von hohem Interesse. Die nächst verwandten *Nosoderma*-Arten kommen an der Westküste Amerikas, in Mexico und Californien vor, und nur eine Art *obcordatum* Kirby findet sich auf der Ostküste im Norden, in Neu-Schottland, eine weitere *echinatum* Guérin in Cuba und *N. furcatum* Kirsch in Bogota. Die californische *N. diabolicum* Lec. hat in mancher Beziehung Aehnlichkeit mit der Amurenser Art.

Verzeichnifs der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen.

Falagria sulcata Pk. — Bl. [1]).
- *fovea* Sharp. — Ch.

Silusa minor Epp. n. sp. — Ch.

Aleochara sanguinea L. — Bl.
- *curta* Sahlb. — Ch.
- *nitida* Grv. — Bl.

Homalota approximans Epp. n. sp. [2]) — Ch.
- *rudiventris* Fauv. i. l. — Ch.
- *analis* Grv. — Ch.
- *cavifrons* Sharp. — Ch.
- *melanaria* Mannh. — Ch.
- *pygmaea* Grv. — Ch.
- *fungi* Grv. — Bl.
- *orphana* Er. — Bl.

Dasyglossa prospera Er. — Ch., Bl.

Oxypoda ferruginea Er. — Bl.

Tachyporus ruficeps Kr. — Ch., Bl.
- *macropterus* Steph. — Ch., Bl.
- - var. Abner Saulcy — Bl.

Conurus pedicularius Grv. — Ch.
- *humeralis* Epp. n. sp. — Ch.

Mycetoporus additus Epp. n. sp. — Bl.

---

[1]) Bl. = Blagowestschensk. — Ch. = Chabarofka. — Nic. = Nicolajefsk. — PM. = Permskoi-Muleki. — Pr. = Pochrofka. — W. = Wladiwostok.

[2]) Die Beschreibungen der neuen Arten folgen im nächsten Hefte.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Heterothops niteus Nordm. — Bl.
- *binotata* Grv. — Ch.
Quedius fasciculatus Epp. n. sp. — Nic., Ch.
Creophilus var. *ciliaris* Steph. (*fulvago* Motsch.) — Nic.
Lëistotrophus var. *inauratus* Mannh. — Nic.
Ocypus fuscatus Grv. — Nic.
Philonthus aeneus Rossi — Nic., Ch.
- *proximus* Kr. — Ch.
- *cephalotes* Grv. — Ch., Nic., PM.
- *sordidus* Grv. — Ch.
- *rotundicollis* Mén. — Pr.
- *varians* Pk. — Nic.
- *albipes* Grv. — Bl.
- *micans* Grv. — PM.
- var. *gilvipes* Er. — Bl.
- *vernalis* Grv. — Ch.
Xantholinus ochraceus Gyll. — Ch.
Leptacinus batychrus Gyll. — Bl.
Cryptobium fracticorne Pk. — Ch.
- *Koltzei* Epp. n. sp. — Ch.
Lathrobium var. *volgense* Hochh. — Ch.
- var. *luteipes* Fauv. — PM.
Domene procera Epp. n. sp. — W.
Sunius melanopygus Epp. n. sp. — Ch.
Paederus littoralis Grv. — PM., Ch.
Stenus humilis Er. — Bl.
- *rugosulus* Fauv. — Ch.
- *clavicornis* Scop. — Ch.
- *amurensis* Epp. n. sp. — Bl.
- *morio* Grv. — Bl.
- *crassus* Steph. — Bl.
- *tarsalis* Ljungh. — PM.
- *conformis* Epp. n. sp. — Ch.
Oxytelus nitidus Grv. — Bl.
- *rugosus* F. — Bl.
Oxyporus var. *angularis* Gebl. — Pr.
Pycnoglypta Heydeni Epp. n. sp. — Ch.

Dr. L. v. Heyden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 29_1885

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: Verzeichnifs der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen. 307-308