

kein zu großes Gewicht legen, da hierin die beiden einander sehr nahestehenden *Diaprysius*-Arten nicht unerheblich von einander differiren. Bei *D. caudatissimus* Ab. ist der Mesosternalkiel vorn nur äußerst schwach, kaum bemerkbar, in einem sehr kleinen stumpfen Winkel erhoben, während er bei *D. caudatissimus* Ab. unter einem hoch erhobenen, scharfkantigen, stumpfen Winkel steil nach vorn abfällt.

P. S. Ich habe diese Notizen bereits Ende October des vorigen Jahres für die Deutsche Entom. Zeitschr. eingesandt. Unterdessen hat Herr E. Reitter, durch meine mündlichen Mittheilungen veranlaßt, eine neue, auf andere Charaktere basirende Uebersicht der blinden Silphiden-Gattungen gegeben und dieselbe in Wien. Entom. Zeitschr., V. Jahrg., Heft 9 (ausgegeben am 20. Nov. 1886) p. 313—316 veröffentlicht.

Eine neue *Agonolia*-Art.

Herr Oberstlieutenant von Hoffmann aus Fiume sendet uns die Beschreibung einer im Sommer 1886 in einem Pärchen dort gefangenen neuen *Agonolia*-Art:

Agonolia Konowi.

Coerulea, nigrohirsuta; antennarum articulo primo pedibusque testaceis, tarsi nigricantibus; prothorace haud dense punctato areolisque pluribus laevigatis; elytris crebre granulatis, punctisque subtilibus in series, disco evanescentes dispositis. — Long. ♂ 5, ♀ 7 mill.

Blaugrün, schwarz behaart; erstes Fühlerglied und Beine röthlichgelb, Füße schwärzlich. Halsschild nicht sehr dicht punktirt, mit mehreren glatten Stellen; Flügeldecken dicht gekörnt, mit feinen, in der Mitte verschwindenden Punktreihen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [31_1887](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Eine neue Agonolia -Art. 96](#)