

3. *Eumicrus Perrisi* Reitt. ist auch in Schlesien (Breslau und Marienau) gefunden.

4. *Liodes (Anisotoma) subglobosa* Reitt. ist bei Fraustadt von Rottenberg gesammelt. Von Reitter bestimmt.

5. *Hylesinus oleiperda* F. ist in Liegnitz vom Kaufmann Schwarz im Freien gefangen worden.

6. *Hylesinus vittatus* F. kommt nach Herbst, Bd. V, p. 122, auch in Holstein vor.

V. Von Herrn G. de Vries van Doesburgh in Kralingen bei Rotterdam.

1. *Paracymus nigroaeneus* J. Sahlb., bisher nur aus Frankreich und Finnland bekannt, ist von mir bei Gilalhaus in der Nähe von Bentheim (noch in Westfalen) gefangen, ist also auch ein deutscher Käfer. (Ich habe davon 1 Ex. erhalten und mit meinen Stücken, die ich von Herrn Prof. Schuster (jetzt in Wien), jedoch ohne Vaterlandsangabe, erhalten hatte und welche Herr Kuwert nachzuprüfen die Güte hatte, vergleichen können. J. Sch.)

2. *Orinocarabus hortensis* L. ist dort ebenfalls gefangen worden. Ich glaube, es ist dies der westlichste Ort, an dem dieses Thier angetroffen worden ist.

(Westhoff giebt in seinem Verzeichniß der Käfer von Westfalen pag. 10 Folgendes an: „Jenseit der Weser von Burchardt bei Bückeberg in Lippe-Schaumburg gefangen, diesseit der Weser nur sehr vereinzelt, 1 Stück erhielt ich vom Lehrer Schumacher, welcher dasselbe bei Geimer unweit Münster gefangen haben will.“ Nach Schaum (Erichson I, p. 160) „rückt er im Norden westwärts nur bis zur unteren Elbe vor.“ J. Sch.)

VI. Von Herrn Oberlehrer G. Czwalina in Königsberg i. Pr.

1. *Chrysocarabus splendens* F. ist zu streichen. Das einzige bekannte nordische Ex. ist in Livland gefangen. (Seidlitz, Fauna balt. II, p. 9.) Neulich theilte mir Herr Dr. Seidlitz mit, dafs kurze Zeit vorher ein Sarg mit der Leiche eines in den Pyrenäen Verstorbenen, der dort schon eine Weile in der Erde gelegen hatte, in jene Gegend transportirt worden war.

2. *Autocarabus auratus* L. Bei Pr. das ? zu streichen. Seidlitz hat ihn vor Kurzem aus Allenstein zugeschickt bekommen.

3. *Carabus arvensis* Hbst. Hier fehlt die Var. *sylvaticus* Dej. (cf. Seidlitz, Faun. trans., pag. 11). Uebergänge dazu mit

schwach aber deutlich erhöhtem secundärem Zwischenraum fing ich in Osterode (Ostpreußen).

4. *Pelophila borealis* Payk. ist für Preußen zu streichen. Seidlitz hat von Kramer (Gilgenburg) das einzige Stück zur Ansicht erhalten und als — *Pterostichus oblongopunctatus* erkannt.

(Letzner schreibt darüber (Zeitschrift für Entomologie 1885, X. Heft, p. 7) Folgendes: „Das Ausscheiden dieses nordischen Käfers aus der schles. Fauna (er sollte nach der Uebers. der Arb. der schles. Gesellsch. vom J. 1848 bei Polnisch-Wartenberg unter Rinden gefangen worden sein) ist um so mehr gerechtfertigt, da das Thier nicht einmal das Bürgerrecht in der deutschen Fauna hat erlangen können.“ Es liegt demnach wohl kein Grund vor, diese Art noch länger als deutsche zu führen. J. Sch.)

5. *Bembidion nigricorne* Gyll. Für Pr. zu streichen. Die Danziger Stücke in v. Dommer's Sammlung (im Besitz von Helm) sind *lampros* var.

6. *Amara continua* Thoms. fing ich Pfingsten 1888 in mehreren Stücken bei Osterode (Ostpreußen).

7. *Poecilus subcoeruleus* Quens. Für Pr. zu streichen. Die Danziger Stücke von v. Dommer und mir gefangen, sind *subcoeruleus* Schaum (*striatopunctatus* Dft.).

8. *Haliphus multipunctatus* Wehncke ist für Pr. zu streichen; es waren sehr stark punktirte *Heydeni* (Seidlitz vidit).

9. *Haliphus Heydeni* v. *Wehncke* Gerh. Von mir bei Danzig in 1 Ex. gef.

10. *Coelambus Marklini* v. *pallens* Aub., bei Danzig in 1 Ex. von mir gef.

11. *Ilybius similis* Thoms. Von mir in Ost- und Westpr. an 3 Stellen gef.

12. *Rantus exsoletus* Forst. v. *latitans* Sharp. 1 Stück von Schön bei Königsberg gefangen (Seidlitz vidit).

13. *Limnius troglodytes* Gyll. Für Pr. zu streichen und wohl kaum in Deutschland (cf. Seidl., Fauna balt. II, pag. 123).

14. *Borboropora Kraatzi* Fuß, auch in Tirol bei Ala von mir gefangen.

15. *Philonthus dimidiatus* Sahlb. Für Pr. zu streichen (cf. Deutsche Ent. Z. 1885, pag. 252).

16. *Stenus fossulatus* Er. ist auch in Pr.; im Juli 1887 fing ich 2 Stück bei Oliva (Danzig).

17. *Euconus Motschulskyi* ist für Pr. zu streichen (cf. Deutsche Ent. Z. 1885, pag. 253).

18. *Euconus pubicollis* Müll. fing ich bei Oliva im April 1886 in 1 Ex.

19. *Sphaerites glabratus* F. Von mir bei Oliva unter Pilzen und Excrementen, etwa 6 Stück, bei Königsberg im Birkensaft von mir 1 Ex., von Sauter mehrere gef.

20. *Necrophorus vestigator* v. *trimaculatus* Gradl ist von mir auch in Preußen (Osterode) Pfingsten 1888 in 1 Ex. gef.

21. *Epuraea castanea* Dft. ist für Pr. zu streichen. Das Stück ist mir zwar von Reitter so bestimmt worden, aber da die Flgd. hinten deutlich abgerundet, nicht abgestutzt sind, so erklärt es Seidlitz gewiß mit Recht für *laricina* Motsch., die er als Var. von *immunda* Rtrr. als eigene Art auffaßt (Seidlitz, Fauna balt. II, 211) und die nachzutragen ist.

22. *Hypocopus lathridioides* Motsch. ist für Pr. noch nachzutragen. Meine Stücke von Danzig sind mir von Reitter so bestimmt und die Beschreibung des *lathr.* paßt auch allein auf dieses Thier.

23. *Anisoplia segetum* Hbst. ist sicher bei Thorn gef., alle anderen Arten mit den Angaben Pr. sind sehr zweifelhaft.

24. *Throscus Duvali* Bonv. ist für Pr. zu streichen. *Throscus exul* Bonv. wohl kaum in Europa. (cf. Seidlitz, Fauna balt. II, 165.)

25. *Cardiophorus musculus* Er. auch in Pr. bei Pillau mitunter zahlreich. (*C. musculus* wird vielfach von *cinereus* Hbst. nicht unterschieden, ist aber leicht zu erkennen und gewiß über ganz Deutschland verbreitet. Ich besitze auch Stücke aus Mecklenburg [Fürstenberg]. Ueber die schönen Unterschiede vergl. Seidlitz, Fauna balt. II, 185. J. Sch.)

26. *Cantharis livida* v. *scapularis* Redt. auch in Pr., Schwarzort, Kurische Nehrung in mehreren Stücken von mir und zwei Freunden gef.

27. *Charopus madidus* Kies. auch in Krain bei Tolmein, hoch im Gebirge, 2 Stück (♂ u. ♀) von mir im Juli 1870 gef.

28. *Ceutorrhynchus timidus* Weis. im vorigen Jahre in 2 Ex. bei Königsberg gef. Das ? bei Pr. ist also zu streichen.

29. *Ceutorrhynchus angulosus* Boh. Von mir bei Saalfeld in Ostpreußen in 1 Ex. im Juli 1887 gef.

30. *Sphenophorus abbreviatus* F. ist für Pr. sehr zweifelhaft.

31. *Polygraphus punctifrons* Thoms. ist als deutscher Käfer nachzutragen; ich fing 1 Ex. bei Oliva (Danzig).

32. *Lema septentrionis* Weis. auch in Preußen, 1 Ex. im Juli 1887 bei Osterode (Ostpr.).

33. *Psylliodes cupreata* Dft. auch bei Danzig in 1 Ex. von mir gef.

34. *Haltica saliceti* Weise auch in Preußen; ich fing im Mai 1887 bei Osterode 3 Stück.

35. *Aphthona pygmaea* Kutsch. auch bei Oliva auf *Euphorbia esula* mit *A. Czwalinae* Ws. zusammen mehrfach gef.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [32_1888](#)

Autor(en)/Author(s): Vries van Doesburgh G. de

Artikel/Article: [Berichtigungen und Ergänzungen zu Schilsky's Verzeichnis der deutschen Käfer. 326-328](#)