Rhinoncus albicinctus Gyll. Im Frühjahrs-Angeschwemmten des Jakobsdorfer Seees (4), zugleich mit Phytobius leucogaster und canaliculatus, Bagous muticus und Ceuthorhynchus viduatus.

Ceuthorhynchus obsoletus Gyll. 1 Stück auf den Pantner Höhen. (6.)

Tropideres sepicola Hbst. An einer Eichenklafter. Vorderhaide. (6.)

T. niveirostris F. Lindenbusch (Kolbe).

Mylabris affinis Fröhl. L., s. s.

Hylesinus crenatus F. Unter morscher Eschenrinde. Wasserwald, s.s. (6.)

H. oleiperda F. Das erste schles. Stück. L. (C. Schwarz). Die Nährpflanze konnte nicht ermittelt werden.

Phloeophthorus spartii Nördl. Vorderhaide, s. s. (6.)

Crypturgus cinereus Hbst. Unter Kiefernrinde in den höher gelegenen Partieen der Hefsberge, s. (10.)

Tomicus chalcographus L. Ebendas. (10.)

Cryptocephalus populi Sffr. Von Pappeltrieben. Polkwitz Kr. Glogau (Kolbe).

Chrysomela purpurascens Germ. Unter Laub. Burgberg b. Lähn, s. s. (7.)

Phyllodecta laticollis Suffr. Auf Zitterpappeln im Fasanenbusch b. Brechelshof, n. s.

Batophila rubi Payk. Am Burgberge b. Lähn 1 Stück. (7.)

## Synonymische Bemerkung.

Nach freundlicher brieflicher Mittheilung von Herrn Dr. E. Bergroth ist der bereits mehrfach angewendete Name Westwoodia (von Brullé 1846, von Bates 1857, von Desvoidy 1863, von mir (p. 176 dieses Bandes) mit Unrecht mit Signoretia vertauscht worden, da Stål bereits 1860 eine Hemipteren-Gattung dieses Namens aufgestellt hat; ich schlage somit nunmehr den Namen Atopocerus für die Laporte'sche Goliathiden-Gattung vor, für Westwoodia Signoret dagegen Bergrothia. Dr. G. Kraatz.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)</u>

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: <u>32\_1888</u>

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: Synonymische Bemerkung. 360