

Zeitschriftschau.

Journal of Entomology. No. 5. Mai 1862.

Characters of undescribed Species of Homoptera in the collection of F. P. Pascoe by F. Walker S. 303—318. — Wir dürfen hoffen, daß den Walker'schen Publikationen durch die vernichtende Kritik ein Ende gemacht ist, die Dr. Stål im 6ten bereits gedruckten aber noch nicht ausgegebenen Hefte des Journal über Walker's Leistungen auf dem Gebiete der Hemipteren geschrieben hat, wenigstens insofern, als Journale, die auf einen wissenschaftlichen Inhalt Werth legen, ähnliche Arbeiten des Verfassers nicht mehr drucken und wissenschaftliche Entomologen von denselben keine Notiz nehmen werden.

Notices of new or little known Genera and Species by F. P. Pascoe S. 319—370. — Es sind hier etwa 75 neue Arten beschrieben und 22 neue Gattungen aufgestellt, die den Familien der *Trogositidae*, *Cucujidae*, *Dasytidae*, *Lampyridae*, *Tenebrionidae*, *Helopidae* und besonders den *Anthribiden* (8 Spec., 2 n. Gen.) und *Cerambycinen* (50 A., 13 n. Gen.) angehören und einen kostbaren Theil der unermesslichen entomologischen Schätze bilden, welche in den letzten Jahren besonders aus dem indischen Archipel, Cambodia, Neuholland, vom N'Gami-See und von Para England zugeflossen sind. Die Charaktere der Arten sind mit Sorgfalt festgestellt, die einschlagende Literatur vollständig berücksichtigt und 18 Arten auf 2 Tafeln abgebildet.

Notes on *Tarphii* with the description of an allied genus by V. Wollaston 371—388. — Es sind hier zwei ostindische Arten einer mit *Tarphius* nahe verwandten Gattung *Tarphiodes Bowringii* und *T. indicus*, die unter sich noch einige Abweichungen zeigen, so daß W. mit der zweiten ein besonderes Subgenus *Tarphiosoma* bildet, ferner neun neue Arten von *Tarphius*, die der Verf. auf den canarischen Inseln entdeckt hat, und der sicilische *T. gibbulus* Germ. beschrieben und auf 2 Tafeln abgebildet. Madera und die canarischen Inseln sind par excellence das Vaterland der *Tarphien*, indem jetzt schon 28 Arten der Gattung in beiden Inselgruppen entdeckt sind, während außerhalb dieser Zone bisher nur 1 Art (*T. gibbulus* in Sicilien) aufgefunden worden ist. Der Verf. fand die Thiere stets in der Bergregion der Inseln unter Holzstücken und abgefallenen Blättern des Lorbeerbanmes.

F. P. Pascoe S. 388 ff. — Notes on *Brenthidae*. 7 neue Gattungen und 11 Arten.

Transactions of the Entomological Society. III. Ser. Vol. I.
P. II. und III.

- Waterhouse: Descr. of the British Species of the Genus *Euplectus*.
By G. R. 8 Arten, keine neu. ¹⁾
- F. Smith: Descr. of New Species of Australian Hymenoptera and of a
Spec. of Formica from New-Zeeland. S. 53 flg.
- Verloren and Westwood: On the comparative Influence of Periodicity
and Temperature upon the Development of Insects. S. 63 flg.
- F. Walker: Characters of undescribed Lepidoptera in the Collection of
W. Saunders. S. 70 flg.
- Waterhouse: Notes on the Species of *Triplax*. S. 129 flg.
- Waterhouse: Descriptions of *Scymnus discoideus* an two allied spec.
and descr. of a new Species of *Bryaxis* (*Br. simplex* ²⁾). S. 132.
- Wollaston: On the Euphorbia infesting Coleoptera of the Canary Is-
lands. S. 136 flg.
- Wollaston: On the *Ptinidae* of the Canary Islands. S. 190 flg.
- Desvignes: Descriptions of new sp. of the genus *Bassus*. 11 n. brit-
tische Arten.
- Stainton: Synonymy of *Laverna Langiella*.
- Desvignes: *Ephialtes facialis* und *albicinctus* neue britt. A.
- Waterhouse: Note on *Strongulorhinus ochraceus* Schh. and descr. of
two new allied Sp. of *Curculionidae* from Australia (*Atelicus* nov. gen.
e tribu *Erihonorum inaequalis* und *ferrugineus*).
- M. Lachlan's: Descriptions of British Species of the genus *Stenophylax*
Kolen. (9 A., von denen keine neu.)
- Waterhouse: Descriptions of British Species of *Gyrophaena* (10 Sp.,
keine neu).
- Walker: Char. of undescribed Lepidoptera in the collection of A. Fry.
- Walker: Char. of undescr. Lepid. in the coll. of W. Saunders.
- Trimen: New Species of South African Lepidoptera 13 A. aus den Gat-
tungen *Ypthima*, *Lycaena*, *Zeritis*, *Ismene*, *Pyrgus*, *Nisoniades*, *Pam-
phila*.
- Stainton: Characters of nine exotic species of *Graciliana* (auf Taf. X.
abgebildet).
- M. Lachlan: Char. of new species of exotic *Trichoptera* also of a new
British Species (die letztere ist *Rhyacophila munda*).
- Walker: Descr. of a new genus and species of *Noctuities*.

¹⁾ *E. Denni* No. 2. ist = *nigricans* Chaud., den ich bisher für
Varietät von *sanguineus* Aub. gehalten hatte, *E. Kirby* No. 3. ist der
echte *nanus* Reichb., Aub., Er. (*Reichenbachii* Denny), *E. nanus* No. 4.
ist nicht der echte *nanus*, sondern der *sanguineus* Denny, Aub., *E.*
Kunzei No. 1. schwerlich mit *Kunzei* Aub. identisch. H. S.

²⁾ Ich halte diese Art für *B. haemoptera* Aub. H. S.

Bulletin des naturalistes de Moscou 1861. No. 4.

Chaudoir: Révision des espèces qui rentrent dans l'ancien genre *Panagaeus*. Der Verfasser giebt hier einen Katalog der in seiner Sammlung befindlichen Arten mit Bemerkungen über die weniger bekannten und Beschreibungen der neuen; anhangsweise sind auch die beschriebenen, dem Verfasser fehlenden Arten verzeichnet. Die Gattung *Epicosmus* Chaud. = *Craspedophorus* Hope ist in der Sammlung des Verfs. durch 41 Arten vertreten, ausserdem werden 19 dem Verfasser fehlende verzeichnet. Im Einzelnen bemerke ich, dass *Isotarsus amplicollis* Schaum vom Verfasser irrig als Synonym des *E. pretiosus* Chaud. aufgeführt ist, es ist eine ganz abweichende, dem *brevicollis* Dej. in der Bildung des Halsschildes zunächst stehende Art. Das Vorkommen des *I. marginicollis* Schaum (*notulatus* Dej.) in Südafrika wird mit Unrecht beanstandet (p. 347), der Käfer ist am Cap von Bergius, bei Port Natal von Drege in Mehrzahl gefangen. *Pan. chalconcephalus* Wied. und *P. chlorocephalus* Koll., die als unbekannte Arten in der Gattung *Epicosmus* verzeichnet werden, gehören ihres metallisch-glänzenden Kopfes wegen wahrscheinlich gar nicht zu den *Panagaeen*, sind auch den Beschreibungen nach zu schliessen kaum von einander verschieden. Die Ersetzung der Gattung, namen *Craspedophorus* Hope durch den jüngern *Epicosmus* Chaud., würde ich, da Hope allerdings keine Charaktere für seine Gattung angegeben, für gerechtfertigt erachten, wenn nicht der Hope'sche Name bereits durch Lacordaire und Murray eingebürgert worden wäre. — *Panagaeus* mit 7 Arten; hier ist *P. mexicanus* Putz. mit Unrecht als Synonym zu *crucigerus* Say gestellt, er ist durch die Bildung des Halsschildes ganz verschieden und könnte eher mit *panamensis* Laf. zusammenfallen. Auch das Citat des *P. quadrisignatus* Chev. bei *crucigerus* Say wird dadurch höchst zweifelhaft, dass Chevrolat den *crucigerus* gekannt und mit dem Namen *lapidarius* belegt hatte. — *Peronomerus* 2 Arten, das Vaterland der 2 Arten *P. aeratus* Chand. (Deccan) ist höchst wahrscheinlich irrig, und der Käfer nichts Anderes als der chinesische *P. fumatus* Schaum. — *Euschizomerus* 3 Arten. — *Coptia* 1 Art.

In einem Anhang wird *Therates cyaneus* n. A. von Mysol ¹⁾ und *Tricondyla gibba* aus Cambodia beschrieben, die letztere steht der *annulicornis* Schmidt-Goebel sehr nahe. Schaum.

¹⁾ Der Name der sub No. 3. Berl. Entom. Zeitschr. 1860 p. 183 in meiner Liste aufgeführten Art von *Therates* hat *coeruleus* statt *cyaneus* zu heissen.