

Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen.

Von Adolf Strähler in Jauer, Schlesien.

(Forts. von S. 89 der Nr. 5 u. 6 d. vor. Jahrgangs.)

Andromeda polifolia L. sehr zahlreich an den erwähnten Standorten des *Vacc. Oxycoccos* L.

LX. Fam. Ericaceen Klotzsch.

Calluna vulgaris Salisb. Revier Theerkeute und in den übrigen Revieren so zahlreich, dass Bienenstöcke aus der Ferne eingemietet werden können.

Erica Tetralix L. Moorblotte zu Theerkeute, ein mächtiger Rasen; einziger Standort.

LXI. Fam. Rhodoraceen Klotzsch.

Ledum palustre L. Klempitzer Bruch, Panskalonka Revier Hamrzysko, zerstreut.

LXII. Fam. Hypopityaceen Klotzsch.

Pirola chlorantha Sw. Waldbestände bei Theerkeute und Hamrzysko, zerstreut.

P. rotundifolia L. Springewiesen bei Hamrzysko, stellenweise.

P. minor L. ebendasselbst, stellenweise.

P. uniflora L. ebendasselbst, selten.

P. secunda L. bei Theerkeute zerstreut.

Chimophila umbellata Nutt. daselbst, desgleichen.

Monotropa Hypopitys L. Revier Hamrzysko, vereinzelt.

LXIII. Fam. Aquifoliaceen DC.

Vacat.

LXIV. Fam. Oleaceen Lindl.

Ligustrum vulgare L. in Gärten angepflanzt.

Syringa vulgaris L. desgleichen, verbreitet.

Fraxinus excelsior L. in den Revieren Klempitz und Kruczwald angebaut; zerstreut.

LXV. Fam. Asclepiadaceen R. Br.

Vincetoxicum officinale Mnch. in den genannten Revieren vereinzelt vorkommend.

LXVI. Fam. Apocynaceen R. Br.

Vinca minor L. auf alten Kirchhöfen bei Ciskowo, wohl nur angepflanzt.

LXVII. Fam. Gentianaceen Fuss.

Menyanthes trifoliata L. auf den Netzewiesen bei Ciskowo, zerstreut.

Gentiana Amarella Willd. mit blassvioletten und gelblich weissen Blüten am Ciskowoer Haidchen nahe der Bsowoer Grenze, selten.

Erythraea Centaurium Pers. an Grasrainen bei Ciskowo, verbreitet.

LXVIII. Fam. Polemoniaceen Lindl.

Vacat.

LXIX. Fam. Convolvulaceen Fuss.

Convolvulus sepium L. an den Ufern der alten Netze, stellenweise.

C. arvensis L. Wegränder bei Krucz, gemein.

Cuscuta europaea L. auf *Artemisia* bei Gorai, zerstreut.

C. Epithymum L. auf *Solidago*, desgleichen.

LXX. Fam. Borraginaceen Desv.

Asperugo procumbens L. Kruczer Park, ziemlich selten.

Lappula Myosotis Mnh. dürre Hügel bei Ciskowo, zerstreut.

Cynoglossum officinale L. Wegränder bei Ciskowo, zerstreut.

Borrigo officinalis L. in Gärten angepflanzt.

Anchusa officinalis L. Wegränder bei Ciskowo, zerstreut.

A. arvensis M. B. Aecker daselbst, häufig.

Symphytum officinale L. Wiesen daselbst, verbreitet.

Echium vulgare L. Brachfelder daselbst, häufig.

Pulmonaria officinalis L. Goraier Berge, zerstreut.

P. angustifolia L. Lubaster Forst an der Klempitzer Reviergrenze, selten.

Lithospermum officinale L.)
L. arvense L.) auf Feldern bei Ciskowo, zerstreut.

Myosotis palustris Rth. Wiesen bei Theerkeute, häufig.

M. caespitosa Schultz daselbst, desgleichen.

M. stricta Lk., Brachen bei Ciskowo, desgleichen.

M. versicolor Sm. daselbst, zerstreut.

- M. silvatica* Hoffm. Goraier Berge, desgleichen.
M. hispida Schldl. pat. Felder bei Theerkeute, häufig.
M. intermedia Lk. ebendasselbst, desgleichen.

LXXI. Fam. Solanaceen Juss.

- Solanum nigrum* L. Gartenunkraut bei Theerkeute, nicht selten.
S. Dulcamara L. Ufergebüsch an der alten Netze bei Ciskowo, nicht selten.
Hyoscyamus niger L. Ruderalpflanze bei Theerkeute, gemein.
Nicotiana Tabacum L.)
N. rustica L.) angebaut in Gärten von Bielawe.
Datura Stramonium L. Dorfaue in Hamrisko, Theerkeute, zerstreut.

LXXII. Fam. Scrophulariaceen R. Br.

- Verbascum Thapsus* L. an den Ufern des Krucz haulaender See's, zerstreut.
V. thapsiforme Schrad. ebendasselbst, zerstreut.
V. phlomoides L. Kulturflächen des Reviers Hamrisko, zerstreut.
Verbascum thapsiformi-Lychnitis Schiede an den Ufern der Scholzenwiesen am Bialaer See; selten, in zwei Exemplaren.
V. thapsiformi-nigrum Schiede bei Krucz mit den Eltern, selten, ein Exemplar.
V. Lychnitis L. bei Ciskowo verbreitet.
V. nigrum L. ebendasselbst.
V. nigro-Lychnitis Schiede, im Ciskowoer Pächtergarten unter den Eltern, selten; 1 Exemplar.
Scrophularia nodosa L.)
Sc. Ehrharti Stevens) Goraier Berge, zerstreut.
Linaria vulgaris Mill. Wegränder bei Gorai, gemein.
Limosella aquatica L. Ueberschwemmte Stellen auf den Netze-Wiesen, zerstreut.
Veronica scutellata L. Gräbenränder bei Theerkeute, zerstreut.
V. Anagallis L. ebendasselbst, desgleichen.
V. Beccabunga L. ebendasselbst, desgleichen.
V. Chamaedrys L. ebendasselbst, häufig.
V. officinalis L. Revier Theerkeute, zerstreut.
V. latifolia L. Goraier Berge, zerstreut.
V. longifolia L. mit forma *maritima* L. auf den Torfwiesen des Netze-Bruches, zerstreut.

V. spicata L. Haidchen bei Ciskowo und Goraier Berge, meist nicht selten.

V. serpyllifolia L.

V. arvensis L.

V. verna L.

V. triphyllus L.

V. agrestis L.

V. hederifolia L.

Brachen und Aecker bei Krucz und Ciskowo, meist häufig.

Melampyrum nemorosum L. Goraier Berge, zerstreut.

M. pratense L. ebendasselbst und Revier Klempitz, stellenweise.

Pedicularis silvatica L. Moorblotte bei Theerkeute, ziemlich selten.

P. palustris L. Scholzenwiesen des Bialaer See's; ziemlich selten.

Alectorolophus minor W. et Grab. Goraier Wiesen, gemein.

A. major Rchb. ebendasselbst, zerstreut.

Euphrasia pratensis Fr. mit grösseren und kleineren Blumenkronen und ebenso verschiedenen Blättern auf Gestellen der Reviere Klempitz und Hamrzysko, zerstreut.

E. nemorosa Pers. mit durchweg blassblauen Blumenkronen in den Goraier Bergen; ziemlich selten.

E. Odontites L. feuchte Aecker bei Gorai, häufig.

Lathraea Squamaria L. Revier Kruczwald auf *Alnus* schmarotzend, zerstreut.

Orobanche rubens Wallr. Ciskowoer Felder auf einer Stelle auf *Medicago sativa* schmarotzend, selten.

O. elatior Sutt. auf *Centaurea Scabiosa* in ziemlicher Anzahl schmarotzend im Revier Gorai gegen die Guhrener Grenze; einziger Standort.

LXXIII. Fam. Labiaten Juss.

Mentha aquatica L. Gräben und feuchte Wiesenstellen in den Springen bei Hamrzysko mit var. *hirsuta* L. zerstreut.

M. gentilis L. Försterei Theerkeute, in letzter Zeit verschwunden.

M. arvensis L. Felder daselbst, gemein.

M. piperita L.) zum Arzeneigebrauch in Gärten hin und wie-

M. crispa L.) der gezogen.

M. Pulegium L. Ufer des Kruczhaulaender See's, zerstreut.

Lycopus europaeus L. Theerkeute, Unland, gemein.

Salvia officinalis L. daselbst in Gärten.

S. pratensis L. Blau- und weissblühend bei Ciskowo und in den Goraier Bergen, zerstreut.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Straehler Adolf

Artikel/Article: [Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen 42-45](#)