

Das „Herbarium Salisburgense“ des salzburgischen Landesmuseums.

(Ein Beitrag zur Flora des Herzogtums Salzburg.)

Von L. Glaab in Salzburg.

(Forts. v. S. 95 d. Jahrg.)

II.

Arten und Varietäten, deren Vorkommen in der salzburgischen Landesflora noch nicht veröffentlicht wurde.

Atragene alpina L. flor. albo, auf einem Felsenblocke hinter dem Tauernwirthshause zu Fehrleiten in der Fusch 1890. St.

Thalictrum flexuosum Rchb., Lungau. H.

» *flavum* L. v. *variisectum* Neilrch., Salzachauen. Sch.

» » var. *latisectum* Neilrch., bei Glanegg. St. 1829.

Ranunculus hederaceus L., Leopoldskroneteich. St.

» *montanus* Willd. flor. croceis, von Aberle am 14. August 1832 am Gamskogel in Gastein gesammelt u. St. benannt.

» *flammula* L. var. *fol. serratis* D. C. Von Storch auf Sumpfwiesen bei Viehausen gesammelt.

» *cassubicus* L. Auf Waldwiesen am Fusse des Gaisberges. H.

Aconitum Stoerkianum Rchb. var. *versicolor* Rb. Rositte am Fusse des Untersberges culta. St.

» *Napellus* L. var. *callibotryon* Rb. Untersberg, St. u. H.

Draba aizoides L. var. *montana* Koch. Untersberg, St.

Thlaspi praecox Wlf., bei Ramingstein im Lungau. M.

Helianthemum vulgare Gärtner. var. *tomentosum* Koch, auf Heiden und trockenen Wiesen. H.

Alsine Villarsii Mert. u. Koch, var. *villosula* Koch, im Schwarzleograbener steinigem Gebüsch im Leogangthale unweit Saalfelden im Pinzgau. M.

Elatine Alsinastrum L., Sümpfe von Lambach im Pinzgau. H.

Lathyrus Cicer L. Culta, als salzburgische Kulturpflanze nur von vorübergehender Bedeutung und hier nur erwähnt.

Potentilla intermedia L. Auf dem Burgfelsen in Mattsee. H.

Rubus thyrsoides Wim. Gaisberg, Wim.

Sedum boloniense Lois. Adnet bei Hallein. Stl.

Saxifraga muscoides Wulf, var. *uniflora* Milichhofer. Ex. herb. Milichhofer, ohne genauere Standortsangabe als Salzburg.

Knautia dipsacifolia Host. Aigen. Stl.

Senecio Doria L. Auf Wiesen im Zillerthale H.

Petasites officinalis Mnch. var. *intermedia* Hoppe. Glanegg, H. Junge und alte Blätter, rückwärts fast kahl.

Serratula tinctoria L. flor. albo, auf einer feuchten Wiese an der Strasse bei Grossgmain. Stl.

Inula salicina L. var. *latifolia* D. C. Aigner-Fager. Stl.

Glechoma hederacea L. var. *villosa* Koch. In Wäldern und an Zäunen.

Thymus ovatus Mill., Aigen, Stl.

» » Mill. var. *subcitratus* Schreb. Ursteinalp bei Salzburg. Stl.

Primula glutinosa Wulf. flor. albo. Auf Alpen im Lungau.

Plantago lanceolata L. var. *pumila* Neilrch. Auf Wiesen und Rainen. Viehberg.

Polygonum Persicaria L. var. *densiflorum* Neilrch. An Wassergräben, in Dörfern, auf wüsten Plätzen, gemein und meist gesellig, St.

Salix purpurea L. var. *sericea* Koch. Auen um Salzburg. H.

- Salix rosmarinifolia* L. Salzachauen, H.
Juncus Jacquini L. var. *pumilus* Miel. Gamskogel, St.
Cyperus longus L. Leopoldskronmoos. St.
Carex gracilis Schk. Ehrh. Knappensteig am Ganglbühl auf dem Radhausberg.
 Schattbachalpe in Grossarl. St.
Phalaris arundinacea L. v. *picta*. In Bauerngärten und auf Gartenauswürfen
 hie und da verwildert. G.
Aira caespitosa L. v. *flavescens* Storch. Gruberhorn in der Rauris, Eigenalpe in
 Grossarl, bis 6000 Fuss. Storch schreibt auf dem Zettel: *Aira flavescens*,
 ohne einen Autor anzugeben. Eine *Aira flavescens* kann ich aber in der
 mir zur Verfügung stehenden Litteratur nicht finden. Nach genauer
 Untersuchung gehört die vorliegende Pflanze zu *Aira caespitosa* L., von
 welcher sie sich durch die prächtig goldgelb gefärbten Aehrchen unterscheidet,
 weshalb ich sie als Varietät zu dieser stelle.
 » *flexuosa* L. var. *montana* L. Weinachalpe in Grossarl. St.
 » *caespitosa* L. var. *vivipara* Saut. Mattsee, St.
Poa laxa Haenke var. *pallescens* Koch. Radhausberg, sehr selten. St.
 » *alpina* L. var. *depressa* Mielichh. Radhausberg, Kolbenseygurn.
 » *laxa* Haenke var. *vivipara* Mielichh. Bei der alten Bergschmiede am
 Neubau des Goldberges in Rauris, Sept. 1815, sehr selten. M.
Festuca varia Haenke var. *crassifolia* Koch. Am Zettel steht „Syn. *F. Eския*
Ramond, *bicolor* Gaud., *caespitosa* Mielichh., *versicolor* Tausch.“
 Ackerkogel in der Tofern. St.
 » *rubra* L. var. *subspicata* Mielichh. Untersberg.
 » » L. v. *tenella* Mielichh. Untersberg.
 » *ovina* L. var. *violacea* Gaud. Hochalpenwiesen der Tofern. St.
Bromus mollis L. v. *nanus* Weig. Um Salzburg.
Lolium temulentum L. v. *speciosum* Ster. Aigen, Stl.

III.

Unveröffentlichte Pflanzenstandorte.

- Thalictrum angustifolium* Jcq. Glanwiesen und Josefau. Sz., Sch., St. Jacob, Stl.
 » *silvaticum* Koch. Mühlbach im ob. Pinzgau und im Bökksteinthale. St.
 » *aquilegifolium* L. St. Johann im Pongau, Leesach im Lungau, Tännengebirge,
 Werfen. St.
 » *minus* L. Untersberg. Hp.
 » *Jacquinianum* Koch. Bökkstein, Mühlbach. M.
 » *flavum* L. Feuchte Wiesen bei Anthering an der Salzach, an der Oichten bei
 Steinbach, bei Fischach, bei Bergheim, Mooswiesen bei Glanegg, Salzachauen. St.
Anemone alpina L. var. *sulfurea* L. Untersberg, Preber im Lungau. A.
 » *alpina* L. Preber im Lungau, Grubkar im Kaprunnerthale. St.
 » *vernalis* L. Schattbachalpe, Hubalpe, Bacheralpe, Finsterwaldmäher, Mandelmahd,
 Tofern, im Grossarlerthale, Knappenleiten auf dem Hirzbachberge in der Fusch,
 Bundschuhthal, auch auf anderen nordwestlich von Maukerndorf gelegenen
 Urkalkhügeln zahlreich, am kleinen Rettenstein bei Kitzbüchl, Gerloswand. St.
Ranunculus Philonotis Ehrh. Sehr zahlreich bei St. Johann, Taxenbach. St.
 Zell am See, A. Hallein, Stl.
 » *nemorosus* D. C. Glösenberg bei St. Johann. St.
 » *sceleratus* L. Bei Altenmarkt im Lungau. St.
 » *polyanthemus* L. Aigen, Stl.
 » » L. var. *angustisectus* Neilrch., bei Bökkstein. St.

- Ranunculus glacialis** L. Preberspitze. A.
- » **hybridus** Biv. Hohlwege bei Saalfelden. St.
 - » **reptans** L. Troineberg bei St. Johann.
 - » **Flammula** L. An Gräben, nassen Wiesen im Nonnthal, Schleinlacke. St.
 - » **aconitifolius** L. var. **platanifolius** L. Untersberg 1835, A. Stiegelbaueralpe in Schellgaden Lungau, Radhausberg in Gastein, St. Nach Funk auf dem Radstädtertauern angegeben in Flora 1832.
 - » **aconitifolius** L. Wagrein in Kleinarl, St. Guggenthal bei Salzburg und Radhausberg in Gastein, Sch.
 - » **lanuginosus** L. Tweng im Lungau. Stl.
 - » **aquatilis** L. v. **peltatus** D. C. Leopoldskronteich, Zell am See in Wassergräben. St.
 - » **paucistamineus** Tausch. Ofenlochteich bei Salzburg, H. In Gräben bei St. Josef bei Salzburg, A. In Wiesengräben bei Glanegg, St.
 - » **divaricatus** Schrank. In Bächen b. Mauterndorf, H. Im Seegraben b. Zell am See, in Wiesengräben b. Hollersbach, bei Elixhausen, St. Glanegg, Stl.
 - » **fluitans** Lam. bei Elixhausen, selten. St.
- Helleborus odorus** Waldst. u. Kit. Im Walde bei Morzg, St. Auch von Hoppe in Flora 1832 Bd. 2 pag. 673 bei Hellbrunn an buschigen Anhöhen angegeben.
- » **niger** L. in Kleinarl, St.
- Aquilegia atrata** Koch. Gaisberg, H. Aigen, Stl.
- » **vulgaris** L. Glanwiesen, A.
- Aconitum Lycoctonum** L. v. **Vulparia** Rb. Radhausberg. St.
- » » **L. v. Telyphonum** Rb. bei Glanegg am Fusse des Untersberges, St. Preber im Lungau, H.
 - » **paniculatum** Lam. An schattigen Ufern des Gangbachthales bei Schellgaden im Lungau, St. Josefsau, Stl.
 - » **variegatum** L. var. **nasutum** Fisch. Untersberg, H.
 - » » **var. macranthum** Rb. Schellgaden im Lungau. St.
 - » » **var. rostratum** Bernh. Hubalpe in Grossarl, St. Ein hier liegendes, von Storch am Untersberg gesammeltes Exemplar besitzt Blüten, bei denen die Haube nach abwärts gerichtet, hängend, 0,045 m lang, 0,012 m breit und walzlich ist. Ich vermute, dass die Umdrehung der Blütenstiele durch die hängende Lage des Blütenastes entstanden ist, sonst würde ich diese Form *aversiflorus* nennen.
 - » » **var. Judenburgense** Clus. Untersberg, St.
 - » » **L. Leopoldskronmoos**. St.
- » **Napellus** L. var. **Funkianum** Rb. Gasteiner Alpen, St.
- » » **var. formosum** Rb. Untersberg, Stl.
 - » » **var. strictum** Bernh. Radstädtertauern, H.
 - » » **var. Kœlleianum** Rb. Bergneralpe in der Tofern, Grossarl, Untersberg, St.
 - » » **var. Hoppeanum** Rb. Eigenalpe und Tofern in Grossarl, St.
- Actæa spicata** L. Zederberg bei St. Johann, St. Neuhauserberg, Sch.
- Berberis vulgaris** L. Auch um St. Johann im Pongau. St.
- Nymphæa alba** L. v. **minor** D. C. Egelsee bei Salzburg, Stl.
- Nuphar pumilum** Smth. Am Seewaldsee am Tratberg, St.
- » **luteum** Smith. Goldeggersee, St. Egelsee, Stl.
- Papaver Rhœas** L. St. Johann im Getreide, St.
- » **alpinum** L. var. **flaviflorum** Koch. Auf Chloritschiefer am Fallkopf im Lungau, St.
 - » » **var. albiflorum** Koch. Nebelsberg bei Lofer.

- Fumaria officinalis* L. In Gemüsegärten als Unkraut in der Umgebung von St. Johann gemein. St.
- Nasturtium silvestre* R. Brown. An der Moorstrasse u. bei Glanegg, St. Aigen, Stl.
» *palustre* D. C. Aigen, Stl.
- Turritis glabra* L. Ofenlochberg, St. Aigen, Stl.
- Arabis intermedia* Hppe. an einem Felsen des Calvarienberges bei Zell am See (Originalexemplar).
» *cærulea* Haenke. Erzwies, Kolben, St.
» *bellidifolia* Jcq., Tofern, Hüttschlag, Veitlbruch am Untersberg, Hirzbachberg in der Fusch.
» *ciliata* R. Br. Untersberg, Stl.
» *hirsuta* Scop. Ofenlochberg nächst Salzburg, St. Aigen, Stl.
» *sagittata* D. C. Haunsberg, und bei Neumarkt von Pfarrer Michl 1838 gesammelt.
» *alpina* L. Radhausberg, Preber, Heiligenblut. A.
- Cardamine trifolia* L. Abtenau in Wäldern. St.
» *pratensis* L. var. *dentata* Koch. Preber, A. Leopoldskronmoos, St.
» *silvatica* Link. Im Laubwalde bei Radegg, St.
» *impatiens* L. Unter Gebüsch bei Plankenau bei St. Johann, auch bei Thalgau. St.
» *hirsuta* L. Aigen, Stl.
» *resedifolia* L. An feuchten Felsen des Radhausberges, St. Preberspitze im Lungau, Nassfeld, A. Tofern in Grossarl, Fuscheralpen, H.
» *alpina* Wild. Gamskogel im Gasteinerthale.
- Dentaria bulbifera* L. Schlossberg von Glanegg, St. Aigen, Stl.
» *enneaphyllos* L. Kapuzinerberg, Untersberg, Kuhberg, in Laubwäldern. A., St.
- Sisymbrium Thalianum* Gaud. Auf Äckern bei St. Johann, St. Schallmoos, Stl.
- Cochlearia Armoracia* L. Aigen verwildert, Stl.
- Erysimum cheiranthus* Pers. Am Kalkfelsen der Ruine Klammstein im Gasteinerthale, Böckstein, St.
» *cheiranthoides* L. Leopoldskron, Stl.
- Alyssum calycinum* L. Am Fusse des Ofenlochberges bei Sinnhub nächst Salzburg, St.
- Petrocallis pyrenaica* R. Brown. Loferersteinberg, Sp.
- Draba vernalis* L. Ofenlochberg, A.
» *Johannis* Host. Gaisstein bei Kitzbüchl, T. Mitterkar in der Fusch, St. am Hirzbachberge, Weichselkar, Zwing und am Gamskogel. St.
» *Wahlenbergii* Hartm. var. *homotricha* Koch. In der Zwing, Gamsgrube, H.
» » Hartm. Zwing, Schiefergebirge bei Kitzbüchl. T.
» *pumila* Miel. Raurisergoldberg an Felsen des Märchenpalfens. St.
» *Traunsteineri* Hoppe. Traunsteiner hat dieses Exemplar dem Dr. Storch mitgeteilt und bemerkt auf dem Zettel „Kitzbüchlerhorn, unfruchtbar und immer mit *D. tomentosa* und *carinthiaca* vorkommend, daher gewiss Bastard von diesen beiden. Man vergleiche auch hierüber Bemerkungen Traunsteiners in Flora 1835, Bd. 2 p. 598.
- Im Prodromus von Hinterhuber heisst es: Auf der Weichselbachhöhe der Fusch. Dagegen sagt Traunsteiner in Flora 1844 p. 397: Vor etwa 10 Jahren teilte mir ein guter Freund die Nachricht mit, dass er in der Fusch *Draba Traunsteineri* Hopp. gefunden habe, allein die Exemplare, die er mir später sandte, waren *D. carinthiaca*.
- Draba frigida* Sauter. Untersberg, Gamsgrube am Glockner, Raurisergoldberg, St. Alpen von Fusch und Grossarl, H.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Glaab Ludwig

Artikel/Article: [Das "Herbarium Salisburgense" des salzburgerischen Landesmuseums
152-155](#)