

2. *Poa alpina* L. v. *compacta* Glb.

Halm 3—8 cm hoch; Rispe aufrecht, nicht nickend, kompakt, 1—2 cm lang; Ährchen nicht hängend. Rispenäste und Ährchenstiele kahl, oder etwas rauh, haardünn. Ährchen 1—3 blütig. Hüllspelzen ungleich; die obere grösser, dreinervig, die untere einnervig, kleiner, sowie die Deckspelzen grün, unter der Spitze braungelblich, am Rande weiss. Blätter lineal, kurz zugespitzt. Spreiten $\frac{1}{2}$ —2 cm lang, die des obersten Halmblattes halb so lang als seine Scheide. Sonst Alles wie bei der Var. *mallnitzensis*, mit welcher diese Varietät am selben Standorte gesellig wachsend vorkommt und sich hier von dieser sofort durch ihr gelblichgrünes Aussehen kenntlich macht.

Salzburg, am 12. November 1894.

**Beiträge zur Flora
von St. Vigil und Schluderbach in Tirol.**

Von Hermann Zschacke.

Die im Folgenden mitgetheilten Standortsangaben, soweit sie die Flora von St. Vigil betreffen, sollen die Veröffentlichungen des Herrn Arzt-Plauen in dieser Zeitschrift ergänzen (vergl. Jahrgang X, Seite 140—144 u. Jahrgang XI, Seite 161—165).*) Die aufgezählten Arten sind von mir im Juli des vergangenen Jahres gesammelt; die vom Monte Pian bei Schluderbach stammen zumeist von der italienischen Seite des Berges. Herrn Prof. Dr. Ascherson, der mir über einige mir zweifelhafte Arten gütigst Auskunft gab, sage ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank.

Atragene alpina L. Rittwiesen b. St. Vigil, Monte Pian.

Thalictrum aquilegifolium L. Rittwiesen, Monte Pian.

Pulsatilla alpina Miller. Rittwiesen, Monte Pian.

Ranunculus aconitifolius L. Rittwiesen.

Ranunculus lanuginosus L. Rittwiesen.

Ranunculus nemorosus DC. Rittwiesen.

Trollius europaeus L. Rittwiesen.

Aquilegia atrata Koch. Monte Pian.

Aquilegia pyrenaica DC. Krippes bei St. Vigil.

Aconitum Lycoctonum L. Rittwiesen.

Arabis alpina L. Krippes.

Cardamine amara L. Rittwiesen.

*) Beide Jahrg. zu je *M.* 3,10 käuflich zu haben. D. Red.

- Kerneria saxatilis* Rchb. Krippes.
Biscutella laevigata L. Cortina b. St. Vigil, Rittwiesen.
An beiden Orten var. *hispidissima* neben der Hauptform.
Hutchinsia brevicaulis Hoppe. Monte Pian.
Aethionema saxatile R. Br. Krippes.
Viola biflora L. Krippes, Monte Pian.
Polygala amara L. var. *genuina*. Rittwiesen.
Polygala Chamaebuxus L. Krippes, Monte Pian.
Polygala Chamaebuxus var. *rhodoptera*. Monte Pian,
oberer Waldsaum der Rittwiesen.
Dianthus silvestris Wulf. Rittwiesen.
Silene inflata Smith. Rittwiesen.
Silene Pumilio Wulf. Monte Pian.
Saponaria ocymoides L. Krippes.
Arenaria biflora L. Krippes.
Cerastium alpinum L. Krippes.
Trifolium badium Schreb. Krippes.
Trifolium montanum L. Rittwiesen.
Phaca alpina Wulf. Rittwiesen.
Astragalus alpinus L. Rittwiesen.
Astragalus Onobrychis L. Rittwiesen.
Oxytropis alpina DC. Rittwiesen.
Hippocrepis comosa L. Rittwiesen.
Onobrychis sativa Lam. Rittwiesen.
Ervum silvaticum Peterm. Rittwiesen.
Dryas octopetala L. Krippes.
Geum rivale L. Rittwiesen.
Geum montanum L. Rittwiesen.
Potentilla nitida L. Krippes.
Rosa alpina L., sowohl die Hauptform, als auch var. *pyrenaica*.
Rittwiesen.
Alchemilla pyrenaica Desf. Rittwiesen.
Alchemilla alpina L. Rittwiesen.
Cotoneaster vulgaris Lindl. Rittwiesen.
Sorbus Chamaemespilus Crtz. Monte Pian.
Sempervivum arachnoideum L. Rittwiesen.
Saxifraga Aizoon Jacq. Rittwiesen.
Saxifraga caesia L. Krippes.
Libanotis montana Crtz. Rittwiesen.
Pimpinella magna L. var. *rosea*. Rittwiesen.
Menm Mutellina Gärtner. Krippes.
Laserpitium latifolium Gml. Rittwiesen.

- Laserpitium peucedanoides* L. Rittwiesen.
Lonicera alpigena L. Monte Pian.
Galium silvestre Poll. Rittwiesen.
Valeriana montana L. Rittwiesen, Monte Pian.
Valeriana saxatilis L. Krippes.
Adenostyles albifrons Reich. Rittwiesen.
Aster alpinus L. Rittwiesen.
Bellidiastrum Michellii Cass. Rittwiesen.
Bupthalmum salicifolium L. Rittwiesen.
Gnaphalium supinum L. b. *pusillum* Pers. Krippes.
Leontopodium alpinum Cass. Obere Krippesalpe.
Achillea Clavennae L. Krippes.
Arnica montana L. Rittwiesen.
Cirsium Erisithales Scop. Rittwiesen.
Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer. Rittwiesen.
Leontodon hastilis L. f. *glabra*. Monte Pian.
Leontodon incanus Sibr. Kronplatz.
Scorzonera aristata Ram. Monte Pian.
Aposeris foetida Less. Monte Pian.
Crepis grandiflora Tausch. Rittwiesen.
Phyteuma Sieberi Spr. Monte Pian, Krippes.
Phyteuma Michellii Bert. var. *betonicifolium*. Rittwiesen.
Phyteuma Halleri All. Rittwiesen.
Phyteuma orbiculare L. Rittwiesen.
Campanula caespitosa Sep. Rittwiesen.
Campanula glomerata L. Rittwiesen.
Vaccinium Vitis Idaea L. Krippes.
Vaccinium uliginosum L. Kronplatz.
Erica carnea L. Krippes, Monte Pian.
Rhododendron intermedium Tausch. Unter den Eltern
am oberen Waldsaume der Rittwiesen.
Rhododendron hirsutum L. Über den Rittwiesen, Krippes.
Rhododendron Chamaecistus L. Krippes, Monte Pian.
Azalea procumbens L. Monte Pian.
Ramischia secunda Grcke. Krippes, Kronplatz.
Pirola media Sw. Kronplatz.
Pirola uniflora L. Kronplatz.
Gentiana acaulis L. Monte Pian.
Gentiana bavarica L. Monte Pian.
Gentiana verna L. Monte Pian.
Gentiana utriculosa L. Rittwiesen.
Myosotis silvatica Hoffm. var. *alpestris* Schmidt. Krippes.

- Veronica urticifolia* Jacq. Rittwiesen.
Orobanche cruenta Bert. Rittwiesen. Nährpflanze?
Melampyrum silvaticum L. Rittwiesen.
Pedicularis verticillata L. Rittwiesen.
Pedicularis elongata Kern. Rittwiesen, Krippes.
Pedicularis palustris L. Rittwiesen.
Bartsia alpina L. Monte Pian.
Calamintha alpina Lam. Rittwiesen.
Betonica Alopecurus L. Rittwiesen.
Teucrium montanum L. Cortina bei St. Vigil.
Primula farinosa L. Rittwiesen.
Globularia cordifolia L. Krippes.
Armeria alpina Willd. Monte Pian.
Pinguicula alpina L. Krippes.
Pinguicula vulgaris L. Rittwiesen, Krippes.
Rumex scutatus L. Krippes.
Polygonum viviparum L. Rittwiesen.
Daphne striata Trat. Oberer Waldsaum der Rittwiesen,
Krippes, Monte Pian.
Thesium alpinum L. Rittwiesen.
Salix Lapponum L. Krippes.
Salix retusa L. Monte Pian.
Orchis globosa L. Rittwiesen.
Orchis ustulata L. Rittwiesen.
Orchis latifolia L. Rittwiesen.
Gymnadenia conopea R. Brown. Kronplatz, Rittwiesen.
Gymnadenia odoratissima Rich. Kronplatz.
Gymnadenia albida Rich. Monte Pian, Rittwiesen.
Coeloglossum viride Hartm. Rittwiesen.
Platanthera bifolia Rich. Rittwiesen.
Nigritella angustifolia Rich. Rittwiesen, Krippes.
Herminium Monorchis R. Br. Monte Pian.
Maianthemum bifolium DC. Rittwiesen.
Lilium Martagon L. Rittwiesen.
Allium Schoenoprasum L. var. *alpinum*. Rittwiesen.
Veratrum album L. var. *Lobelianum* Bernh. Rittwiesen.
Tofieldia calyculata Wahl. Rittwiesen.
Juncus alpinus Vill. Rittwiesen.
Eriophorum latifolium Hoppe. Rittwiesen.
Carex Davalliana Sm. Rittwiesen.
Carex flava L. Rittwiesen.

Carex paniculata L. Rittwiesen.
Sesleria sphärocephala Ard. Monte Pian.
Botrychium Lunaria Sw. Rittwiesen.
Lycopodium Selago L. Krippes.

Hecklingen, den 3. Januar 1895.

Floristisches aus Süd-Thüringen und Franken.

Von Georg Kükenthal, Pfarrer.

(Fortsetzung und Schluss von Seite 5 des Jahrg.)

- Senecio spathulifolius* DC. Im Buchenwald bei Tiefenlauter.
- Senecio Fuchsii* Gmel. Unter lichtem Gebüsch bei Öttingshausen.
- Centaurea montana* L. Bei Weitramsdorf, am Kühleborn.
- Tragopogon orientalis* L. Waldränder bei Breitenau.
- Hieracium Pilosella* forma *bifurcata*. Wegrand bei Grosswalbur.
- Hieracium praealtum* Vill. Bei Meeder, Weidach, Breitenau.
var. *fallax* DC. Auf einem Esparsettenacker bei Grosswalbur, daselbst übergehend in
var. **Bauhini Bess.** (= *H. magyricum* N. P. p. p.) Nägeli und Peter haben in ihrer Monographie der Piloselloiden alle ausläufertreibenden Praealtina zu einer besonderen Art *Hieracium magyricum* vereinigt. Dieser Name ist mit dem alten *Hieracium Bauhini* Bess. (Schult.) nicht ganz identisch, insofern letzteres nur die Formen mit wirklichen, d. h. niederliegenden und an der Spitze durch eine Rosette wurzelnden Ausläufern umfasst, während in *Hieracium magyricum* N. P. auch die nur flagellenführenden Formen eingeschlossen sind. Ich halte die Aufstellung des *H. magyricum* nicht für glücklich. Denn dass die Flagellenbildung eine spezifische Verschiedenheit begründen soll, erscheint dem, der in der Natur beobachtet hat, nicht gerechtfertigt. Aber auch für *H. Bauhini* Bess. als besondere Varietät kann ich mich nicht erwärmen. An jedem einzelnen Coburger Standort des *Hieracium praealtum* Vill. könnte man auch *Hieracium Bauhini* Bess. und *Hieracium magyricum* N. P. ohne Mühe herauspräparieren. Da, wo die typische kahle Form von *H. praealtum* wächst, findet man auch kahles *H. Bauhini* mit grossen Blattrosetten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Zschacke Hermann Georg

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von St. Vigil und Schludersbach in Tirol. 20-24](#)