

2. *Poa alpina* L. v. *compacta* G1b.

Halm 3—8 cm hoch; Rispe aufrecht, nicht nickend, kompakt, 1—2 cm lang; Ährchen nicht hängend. Rispenäste und Ährchenstiele kahl, oder etwas rauh, haardünn. Ährchen 1—3 blütig. Hüllspelzen ungleich; die obere grösser, dreinervig, die untere einnervig, kleiner, sowie die Deckspelzen grün, unter der Spitze braungelblich, am Rande weiss. Blätter lineal, kurz zugespitzt. Spreiten  $\frac{1}{2}$ —2 cm lang, die des obersten Halmblattes halb so lang als seine Scheide. Sonst Alles wie bei der Var. *mallnitzensis*, mit welcher diese Varietät am selben Standorte gesellig wachsend vorkommt und sich hier von dieser sofort durch ihr gelblichgrünes Aussehen kenntlich macht.

Salzburg, am 12. November 1894.

Beiträge zur Flora  
von St. Vigil und Schluderbach in Tirol.

Von Hermann Zschacke.

Die im Folgenden mitgeteilten Standortsangaben, soweit sie die Flora von St. Vigil betreffen, sollen die Veröffentlichungen des Herrn Artzt-Plauen in dieser Zeitschrift ergänzen (vergl. Jahrgang X, Seite 140—144 u. Jahrgang XI, Seite 161—165).\*) Die aufgezählten Arten sind von mir im Juli des vergangenen Jahres gesammelt; die vom Monte Pian bei Schluderbach stammen zumeist von der italienischen Seite des Berges. Herrn Prof. Dr. Ascherson, der mir über einige mir zweifelhafte Arten gütigst Auskunft gab, sage ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank.

- Atragene alpina* L. Rittwiesen b. St. Vigil, Monte Pian.  
*Thalictrum aquilegifolium* L. Rittwiesen, Monte Pian.  
*Pulsatilla alpina* Miller. Rittwiesen, Monte Pian.  
*Ranunculus aconitifolius* L. Rittwiesen.  
*Ranunculus lanuginosus* L. Rittwiesen.  
*Ranunculus nemorosus* DC. Rittwiesen.  
*Trollius europaeus* L. Rittwiesen.  
*Aquilegia atrata* Koch. Monte Pian.  
*Aquilegia pyrenaica* DC. Krippes bei St. Vigil.  
*Aconitum Lycocotonum* L. Rittwiesen.  
*Arabis alpina* L. Krippes.  
*Cardamine amara* L. Rittwiesen.

\*) Beide Jahrg. zu je ~~M.~~ 3,10 käuflich zu haben. D. Red.

- Kernera saxatilis* Rehb. Krippes.  
*Biscutella laevigata* L. Cortina b. St. Vigil, Rittwiesen.  
An beiden Orten var. *hispidissima* neben der Hauptform.  
*Hutchinsia brevicaulis* Hoppe. Monte Pian.  
*Aethionema saxatile* R. Br. Krippes.  
*Viola biflora* L. Krippes, Monte Pian.  
*Polygala amara* L. var. *genuina*. Rittwiesen.  
*Polygala Chamaebuxus* L. Krippes, Monte Pian.  
*Polygala Chamaebuxus* var. *rhodoptera*. Monte Pian,  
oberer Waldsaum der Rittwiesen.  
*Dianthus silvestris* Wulf. Rittwiesen.  
*Silene inflata* Smith. Rittwiesen.  
*Silene Pumilio* Wulf. Monte Pian.  
*Saponaria ocymoides* L. Krippes.  
*Arenaria biflora* L. Krippes.  
*Cerastium alpinum* L. Krippes.  
*Trifolium badium* Schreb. Krippes.  
*Trifolium montanum* L. Rittwiesen.  
*Phaca alpina* Wulf. Rittwiesen.  
*Astragalus alpinus* L. Rittwiesen.  
*Astragalus Onobrychis* L. Rittwiesen.  
*Oxytropis alpina* DC. Rittwiesen.  
*Hippocrepis comosa* L. Rittwiesen.  
*Onobrychis sativa* Lam. Rittwiesen.  
*Ervum sylvaticum* Peterm. Rittwiesen.  
*Dryas octopetala* L. Krippes.  
*Geum rivale* L. Rittwiesen.  
*Geum montanum* L. Rittwiesen.  
*Potentilla nitida* L. Krippes.  
*Rosa alpina* L., sowohl die Hauptform, als auch var. *pyrenaica*.  
Rittwiesen.  
*Alchemilla pyrenaica* Desf. Rittwiesen.  
*Alchemilla alpina* L. Rittwiesen.  
*Cotoneaster vulgaris* Lindl. Rittwiesen.  
*Sorbus Chamaemespilus* Crtz. Monte Pian.  
*Sempervivum arachnoideum* L. Rittwiesen.  
*Saxifraga Aizoon* Jacq. Rittwiesen.  
*Saxifraga caesia* L. Krippes.  
*Libanotis montana* Crtz. Rittwiesen.  
*Pimpinella magna* L. var. *rosea*. Rittwiesen.  
*Menm Mutellina* Gärtn. Krippes.  
*Laserpitium latifolium* Gml. Rittwiesen.

- Laserpitium peucedanoides* L. Rittwiesen.  
*Lonicera alpigena* L. Monte Pian.  
*Galium silvestre* Poll. Rittwiesen.  
*Valeriana montana* L. Rittwiesen, Monte Pian.  
*Valeriana saxatilis* L. Krippes.  
*Adenostyles albifrons* Reich. Rittwiesen.  
*Aster alpinus* L. Rittwiesen.  
*Bellidiastrum Michelii* Cass. Rittwiesen.  
*Buphthalmum salicifolium* L. Rittwiesen.  
*Gnaphalium supinum* L. b. *pusillum* Pers. Krippes.  
*Leontopodium alpinum* Cass. Obere Krippesalpe.  
*Achillea Clavennae* L. Krippes.  
*Arnica montana* L. Rittwiesen.  
*Cirsium Erisithales* Scop. Rittwiesen.  
*Centaurea pseudophrygia* C. A. Meyer. Rittwiesen.  
*Leontodon hastilis* L. f. *glabra*. Monte Pian.  
*Leontodon incanus* Sibr. Kronplatz.  
*Scorzonera aristata* Ram. Monte Pian.  
*Aposeris foetida* Less. Monte Pian.  
*Crepis grandiflora* Tausch. Rittwiesen.  
*Phyteuma Sieberi* Spr. Monte Pian, Krippes.  
*Phyteuma Michelii* Bert. var. *betonicifolium*. Rittwiesen.  
*Phyteuma Halleri* All. Rittwiesen.  
*Phyteuma orbiculare* L. Rittwiesen.  
*Campanula caespitosa* Sep. Rittwiesen.  
*Campanula glomerata* L. Rittwiesen.  
*Vaccinium Vitis Idaea* L. Krippes.  
*Vaccinium uliginosum* L. Kronplatz.  
*Erica carnea* L. Krippes, Monte Pian.  
*Rhododendron intermedium* Tausch. Unter den Eltern  
am oberen Waldsaume der Rittwiesen.  
*Rhododendron hirsutum* L. Über den Rittwiesen, Krippes.  
*Rhododendron Chamaecistus* L. Krippes, Monte Pian.  
*Azalea procumbens* L. Monte Pian.  
*Ramischia secunda* Grcke. Krippes, Kronplatz.  
*Pirola media* Sw. Kronplatz.  
*Pirola uniflora* L. Kronplatz.  
*Gentiana acaulis* L. Monte Pian.  
*Gentiana bavarica* L. Monte Pian.  
*Gentiana verna* L. Monte Pian.  
*Gentiana utriculosa* L. Rittwiesen.  
*Myosotis sylvatica* Hoffm, var. *alpestris* Schmidt. Krippes.

- Veronica urticifolia* Jacq. Rittwiesen.  
*Orobanche cruenta* Bert. Rittwiesen. Nährpflanze?  
*Melampyrum silvaticum* L. Rittwiesen.  
*Pedicularis verticillata* L. Rittwiesen.  
*Pedicularis elongata* Kern. Rittwiesen, Krippes.  
*Pedicularis palustris* L. Rittwiesen.  
*Bartsia alpina* L. Monte Pian.  
*Calamintha alpina* Lam. Rittwiesen.  
*Betonica Alopecurus* L. Rittwiesen.  
*Teucrium montanum* L. Cortina bei St. Vigil.  
*Primula farinosa* L. Rittwiesen.  
*Globularia cordifolia* L. Krippes.  
*Armeria alpina* Willd. Monte Pian.  
*Pinguicula alpina* L. Krippes.  
*Pinguicula vulgaris* L. Rittwiesen, Krippes.  
*Rumex scutatus* L. Krippes.  
*Polygonum viviparum* L. Rittwiesen.  
Daphne striata Trat. Oberer Waldsaum der Rittwiesen,  
Krippes. Monte Pian.  
*Thesium alpinum* L. Rittwiesen.  
*Salix Lapponum* L. Krippes.  
*Salix retusa* L. Monte Pian.  
*Orchis globosa* L. Rittwiesen.  
*Orchis ustulata* L. Rittwiesen.  
*Orchis latifolia* L. Rittwiesen.  
*Gymnadenia conopea* R. Brown. Kronplatz, Rittwiesen.  
*Gymnadenia odoratissima* Rich. Kronplatz.  
*Gymnadenia albida* Rich. Monte Pian, Rittwiesen.  
*Coeloglossum viride* Hartm. Rittwiesen.  
*Platanthera bifolia* Rich. Rittwiesen.  
*Nigritella angustifolia* Rich. Rittwiesen, Krippes.  
*Herminium Monorchis* R. Br. Monte Pian.  
*Maianthemum bifolium* DC. Rittwiesen.  
*Lilium Martagon* L. Rittwiesen.  
*Allium Schoenoprasum* L. var. *alpinum*. Rittwiesen.  
*Veratrum album* L. var. *Lobelianum* Bernh. Rittwiesen.  
*Tofieldia calyculata* Wahl. Rittwiesen.  
*Juncus alpinus* Vill. Rittwiesen.  
*Eriophorum latifolium* Hoppe. Rittwiesen.  
*Carex Davalliana* Sm. Rittwiesen.  
*Carex flava* L. Rittwiesen.

- Carex paniculata* L. Rittwiesen.  
*Sesleria sphärocephala* Ard. Monte Pian.  
*Botrychium Lunaria* Sw. Rittwiesen.  
*Lycopodium Selago* L. Krippes.

Hecklingen, den 3. Januar 1895.

---

## Floristisches aus Süd-Thüringen und Franken.

Von Georg Kükenthal, Pfarrer.

(Fortsetzung und Schluss von Seite 5 des Jahrg.)

*Senecio spathulifolius* DC. Im Buchenwald bei Tiefenlauter.

*Senecio Fuchsii* Gmel. Unter lichtem Gebüsch bei Öttinghausen.

*Centaurea montana* L. Bei Weitramsdorf, am Kühleborn.

*Tragopogon orientalis* L. Waldränder bei Breitenau.

*Hieracium Pilosella forma bifurcata*. Wegrand bei Grosswalbur.

*Hieracium praealtum* Vill. Bei Meeder, Weidach, Breitenau.  
var. *fallax* DC. Auf einem Esparsettenacker bei Grosswalbur, daselbst übergehend in

**var. Bauhini Bess.** (= *H. magyaricum* N. P. p. p.) Nägeli und Peter haben in ihrer Monographie der Piloselloiden alle ausläufertreibenden Praealtina zu einer besonderen Art *Hieracium magyaricum* vereinigt. Dieser Name ist mit dem alten *Hieracium Bauhini* Bess. (Schult.) nicht ganz identisch, insofern letzteres nur die Formen mit wirklichen, d. h. niedrigliegenden und an der Spitze durch eine Rosette wurzelnden Ausläufern umfasst, während in *Hieracium magyaricum* N. P. auch die nur flagellenführenden Formen eingeschlossen sind. Ich halte die Aufstellung des *H. magyaricum* nicht für glücklich. Denn dass die Flagellenbildung eine specifische Verschiedenheit begründen soll, erscheint dem, der in der Natur beobachtet hat, nicht gerechtfertigt. Aber auch für *H. Bauhini* Bess. als besondere Varietät kann ich mich nicht erwärmen. An jedem einzelnen Coburger Standort des *Hieracium praealtum* Vill. könnte man auch *Hieracium Bauhini* Bess. und *Hieracium magyaricum* N. P. ohne Mühe herauspräparieren. Da, wo die typische kahle Form von *H. praealtum* wächst, findet man auch kahles *H. Bauhini* mit grossen Blattrosetten.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Zschacke Hermann Georg

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von St. Vigil und Schluderbach in Tirol. 20-24](#)