Hypnum fluitans L. Hofberg am Keilberge (Schauer)!
Hypnum cupressiforme L. Var. elatum Br. et Sch. In schönen, weiten Polstern Kalkfelsen bedeckend bei Reichenau a. K.!
Hypnum Lindbergii Mitten. Mit Blasia pusilla auf Lehmboden unweit von der Ziegelei bei Zavist bei Prag!
Hylocomium splendens Br. et Sch. Mit Früchten: Schmiedeberg auf Waldboden und Baumstrünken (Schauer)! — Am Pleil bei Weipert (Schauer)! — Waldstrasse von Reichenau an d. K. zur Studanka!
Hylocomium loreum Br. et Sch. Wegränder im Hochwalde bei Weipert (Schauer)!
Hylocomium triquetrum Br. et Sch. Waldränder, Kolling bei der Bergstadt Lauterbach!

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

VII. *)

4. Thalictrum aquilegifolium L. Erlengebüsch, Alfalter bei Hersbruck (Scherzer). Wandert im Pegnitzthal abwärts.
11. Hepatica triloba Gil. In der Windsheimer Gegend bei Scheinfeld, Baudenbach, Obersteinbach. Ferner auf dem Höhenzug rechts der Aisch zwischen Obernzenn und Westheim verbreitet. Sehr häufig auch um Sulzbürg bei Neumarkt. Dann Buchleiten bei Roth.
12. Pulsatilla vulgaris L. Gipsbrüche und Gräfholz bei Windsheim.
19. Anemone ranunculoides L. Im Keuper: Feuchter Wald bei Gsteinach.
54. Ranunculus sceleratus L. Strassengraben zwischen Sündersbühl und Grossreuth bei Nürnberg.
57. Trollius europaeus L. Feuchte Wiesen bei Grossweissmannsdorf und Wicklesgreuth (Keuper).
96. Corydalis intermedia P. M. E. Neuses im unteren Schwarzachthal. In Hecken bei Sulzbürg.
138. Cardamine impatiens L. Am Rednitzufer bei Roth (Honig).
145. Dentaria enneaphyllos L. Gebüschwald, Schlüpfelberg bei Sulzbürg und Appel bei Erasbach sehr zahlreich.
180. Diplotaxis tenuifolia DC. An einer Hecke bei Schoppershof (Riedner).
220. Lepidium Draba L. Am Bahnhof Stein. Bei Schwabach auf Schutt.
221. L. campestre R. Br. Im Keuper bei Fürth, am Bahnhof Stein und bei Henfenfeld. Auf Opalinusthon am Rottenberg. Auf Äckern des weissen Jura bei Alfalter, Morsbrunner Plateau und Hinterhof bei Schnaittach.
269. Reseda Luteola L. Hohenstädter Geisskirche bei Eschenbach.
272. Drosera intermedia Hayne. An der Grenze des Gebiets bei Stegenthumbach in der Oberpfalz (Chr. Zahn)
326. Sagina nodosa Fenzl. scheint im Gebiete nur in der Form pubescens K. vorzukommen.
417. Geranium sanguineum L. Limbach bei Schwabach im Walde (Keuper).

---

*) VI. vergl. Seite 48 des Jahrg. 1894.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

424. Geranium molle L. Am Bahnhof Lauf. Um Nürnberg öfter, z. B. Herrnhütte, Stein.
441. Rhamnus cathartica L. Hecke bei Kersbach.
488. Trifolium ochroleucum L. Bergwiesen, Schnittling bei Spalt.
520. Astragalus Cicer L. Auf dem Rottenberg und Moritzberg.
532. Ornithopus perpusillus L. Bei Schwabach auf Lehmboden.
537. Vicia dumetorum L. Gebüsch, Moritzberg (Prechtelsbauer). Plösselberg (Semler).
540. Vicia villosa Roth. Die behaarte Form im Gebiet selten, so im Keuper auf Äckern bei Zirndorf (Honig) und an der Strasse bei Gutzberg (Kaufmann).
564. Lathyrus silvester L. Auf Dogger am Moritzberg.
645. Fragaria viridis Duch. Im Keuper bei Gutzberg.
663. Potentilla arenaria Borkh. Zwischen Hersbruck und Velden, sowie auf den Höhen links der Pegnitz vielfach auf trocknen Jurahängen.
767. Herniaria glabra L. v. puberula Peterm. Sumpfwiese, Glaishammer bei Nürnberg (Riedner).
893. Laserpitium latifolium L. v. asperum Crtz. Gräfholz bei Windsheim.
929. Adoxa Moschatellina L. Zwischen Heroldsberg und Grossgeschaid, dann Unterbürg bei Nürnberg.
936. Lonicera Caprifolium L. Wie wild um Spalt in Wäldern (Honig).
961. Galium rotundifolium L. Waldrand bei Heroldsberg im Keuper.
988. Knautia arvensis Coult. f. campestris. Rain bei Zirndorf.
1014. Stenactis annua Nees. Waldlichtung, Prünst bei Schwabach.
1045. Filago germanica L. Äcker, Walsdorf bei Bamberg.
1108. Senecio spathulifolius DC. Auf dem Appel bei Erasbach in der Oberpfalz.
1169. Centaurea montana L. Am Schwarzachufer bei Schwarzach.
1191 c. Tragopogon orientalis L. Wiesen bei Spalt.
1299. Phyteuma orbiculare L. St. Moritz bei Muggendorf auf Dolomit.
1315. Campanula glomerata L. Im Keuper zwischen Erlangen und Möhrendorf und Leyh bei Nürnberg.
1340. Pirola chlorantha Sw. Waldige Abhänge bei Spalt im Keuper. Bei Neutras im Jura.
1353. Vinca minor L. Im Keuper bei Günthersbühl und von dort gegen Lauf. Ebenso bei Westheim.
1368. Gentiana verna L. Feuchte Wiesen, Kruppach bei Sulzbürg und zwischen Siegersdorf und Hinterhof bei Schnaittach.
1394. Cynoglossum officinale L. Im Jura an vielen Orten. Neue Fundorte: Oberkrumbach, Hubmersberg, Fischbronn, Vorra.
Im Keuper: Rollhofen bei Schnaittach und Altheim bei Neustadt.
1415. Lithospermum purpureo-coeruleum L. Gebüschwald, Schlüpfelberg bei Neumarkt.
1431. Physalis Alkekengi L. Geisskirche bei Eschenbach.
1458. Linaria Elatine Mill. Zahlreich auf Äckern, Walsdorf bei Bamberg.
1476 b. Veronica parmularia P. e. T. In einem Graben bei Eibach unter scutellata.
1506. Melampyrum cristatum L. Im Jura auf dem Schlüpfelberg, im Keuper bei Spalt.
1540. Orobanche rubens Wallr. Trockene Wiesen bei Spalt (Keuper).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1591. Melittis Melissophyllum L. Auf dem Appel bei Erasbach in der Oberpfalz.
1627b. Ajuga genevensis L. var. macrophylla Sch. e. M. Im Jura, Hinterhof bei Schnaittach.
1631. Teucrium Botrys L. Eingeschleppt auf dem Ostbahnhof bei Nürnberg (Riedner).
1636. Pinguicula vulgaris L. Hammermühle bei Eschenbach in der Oberpfalz (Chr. Zahn), ausserhalb des Gebietes.
1754. Polygonum Bistorta L. Feuchte Wiesen, Lohe bei Almoshof.
1781. Aristolochia Clematitis L. In Hecken, Belmbrach bei Roth (Honig).
1926. Arum maculatum L. Bei Sulzbürg am Schlossberg und bei Hubmersberg (Dogger).
1929. Orchis purpurea Jacq. Im Jura auf dem Schlüpfelberg.
1937. O. pallens L. Im Jura auf dem Nonnenberg bei Hersbruck.
1963. Cephalanthera grandiflora Bab. Im Keuper, Gebüschwald bei Katzwang.
1980. Cypripedium Calceolus L. Schlüpfelberg bei Neumarkt.
2017. Ornithogalum umbellatum L. Äcker bei Rossstall und Henfenfeld (Keuper).
2019. O. nutans L. Zahlreich auf Äckern bei Roth (Honig).
2026. Allium ursinum L. Quellige Plätze, Hubmersberg bei Hersbruck und Buchberg bei Neumarkt auf Dogger.
2058. Colchicum autumnale L. v. vernale Hoffm. Auf Wiesen bei Pommelsbrunn (Münderlein).
2068. Juncus filiformis L. Feuchte Waldblösse bei Fischbach (Keuper).
2161. Carex praecox Schreb. Im Pegnitzthal unterhalb Nürnberg.
2204. C. pendula Huds. Zwischen Günthersbühl und Behringersdorf.
2212b. C. lepidocarpa Tausch. Sumpfiger Weiherrand, Weiherhof bei Zirndorf.
2228. C. acutiformis Ehrh. v. Kochiana DC. Wassergraben in der Nähe des Bahnhofs Vach (Münderlein).
2356. Glyceria distans Wahlnbg. Sündersbühl bei Nürnberg.
2415. Taxus baccata L. Hohenstädter Geisskirche bei Eschenbach.
2427. Equisetum maximum Lmk. Hinterhof bei Schnaittach im Jura. Hagsbrunn bei Spalt und Schlossberg bei Heideck im Keuper.
2438. Lycopodium Selago L. Neuses im Schwarzachthal (Semler).
2477. Asplenium viride Huds. Dolomitfelsen, Neutras bei Etzelwang.
2489. Blechnum Spicant With. Im Keuper, Belmbruch bei Roth (Honig).

Aus den an das Regnitzgebiet angrenzenden Teilen des Altmühl- und Wörnitzgebietes seien noch folgende Beobachtungen notiert:

Durch Herrn Kaufmann in der Gegend von Pappenheim: Sagina apetala L. (Äcker bei Neudorf), Alsine tenuifolia Wahlnbg., Coronilla montana Scop., Vicia tenuifolia Rth., Rosa gallica L., Bupleurum longifolium L., Lonicera Caprifolium L. (in Wäldern gleichsam wild), Asperula glauca Bess., Galium rotundifolium L., Cirsium lanceolatum × oleraceum (Bieswang), Melampyrum silvaticum L., Salvia verticillata L., Melittis Melissophyllum L.

Durch Herrn Prechtelsbauer aus der Gegend von Schillingsfürst: Adonis aestivalis L. v. citrinus Hffm. (Keuper), Ranunculus sceleratus L. (bei Dombühl), Cytisus sagittalis K., Turgenia latifolia Hoffm., Phyteuma nigrum Schm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche botanische Monatsschrift

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes 85-87