

- Amarantus retroflexus* L. Öfters auf Schutt bei Meiningen.
Chenopodium Vulvaria L. An der Haselbrücke bei Einhausen.
Ch. rubrum L. Bei Meiningen selten, Stedlingen.
Scheuchzeria palustris L. fanden wir letzten Sommer in grosser Menge auf dem Petersee, sodass sie bei nur einigermaßen genauer Untersuchung des Moores gar nicht hätte übersehen werden können.
Triglochin palustris L. ist bei Meiningen an sehr vielen Stellen zu finden, z. B. Belrieth, Rohr, Untermassfeld, Stedlingen, Welkershausen, Seeba, Herpf, am Ausgang des Hassfurtstales, Ritschenhausen u. s. w.
Dasselbe gilt von *Potamogeton pusillus* L. Z. B. bei Belrieth, Untermassfeld, an seichten Stellen der Werra, im Grosskopfsteich bei Westenfeld u. s. w.
Allium fallax Schult. An Kalkfelsen über der Haltestelle Vachdorf.
A. ursinum L. m: Hutsberg bei Helmershausen, Klosterholz bei Sinnnershausen, Brunnquell bei Trostadt bei Themar, bei Bibra.
Scirpus compressus Pers. m: Am Rudelsberg nach Stedlingen zu.
Carex praecox Schreb. k: bei Römhild nach der Jägersruhe zu (neben *Potentilla thuringiaca*).
C. brizoides L. Basalt: Am grossen Gleichberg zusammen mit *C. remota* L.
Alopecurus fulvus Sm. Bei Defertshausen, auf dem Petersee.
Meiningen, den 26. Februar 1896.

Zur Flora der Gegend von Sangerhausen.

Von Ew. Wüst, stud. rer. nat., in Halle a. S.

Veranlasst durch die Mitteilungen des Herrn Becker in der Februar-März-Nummer dieser Zeitschrift, die eine Anzahl interessanter Pflanzensfunde aus der Gegend von Sangerhausen bringen, teile ich im Folgenden einige neue Standortsangaben mit, die das Ergebnis einer Anzahl von mir im Jahre 1893 in der Umgegend von Sangerhausen unternommener kleinerer Exkursionen und einer von Herrn Dr. August Schulz in Halle a. S. und mir im Herbst 1895 ausgeführten Exkursion von Rossla über Questenberg und Leinungen nach Sangerhausen sind. Es wäre sehr zu wünschen, dass bei der floristischen Untersuchung der weiteren Umgebung von Sangerhausen die Gipsberge zwischen Mohrungen und Questenberg besonders berücksichtigt würden; denn ohne Zweifel wachsen hier noch manche im südlicheren und östlicheren Deutschland weiter verbreitete Arten, welche bislang nicht nördlich oder nordwestlich von der Grafschaft Mansfeld, der Gegend der unteren Unstrut und dem Kyffhäusergebirge, wohl aber in der näheren Umgebung von Nordhausen gefunden wurden und vielleicht auch solche, die bei Nordhausen noch nicht nachgewiesen werden konnten.

Clematis Vitalba L. Zwischen Sangerhausen und dem Hohen Berg; in einem Thal westlich von der Engelsburg bei Sangerhausen; südwestlich von Hainrode¹⁾; westlich vom Eichenberg²⁾.

¹⁾ An einem bewaldeten Hügel, nördlich vom Eichenberg bei Klein-Leinungen gelegen.

²⁾ An Gipsbergen, westlich vom Eichenberg, nördlich von Klein-Leinungen gelegen.

- Thalictrum flexuosum* Bernh. Südlich von Hainrode.
Pulsatilla vulgaris Mill. Südwestlich von Hainrode¹⁾.
Anemone silvestris L. Hoher Berg.
Adonis vernalis L. Strichweise sehr häufig auf dem Buntsandsteinhöhenzuge zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen; südwestlich von Hainrode¹⁾; westlich vom Eichenberg²⁾; Buntsandsteinabhänge auf der linken Seite der Leine, zwischen Klein-Leinungen und Wickerode.
Nigella arvensis L. Zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen.
Aquilegia vulgaris L. Buntsandsteinabhänge auf der linken Seite der Leine zwischen Klein-Leinungen und Wickerode, verwildert.
Actaea spicata L. Hoher Berg; Mooskammer („bei Sangerhausen“ Hampe, fl. herc. p. 13).
Erysimum virgatum Roth. Südwestlich von Hainrode¹⁾; westlich vom Eichenberg²⁾; nördlich von Questenberg.
Alyssum montanum L. Westlich vom Eichenberg²⁾.
Thlaspi perfoliatum L. Gehänge des alten Gonnathals zwischen Sangerhausen und dem Hohen Berg; bei Mohrungen in der Nähe der Burgruine.
Lepidium campestre L. Am Gipsbruch zwischen Gonna und Obersdorf.
Rapistrum perenne L. Zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen.
Helianthemum Fumana L. Westlich vom Eichenberg²⁾.
Viola mirabilis L. Südwestlich von Hainrode¹⁾; Schälwäldchen, rechts über der Landstrasse von Rossla nach Agnesdorf.
Gypsophila fastigiata L. Westlich vom Eichenberg²⁾.
Tunica prolifera L. Auf und um Schlackenhalde an der Nordseite des Dorfes Gonna.
Silene vulgaris Mneh. f. *angustifolia* Koch. Auf Schlackenhalde, z. B. an der Kupferhütte zwischen Sangerhausen und Gonna, bei Gonna, bei Obersdorf, bei Mohrungen.
Alsine verna L. Auf Schlackenhalde bei Gonna und Obersdorf.
Lavatera thuringiaca L. Zwischen Klein-Leinungen und dem Eichenberg; zwischen Wickerode und Bennungen.
Dictamnus albus L. Gehölz an der Walkmühle bei Sangerhausen.
Ribes alpinum L. Gehölz an der Walkmühle bei Sangerhausen.
Eryngium campestre L. Allgemein verbreitet, besonders auf Buntsandstein.
Bupleurum falcatum L. Allgemein verbreitet, besonders auf Buntsandstein und Zechstein.
Cornus mas L. Südwestlich von Hainrode¹⁾.
Asperula glauca L. Westlich vom Eichenberg²⁾.
Scabiosa suaveolens Desf. Zwischen dem Butterberg und Wallhausen, an einigen Stellen, auf Buntsandstein.
Inula germanica L. Auf Buntsandstein, an einem Wegraine in der Nähe der Bahn, nordwestlich von Sangerhausen.
Inula Conyza DC. Verbreitet, z. B. bei Grillenberg, zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen, südwestlich von Hainrode¹⁾.
Tanacetum corymbosum L. Südwestlich von Hainrode¹⁾; Schälwäldchen, rechts über der Landstrasse von Rossla nach Agnesdorf.
Senecio erucifolius L. In einem Thal westlich von der Engelsburg; im Eschenthal, südlich vom Walde.

- Lactuca quercina* L. Schälwäldchen, rechts über der Landstrasse von Rossla nach Agnesdorf; auf Buntsandstein.
- Vinca minor* L. Zwischen Bayernaumburg und Bahnhof Riestedt.
- Gentiana ciliata* L. Auf Buntsandstein zwischen Sangerhausen, Wallhausen und Gross-Leinungen mehrfach; westlich vom Eichenberg²⁾; Buntsandsteinabhänge an der linken Seite der Leine zwischen Klein-Leinungen und Wickerode.
- Lithospermum purpureo-coeruleum* L. Gehölz an der Walkmühle bei Sangerhausen; Schälwäldchen, rechts über der Landstrasse von Rossla nach Agnesdorf.
- Verbascum Lychnitis* L. f. *alba* Mill. In einem der grösseren Wasserrisse zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen.
- Veronica Teucrium* L. Schälwäldchen, rechts über der Landstrasse von Rossla nach Agnesdorf.
- Stachys germanica* L. Zwischen Klein-Leinungen und dem Eichenberg; westlich vom Eichenberg²⁾; südwestlich von Hainrode¹⁾.
- Stachys arvensis* L. Bei Drebsdorf.
- Stachys annua* L. Äcker südwestlich von Hainrode.
- Stachys recta* L. Zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen; westlich vom Eichenberg²⁾; zwischen Klein-Leinungen und dem Eichenberg; Abhänge auf der linken Seite der Leine zwischen Klein-Leinungen und Wickerode.
- Brunella grandiflora* Jacq. Zwischen dem Butterberg und Wallhausen.
- Ajuga Chamaepitys* L. Zwischen dem Hohen Berg und Wallhausen; zwischen Hainrode und Kl.-Leinungen und diesem Ort und Wickerode.
- Teucrium Botrys* L. Auf dem Buntsandsteinhöhenzug vom Hohen Berg bis nach Wallhausen; auf Buntsandsteingeröll am Sachsgraben zwischen Sangerhausen und Wallhausen; zwischen Hainrode und Klein-Leinungen, mehrfach; Buntsandsteinabhänge auf der linken Seite der Leine zwischen Klein-Leinungen und Wickerode.
- Armeria vulgaris* Willd. Auf Schlackenhalde und diesen benachbarten Rainen am Gipsbruch zwischen Gonna und Obersdorf; stellenweise wie gesät!
- Chenopodium Vulvaria* L. Ziemlich verbreitet, z. B. in und um Sangerhausen; bei Oberröblingen an der Helme, bei Wallhausen.
- Lilium Martagon* L. Hoher Berg; Weimelburg bei Wettelrode; bei Grillenberg.
- Allium fallax* Schult. Westlich vom Eichenberg²⁾.
- Phleum Boehmeri* Wib. Butterberg.
- Stipa capillata* L. An einer Stelle am Butterberg.
- Sesleria coerulea* Ard. Südwestlich von Hainrode¹⁾.
- Melica ciliata* L. Mehrfach zwischen dem Butterberg, dem Hohen Berg und Sangerhausen.
- Asplenium septentrionale* L. Schlackenhalde bei Obersdorf.
- Halle a. S., den 13. Mai 1896.

Ein Ausflug in die Vogesen.

Von Dr. Fr. Meigen.

Die folgenden Zeilen sollen die Aufzeichnungen und Beobachtungen wiedergeben, die ich auf einem in der 2. Hälfte des Juni unternommenen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Wüst Ewald

Artikel/Article: [Zur Flora der Gegend von Sangerhausen 90-92](#)