

Beitrag zur Flora von Griechenland.

Von Dr. Ed. Formánek (Brünn).

Im Folgenden veröffentliche ich ein kleines Verzeichnis griechischer Pflanzen, welche ich käuflich vom Hrn. Leonis erworben habe und deren Bestimmung beziehungsweise Revision (indem ursprünglich alle unbestimmt waren) der hervorragende Kenner der griechischen Flora Dr. Eug. von Halászy bereitwilligst übernahm, aus welchem Anlasse ich ihm hier meinen besten Dank ausspreche.

Mibora minima L. Sp. pl. 73 sub Agrostide = *M. verna* Adans.

Rchb. Germ. fig. 453. Mons Oinos (= Aenos) Cephaloniae (Heldr.!).

Eragrostis major Host. Gram. IV, 14. t. 24. In olivetis ad Athenas Atticae.

Carex stricta Good. Trans. Linn. Soc. 2, 196, tab. 21 Angelokastro ad lacum Vrachori in Acarnania.

Cyperus badins Desf. Al. 145, tab. 7, fig. 2. In olivetis ad Athenas Atticae.

Allium hymettium Boiss. Diagn. Ser. II, 4. p. 118. Colle Philippapo prope Akropolin ad Athenas Atticae.

Scilla bifolia L. Sp. pl. 443. Mons Oinos Cephaloniae.

Gagea bohemica Sch. Syst. VII, pag. 549. Mons Oinos Cephaloniae.

G. foliosa Presl. Del. Prag. p. 149 sub Ornithogalo. Mons Oinos Cephaloniae.

Galanthus Olgae Orph. in Boiss. Fl. or. V, p. 146. Monte Taygeto in Peloponneso (Orph.!).

Romulea bulbocodium L. Sp. pl. 51 sub Ixia. Aetolikon prope Missolunghi Acarnaniae.

Crocus Sieberi J. Gay in Bull. Fer. 1831, Vol. 25, pag. 220. Mons Oinos Cephaloniae.

Crozophora tinctoria A. Juss. tent. Euph. 88. Apud Chamosternes prope carcerem Syngeres ad Athenas Atticae.

Polygonum aviculare L. Sp. pl. I. p. 519. In olivetis ad Athenas Atticae.

Schizotheca rosea Celak. Prodr. Fl. Boh. 150 = *Atriplex rosea* L. Sp. pl. ed. II, 1493. Ad litora maritima Atticae ad Phalerum.

S. Iaciniata Celak. Prodr. Fl. Boh. 150. Var. typica Beck. Fl. N. Ö. p. 336 = *Atriplex tartarica* L. Sp. pl. 1053. Apud Chamosternes ad Athenas Atticae.

Chenopodium ambrosoides L. Sp. pl. 302. Ex America oriundum nunc multis locis Graeciae ad vias et incultis, ut apud Chamosternes prope Athenas Atticae subsppontaneum.

Campanula drabifolia Sibth. Fl. Graec. III, p. 11. tab. 215 β. major Boiss. Fl. or. III, 933 = *C. Attica* Boiss. Diag. Ser. I, 11. p. 67. Colle Philippapo ad Athenas Atticae.

Podanthum limonifolium Sibth. et Sm. Prodr. Fl. Graec. I, p. 144 sub Phyteumate. In fruticetis m. Pentelici (Hskn.).

Chondrilla ramosissima Sibth. et Sm. Fl. Graec. VIII, p. 70. tab. 795. Ad litora maritima Atticae ad Phalerum.

- Seriola aetnensis L.** Sp. pl. 1139. Attica ad Phalerum.
- Tragopogon longifolium Heldr. et Sart.** in Boiss. Diagn. Ser. II, 3. p. 90. In pratis paludosis maritimis Atticae ad Phalerum inter juncos (Heldr. Fl. Gr. exs. 1694!).
- Inula verbascifolia Willd.** Sp. pl. III, p. 1924 (1800); Conyza candida L. p. par. non Willd. = J. candida Cass. dict. 23, p. 554. In rupestribus m. Pentelici Atticae.
- Anthemis tomentosa L.** Sp. pl. ed. I et II, nec Syst. Nat. Ed. XII, nec Gouan; Urv. Enum. p. 113. Attica ad Phalerum.
- A. tinctoria L.** Sp. pl. 896 α , DC. Prodr. VI, 11. Var. pallida DC. l. c. In reg. superiore m. Pentelici Atticae (Clem.!).
- Filago pyramidata L.** Sp. pl. 1199 (1753). Var. canescens Jord. Bill. 389. Lyon p. sp. Cacumen m. Pentelici Atticae.
- Helichrysum siculum Spreng.** Syst. p. 476 sub Gnaphalio. M. Pentelico Atticae (Sprun., Boiss., Heldr. 1875, Hskn. 1895) et cacumen ejusdem montis.
- Centaurea Guicciardi Boiss.** Fl. or. III, 661. Attica ad Phalerum.
- C. graeca Boiss. et Spr.** Diag. Ser. I, 6. pag. 128 non Grisb. M. Pentelico Atticae (Spr. Heldr. Sartor.!).
- Cardopatium corymbosum L.** Sp. pl. 1164 sub Carthamo; Pers. Ench. 2, p. 500. Attica ad Phalerum (Hskn. 1893).
- Atractylis cancellata L.** Sp. pl. 1162 Colle Philippapo ad Athenas Atticae.
- Echinops albidus Boiss. et Sprun.** Diag. Ser. I, 6. p. 97. Var. longifolius Form. 1897. Foliis coriaceis longe oblongo-lanceolatis (mediis 21 cm longis), supra setis eglandulosis setisque glanduliferis intermixtis obsitis, subtus albidis, caulis crebre glanduloso setosis. Ad Glifad in Graecia.
- E. graecus Mill.** Dict. Nr. 3. Attica ad Phalerum (Hskn. 1893!).
- Scabiosa Webbiana Don.** Bot. Reg. tab. 717. In herbidis m. Pentelici (Hskn. 1893!).
- Asperula arvensis L.** Sp. pl. 150. Ad urbem Tripolis (= Tripolitza) in Arkadia.
- A. rigidula Halác.** Ö. b. Z. 1895 p. 382. Var. tomentella Halác. l. c. M. Pentelico Atticae.
- Galium setaceum Lamk.** Dict. II, p. 584. Var. lasiocarpum Colle Philippapo ad Athenas Atticae.
- Lonicera etrusca Santi.** Viagg. I, p. 113. tab. 1. M. Pentelico Atticae.
- Cynanchum acutum L.** Sp. pl. 310. Chamosternes ad Athenas Atticae.
- Heliotropium europaeum L.** Sp. pl. 187. Chamosternes ad Athenas Atticae.
- Echium sericeum Vahl.** Symb. p. 35 Var. hispidum Boiss. Fl. or. IV, 207 = E. hispidum Fl. Graec. p. 68, tab. 181. Attica ad Phalerum et colle Philippapo ad Athenas.
- Alkana tinctoria L.** Sp. pl. ed. I, p. 132 sub Lithospermo. Attica ad Phalerum.
- Anchusa hybrida Ten.** Fl. Nap. I, p. 45, t. 11. Attica ad Callitheam.
- A. variegata L.** Sp. pl. 198 sub Lycopside. Missolunghi in Acarnania.
- Convolvulus doryenium L.** Sp. pl. 224. Inter Athenas et Phalerum (Sprun., Heldr. 1879!), ut ad Callitheam Atticae.

- Salvia argentea L.** Sp. pl. 38. Prope Athenas (Spr. Orph.), ad Callitheam inter Athenas et Phalerum Atticae.
- S. calycina Sibth. et Sm.** Fl. Graec. I, p. 13. tab. 16. Cacumen m. Pentelici Atticae.
- Thymus capitatus Hoffm. et Link.** Fl. Port. I, p. 123 (1800); L. Sp. pl. 568 (1753) sub Satureja. Attica ad Callitheam.
- T. atticus Celak.** in Flora L. XV, p. 564 (1882) = T. striatus Boiss. Fl. or. IV, 557 (1879) part. non Vahl. M. Pentelico Atticae.
- Satureja thymbra L.** Sp. pl. 794. M. Pentelico Atticae.
- Calamintha graveolens M. B.** Taur. Cauc. II, p. 60 sub Thymo. M. Pentelico Atticae (Boiss., 1879).
- C. clinopodium Benth.** in DC. Prodr. XII, 233 = Clinopodium vulgare L. Sp. pl. 587. M. Pentelico Atticae.
- Ballota acetabulosa Benth.** Lab. p. 595. Colle Philippapo ad Athenas Atticae.
- Sideritis remota D'Urv.** Enum. p. 66. Attica ad Callitheam.
- S. Romana L.** Sp. pl. 802. Colle Philippapo ad Athenas Atticae.
- Tenerrimum polium L.** Sp. pl. 792. Var. vulgaris Boiss. Fl. or. IV, 821. Attica ad Callitheam et m. Pentelico.
- T. flavum L.** Sp. pl. 791. M. Pentelico (Heldr. 1879!).
- Plantago psyllium L.** Sp. pl. 167. Attica ad Callitheam.
- Plumbago europaea L.** Sp. pl. I. p. 215. In olivetis ad Athenas Atticae.
- Statice Limonium L.** Sp. pl. 394. Ad litora maritima, Attica ad Phalerum (Sprun.).
- S. sinuata L.** Sp. pl. 397. Attica ad Phalerum.
- Ranunculus paucistamineus Tausch** in Flora XVII (1834) 523. Var. trichophyllum Chaix in Vill. Hist. pl. Dauph. I, 335 sec. Freyn. Missolunghi in Acarnania.
- R. arvensis L.** Sp. pl. 780. Var. squamosa Form. 1897. Carpellis squamis triangularilanceolato subulatis longis obsitis. Ad urbem Tripolis in Arkadia.
- Nigella arvensis L.** Sp. pl. 753. Var. involucrata Boiss. Fl. or. I, 66 = N. aristata Sibth. Fl. Graec. tab. 510. Attica ad Callitheam.
- Delphinium junceum DC.** Fl. Fr. V, p. 641 (1815); DC. Syst. nat. I, p. 348 (1818) = D. peregrinum L. herb. ex DC. Syst. l. c. sec. Halác. Attica ad Callitheam.
- Fumaria capreolata L.** Sp. pl. 985. In olivetis ad Athenas Atticae.
- Matthiola tricuspidata L.** Sp. pl. 926 sub Cheirantho; R. Br. H. Kew. IX, p. 120. Ic. Fl. Graec. tab. 639. Attica ad Callitheam.
- Erysimum graecum Boiss. et Heldr.** Diagn. Ser. II, I p. 27. Ad Athenas Atticae (Heldr. Fl. Gr. exs. 1708!).
- E. bisaccatum Form.** 1897. Suffrutescens, adpressissime puberulo — subcanescens, caulis elatis 15—30 cm altis, foliosis, adscendentibus, plerumque flexuosis, paulo supra basin ramosis, rarius simplicibus, ramis arcuato — adscendentibus, foliis planis, integerimis (9 cm longis, 1 cm latis), lanceolatis, vel linearibus, petiolatis, summis sessilibus, floribus magnis, pedicellis calyce basi bisaccato subaequantibus suffultis, siliquis stricte patentibus, pube adpressissima canescentibus, lateraliter compressis, stylo siliquae latitudine aequilongo vel breviore, stigmate retuso vel bilobo. Floret Februario, habitat in arenosis insulae Oxia Acarnaniae.

Sisymbrium orientale L. Amoen. IV, p. 322 et herb. In olivetis ad Athenas Atticae.

Lunaria biennis Moench Meth. 261. Montes Warossa apud Kryoneri Acarnaniae.

Capsella grandiflora Bory et Chaub. Fl. Pelop. Nr. 1047, tab. 38 sub Thlaspide. Missolunghi in Acarnania.

Aethionema graecum Boiss. et Spr. Diag. Ser. I, VI p. 16. In montosis calcareis ad Tripolin in Arkadia.

Erucaria aleppica Gaertn. Carp. II, p. 298, tab. 143. fig. 9, Attica ad Phalerum.

Eruca sativa Lam. Fl. Fr. II, p. 496. In olivetis ad Athenas Atticae.

Calepina Corvini All. Ped. Nr. 937 sub Crambe. Missolunghi in Acarnania.

Reseda alba L. Sp. pl. 645. Attica ad Callitheam.

Polygala Nicaeensis Risso ex Koch Syn. p. 98 β. tomentella Boiss. Flor. or. 475. In saxosis m. Pentelici Atticae (Hskn.!).

Frankenia hirsuta L. Sp. pl. 474. Var. hispida Boiss. Fl. or. I. 780. Attica ad Phalerum (Hskn. 1893!).

Cerastium tomentosum L. Sp. pl. 629. Caeumine m. Pentelici Atticae (Hskn. 1893!).

Alsine attica Boiss. et Sprun. Diagn. Ser. I, V, p. 84. M. Pentelico Atticae (Sprun., Boiss., Heldr.!).

Silene cucubalus Wib. Prim. Fl. Werth. 241 = S. inflata Sm. Fl. Brit. II. 292. Attica ad Callitheam.

S. Pentelica Boiss. Diagn. Ser. I, VIII, p. 74. Ad radices m. Pentelici Atticae (Sprun., Boiss., Heldr., Sartor.!) et in reg. superiore ejusdem montis.

S. colorata Poir. voy. 163. Attica ad Phalerum.

S. attica Form. 1897. Hermaphrodita. Caulibus erectis vel adscendentibus, elatis 50—60 cm altis, inferne cano puberulis teretibus, superne glabris, paulo viscidulis, angulato subsulcatis, a medio opposite ramosis, ramis patulis, longis, inferioribus alternatim dichotomis, superioribus dichotomis, inflorescentiam amplam, cymoso-paniculatam formantibus, foliis cano puberulis acutis, inferioribus magnis, rosulatim congestis et ut mediis oblonge-ovatis, in petiolum canaliculatum, alatum sensim angustatis, superioribus ovato-lanceolatis vel lanceolatis sessilibus, ab inferioribus ad superiora sensim diminutis, bracteis ovato-lanceolatis, basi connatis, margine scarioso ± ciliolatis, calyce a basi umbilicata campanulato-cylindrico, demum ventricoso, glabro, viridi-vitato, dentibus ovatis obtusis ciliolatis, lamina ad unques hirta, ochroleuca, ad $\frac{2}{3}$ usque bifida, lobis oblonge lanceolatis obtusis, corona laciniis ovatis, obtusis, staminibus stylisque longe exsertis, inferne hirtis, capsula rotundato-ovata carpophoro subduplo longiore. Seminibus ad facies interdum excavatis, rugosotuberculatis fuscis. Habitat ad Callitheam inter Athenas et Phalerum Atticae.

Ex affinitate S. otitis L. Sp. pl. 594 sub Cucubalo a qua differt pube minuta, caulis valde et ample ramosis, foliorum et bractearum forma, floribus et capsulis magnis, calyce, carpophoro longiore etc.

A. S. densiflora Urv. Enum. p. 47 differt indumento, foliorum forma, inflorescentia, floribus majoribus, valde disitis, bracteis

sat magnis ovato-lanceolatis, carpophoro longiore seminibusque; ab ambis hermaphroditate.

Saponaria vaccaria L. Sp. 583; Vaccaria parviflora Moench. Ad Callitheatum Atticae.

Dianthus pubescens Sibth. et Sm. Fl. Gr. IV, p. 86, tab. 397 M. Pentelico Atticae (Auch) et cacumen ejusdem montis.

Hypericum empetrifolium Willd. Sp. III, p. 1452. M. Pentelico Atticae.

Echinophora Sibthorpiana Guss. Suppl. p. 69. Ad litora maritima ad Phalerum Atticae.

Sedum Sartorianum Boiss. Diagn. Ser. II, 2. p. 62 p. var. S. acri. M. Pentelico Atticae (Hskn. 1893!).

Genista acanthoclada DC. Prodr. 11, 146, Var. pentelica Form. 1897. Foliis oblonge spathulato-lanceolatis vel linearibus breviter petiolatis, adpresso sericeo-puberulis, vexillo et carina extus glabris. Habitat m. Pentelico Atticae.

Ononis breviflora DC. Prod. II, p. 160. M. Pentelico Atticae.

O. columnae All. Ped. I, p. 318, tab. 20, fig. 3. In herbidis m. Pentelici Atticae (Hskn. 1893!).

Dorycnium herbaceum Jord. Observ. III, 65. t. 4, f. C.; Greml. Neue Beitr. V, 13 = D. sabaudum Rchb. Fl. Germ. Exs. Nr. 649. M. Pentelico Atticae (Hskn. 1893!).

Orobus hirsutus L. Sp. pl. 1027. M. Pentelico Atticae.

Eine unbekannte Flora von Hamburg.

Von Franz Fischer-Hamburg.

Immer mehr drängt sich den Hamburger Botanikern die Erkenntnis auf, dass die Flora der Heimat noch keineswegs als gut durchforscht gelten kann. Die eifrige Thätigkeit, die der junge Botanische Verein zu Hamburg seit seinem Bestehen entfaltet, hat eine Reihe von beachtenswerten, ja überraschenden Ergebnissen gezeigt, welche geeignet scheinen, die nicht bestätigten und oft angezweifelten Standortsangaben älterer Hamburger Botaniker, speziell **Hübener**, in verändertem Lichte erscheinen zu lassen. Nicht als ob die Angaben des genannten Botanikers bereits in beträchtlichem Umfange bestätigt worden wären, aber dieselben haben vielfach den Charakter der Unwahrscheinlichkeit verloren, den man ihnen seiner Zeit beilegte.

Für die Phanerogamen kam bis jetzt allein Hübener's »Flora der Umgegend von Hamburg« aus dem Jahre 1846 in Betracht. Dieses Buch war in erster Linie bestimmt, eine allgemeine Übersicht über die heimische Pflanzenwelt zu geben; in »beschaulicher Weise« will der Verfasser über alles das aufklären, was dem Jünger der Botanik bei seinen Wanderungen auffällt. Dieser Absicht hat er im Vorbericht ergreifenden Ausdruck verliehen. »Ich kannte in dieser Hinsicht ganz mein Publikum, wusste, auf welcher Stufe in der Vaterstadt die Botanik im allgemeinen steht, wie hier bei so viel regem Sinn, der in allen Ständen und Gewerben für das Pflanzenreich herrscht, die Wissenschaft einzeln von Männern gehandhabt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Formanek Eduard

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Griechenland. 77-81](#)