

Mit dem besten Danke an Herrn Prof. Dr. Stenzel für den zur richtigen Erklärung führenden Wink und die Angabe der betr. Litteratur schliesse ich diese Mitteilung in der Hoffnung, dass sie Anlass geben möge, nach solchen Abnormitäten mehr zu suchen. Denn ich bin der festen Ueberzeugung, dass sie viel häufiger vorkommen, als es bis jetzt scheint, aber sie werden meist nicht gefunden oder übersehen.

## Mykologische Beiträge zur Flora des Harzes.

Von W. J. Goverts

Mitglied des botanischen Vereins in Hamburg.

- Peziza acetabulum* L. Beim Soesepavillon an Tannen: 30. 6. 1890.
- P. aurantia* Oeder. Chaussée nach Riefensbeck: 16. 7. 1890.
- ‡<sup>1)</sup> *Tubercularia granulata* Pers. Frauenstein: 10. 11. 90.
- Amanita pantherina* DC. (*Agaricus pantherinus* DC.). Auf Wiesen in der Nähe von Nadelwäldern des Sonnenkopfes: 23. 6. 90.
- A. rubescens* Fr. (*Agaricus rubescens* Pers.). Unter Tannen der Degenköpfe: 26. 6. 90.
- A. vaginata* Bull. (*Agaricus plumbeus* Schaef., *hyalinus* Schaef., *baldius* Schaef.). Unter Tannen des Scherenberger Kopfes: 30. 6. 90.
- A. phalloides* Bull. Am Rande des Waldweges vom Roten Haus zum Scherenberg: 27. 6. 90.
- NB. Ausser diesen 4 Arten ist auch *A. caesarea* Kl. (*Agaricus caesareus* Scop.) oberhalb Lerbachs auf den Bergen rechts von dieser Ortschaft, Weg nach Riefensbeck, in einem noch unentwickelten Exemplare entdeckt worden, während *A. muscaria* Pers. um Osterode zu fehlen scheint.
- Omphalia campanella* Batsch. Gemein unter Tannen auf abgefallenen Tannennadeln, z. B. Soesepavillon, Scherenberg oberhalb der Bleiweissfabrik. 19. 6. 90.
- O. fibula* Bull. (*Agaricus fibulus* Fr.). Seltener als vorige Art. An Baumstümpfen zwischen Moos auf dem zweiten Wege von Clausthal, welcher nach der Flambacher Mühle führt: 28. 6. 90.
- Clitocybe metachroa* Fr. (*Agaricus metachrous* Fr.). Zwischen Moos in Nadelwaldungen beim Soesepavillon nach heftigem Regen: 18. 6. 90.
- C. fumosa* Pers. Zwischen Gras auf Wiesen des Butterberges oberhalb des Dorfes Freiheit: 26. 6. 90.
- Tricholoma gambosum* Fr. (*Agaricus gambosus* Fr., non *A. pomonae* Lenz). Zwischen Steinen und Moos, an der rechten Ufermauer der Soese, wenn man vom Bahnhof kommt. Nach Regenfall gesammelt: 18. 6. 90.
- ‡ *T. personatum* Fr. u. *T. albellum*. Liedberg; 14. 9. 90.
- Collybia radicata* Rehm (*Agaricus radicatus* Fr.). Zwischen Rasen in der Bahnhofsanlage von Osterode: 7. 6. 90.

<sup>1)</sup> Die mit einem ‡ versehenen Pilze sind die am Scharzfeld gesammelten, die übrigen habe ich in und bei Osterode gefunden.

- Amillaria mellea* Vahl (*Agaricus melleus* Fr.). An einem Tannenstumpfe der Berge rechts, oberhalb Lerbachs, in der Nähe von Körnicke's Ecke am Weg nach Riefensbeck: 16. 7. 90.
- Galera tenera* Schäf. (*Agaricus tener* Fr.). Zwischen Gras auf dem Wege nach Petershütte: 16. 6. 90.
- G. hypnorum* Batsch (*Agaricus hypnorum* Fr.). Rasenförmig zwischen Moos unter Linden in der Bahnhofsanlage auf Grasplätzen: 23. 6. 90.
- Naucoria furfuracea* Fr. (*Agaricus furfuraceus* Fr.). Häufig auf Wiesen in der Nähe des Teufelsloches: 5. 7. 90.
- N. escharoides* Fr. (*Agaricus escharoides* Fr.) In Nadelwäldern an der grossen Söse: 18. 6. 90.
- Pholiota praecox* Pers. (*Agaricus praecox* Fr.). Auf Wiesen des Sonnenkopfes: 22. 6. 90.
- Ph. campestris* L. (*Agaricus campestris* Fr.) var. *alba* Berk. Zwischen Gras eines Tannengebüsches in der Bahnhofsanlage von Osterode: 6. 7. 90.
- NB. Dort wurde vom Verf. ein Ex. gefunden, dessen Hut 20 cm im Durchmesser hatte.
- † *Hypholoma sublateritius* Schaef. Oberhalb der Schandenburg auf Baumstrünken: 20. 9. 90.
- Lactarius rufus* Scop. (*Agaricus rufus* Fr.). Unter Moos in Tannenwäldungen der Degenköpfe innerhalb des Gatters, Weg nach Riefensbeck: 26. 6. 90.
- † *L. piperatus* Fr.
- Russula adusta* Pers. (*Agaricus adustus* Fr.). In der Nähe des Butterberges oberhalb des Dorfes Freiheit: 26. 6. 90.
- Cantharellus cibarius* Fr. (*Agaricus cantharellus* L., *Merulius cantharellus* Pers.). Gemein, meist in Kreisen unter Tannen der Nadelwälder der Degenköpfe, nicht weit vom Steinbruch des Scherenberges usw.
- C. aurantiacus* Fr. Bremkethal bei Osterode.
- Hygrophorus puniceus* Fr. (*Agaricus puniceus* Fr.). Häufig auf Wiesen des Sonnenkopfes, Degenköpfe: 26. 6. 90.
- (Schluss folgt).

## Referat über Poeverlein Herm.: Die bayerischen Arten, Formen u. Bastarde der Gattung *Potentilla*.

Von E. K. Blümmel in Wien.

(Fortsetzung von Seite 62 d. Jahrg.).

Besonders bemerkenswert sind die Ausführungen bei der VI. Rotte (*Quinquefolium* Focke), die aus den *Palmatisectae* Zimm. und *P. multifida* Zimm. besteht. „Man sollte“, wie Poeverlein sagt, „erwarten, dass durch Bastardierung der *P. multifida* mit einer Form der *Palmatisectae* eine Pflanze entstände, deren Blattabschnitte zwar nicht an einer Stelle entspringen wie bei den *Palmatisectae*, aber doch nicht so weit voneinander gerückt erscheinen wie bei *P. multifida*, also ein zwischen dem gefingerten und gefiederten die Mitte haltendes Blatt, statt dessen tragen aber die Bastarde Blätter, die aus dem gefingerten und gefiederten Blatt zusammengesetzt erscheinen, indem jedes einzelne Blättchen des gefingerten Blattes mehr oder minder fiederteilig ist, sodass die Vermutung nahe liegt, dass das ganze Blatt der *P. multifida* morphologisch einem

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Goverts Wilhelm J.

Artikel/Article: [Mykologische Beiträge zur Flora des Harzes. 122-123](#)