© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

dagegen fast immer Helianthemum, Pulsatilla, Genista, Teucrium Chamaedrys, Veronica Teucrium. Gräser sind in allen Brometen vorhanden, aber gegen Bromus erectus und die genannten Stauden verschwinden sie fast ganz.

Eigentliche Wiesen, also Grasbestände, die geschnitten und künstlich bewässert werden, sind in dem trockenen Kaiserstuhl sehr selten. Sie unterscheiden sich kaum von den Wiesen der Rheinebene und haben für die vorliegende Betrachtung ein geringes Interesse, da sie unter natürlichen Bedingungen schwerlich entstanden wären.

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

VIII.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

3. Stück.

(Forts. von S. 9 d. Jahrg.).

993. Eupatorium cannabinum L. Appel bei Sulzbürg.
998. Petasites officinalis Mnch. Eibach, Reichelsdorf, Kl. Heilsbronn, Neuendettelsau, Gnadenberg.
1011. Stenactis annua Nees. Zw. Vach und Obermichelbach, Kl. Heilsbronn, Hutberg bei Fischbach.
1057. Helichrysum arenarium DC. Neumarkt i. O.
1065. Artemisia campestris L. Neumarkt i. O.
N. 1089. Tanacetum Balsamita L. Zw. Schwarzen Brand und Oberklausen gartenflüchtig (O. Pr.).
1108. Senecio spathulifolius DC. Bei Sontheim (O. Pr.).
1140. Cirsium bulbosum DC. Urfersheim (O. Pr.).
1169. Centaurea montana L. Zw. Oberdachstetten u. Mkt. Bergel, bei Sontheim.
1186. Leontodon incanus Schrk. Leitenberg.
1188. Helminthia echioides Gärtn. Illersheim bei Windsheim (Frau Doris Prechtelsbauer).
1193. Scorzonera humilis L. Zw. Nuschelberg und Lauf (Sch.).
1205. Chondrilla juncea L. Schönberg (rhätischer Keuper), Igensdorf bei Gräfenberg (brauner Jura).
1226. Crepis praemorsa Tsch. Appel bei Sulzbürg.
1302. Phyteuma spicatum L. var. coerulescens Gremli. Pommelsbrunn (Mdl.).
1302 b. Phyteuma nigrum Schmidt. Schlosspark Thurn bei Forchheim.
1311. Campanula Rapunculus L. Büchenbach.
1315. Campanula glomerata L. Zw. Buch und Tennenlohe.
1326. Vaccinium Oxycoccos L. Dürrenhembach.
1340. Pirola chlorantha Sw. Leitenberg, Arzlohe bei Pommelsbrunn.
1344. Pirola uniflora L. Hinterhof bei Maiach, zw. Hormersdorf u. Riegelstein, von Rupprechtstein über Buchhof bis Mittelrheinbach an mehreren Stellen. Zant.
1354. Menyanthes trifoliata L. Zw. Hemhofen und Thurn.
1368. Gentiana verna L. Eckersmühlen bei Roth (Hg.), Urfersheim, zw. Schlüp- und Petersberg (O. Pr.), Weihersdorf b. Sulzbürg (Mdl.), Eichelberg bei Roth auf Zanclodonletten mit gegabeltem Stengel (Hg.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1379 b. Phacelia tanacetifolia Benth. Beim Zellengefängnis Nürnberg.
1381. Collomia grandiflora Dougl. Herrenhütte (adv.).
1394. Cynoglossum officinale L. Vorra. Zwisch. Westheim und Sontheim.
1414. Lithospermum officinale L. Stein (O. Pr.).
1424. Digitalis ambigua Murr. Bei Schönberg auf rhätischem Keuper (Sch.).
1431. Physalis Alkekengi L. Oberhalb Eschenbach bei Hersbruck (Semler), zw. Pommelsbrunn und Hartmannshof (Mdl.).
1441×1445. Verbascum thapsiforme × Lychnitis Schiede. Bei Stein (Kfm.).
1446×1441. Verbascum nigrum × thapsiforme Wirtg. Bei Stein (Kfm.).
1457. Linaria Cymbalaria Mill. Gartenmauer in Strahlenfels (Kfm.), Gräfenberg (Riedner).
1462. Linaria arvensis Desf. Zw. Fürth und Unterfürberg auf sandigen Äckern (Riedner).
1476 b. Veronica scutellata L. var. pubescens Koch. Unterbürg, unter der typischen Form (Semler), zwischen Eibach und Hinterhof (O. Pr.).
1478. Veronica Beccabunga L. f. minor Koch. Graben bei Speikern.
1480. Veronica Chamaedrys L. f. pilosa Schmidt. Im Gebiet nicht selten, z. B. Rottenberg, Speikern, Lauf, Büchenbach, Ziegelstein, Heidenberg, Schmausenbuck u. a. (Semler).
1486. Veronica Teucrium L. Zwischen Vach und Obermichelbach, Rossstall, Unterbürg.
1497. Veronica verna L. Grossreuth b. Schweinau (O. Pr.), Leyh (Hg.), Erlenstegen (Semler).
1497 b. Veronica Dillenii Crtz. Marienberg, Gibitzenhof b. Nürnberg, Speikern bei Lauf.
1500. Veronica Tournefortii Gmel. Grossreuth b. V., Spitalhof, Mögeldorf, Dutzendteich (im mittl. Keuper).
f. brachypoda Wiesb. Unter der typischen Form nicht selten, bei Lauf z. B. sehr zahlreich.
1502. Veronica polita Fries. f. autumnalis Lange. Eschenbach bei Hersbruck im braunen Jura (Semler).
1503. Veronica opaca Fries. Auf Dogger: Michelsberg, Hohenstadt u. Eschenbach b. Hersbruck (Semler).
1504. Veronica hederifolia L. f. praestabilis G. Beck. Standortsform von Marienberg bei Nürnberg.
1529. Odontites serotina Lamarck. In der Umgebung von Westheim (unt. Keuper) häufig, Hohenstadt im Jura (O.Pr.): fl. albo: Am Fuss des Petersbergs bei Westheim (Frau Doris Prechtelsbauer).
1532. Lathraea Squamaria L. Auf rhätischem Keuper: Prackenfels bei Altdorf.
1540. Orobanche rubens Wallr. Zwischen St. Helena und Winterstein vielfach, zwisch. Winterstein u. Oberndorf einzeln. var. pallens A. Br. Zw. St. Helena u. Winterstein (Kfm.).
1566. Salvia officinalis L. Abhang des Burgbergs bei Eschenfelden (O. Pr.).
1570. Salvia pratensis L. v. parviflora Willk. Windmühle bei Erlangen (O. Pr.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1585. Nepeta Cataria L. Ruine Wolfstein b. Neumarkt i. O. (Sch.).
1596. Lamium maculatum L. Bei Ochenbruck im Keuper.
1605. Stachys germanica L. Ruine Wolfstein bei Neumarkt (Sch.).
1618. Leonurus Cardiaca L. Zollhaus bei Wendelstein, Schönberg bei Lauf.
1627. Ajuga genevensis L. Süsswasserkalk bei Roth (Hg.).
1631. Teucrium Botrys L. Ruine Wolfstein bei Neumarkt i. O. (Sch.).

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Flora Anhaltina.

VIII.

Von Hermann Zschacke.

Abkürzungen:

A. = Aken.
Asch. = Aschersleben.
Ba. = Ballenstedt.
Be. = Bernburg.
Ca. = Calbe.
C. = Cöthen.
Cö. = Cönnern.
De. = Dessau.
Z. = Zerbst.

Cystopteris fragilis. Be. Frecklebener Büsche.

Aspidium dryopteris. Ba. Fichtenwald Heinrichsburg-Sternhaus.

Aspidium thelypteris. De. Erlenmoor bei Törten. Z. An Gräben im Butterdamm.

Aspidium filix mas. Be. Langes Holz bei Freckleben. Cö. Gerillgrund bei Dobis.

Aspidium spinulosum. De. Kümmerling bei Törten.

Asplenum trichomanes. Ba. Felsen im Selkethal. Cö. Gerillgrund bei Dobis, hier auch Asplenum septentrionale.

Asplenum septentrionale. Ba. Habichtsstein bei Alexisbad; Felsen zwischen Alexisbad, Mägdesprung und Scherenstieg.

Asplenum ruta muraria. De. Wörlitzer Park.

Polypodium vulgare. Ba. Im Unterharze häufig; De. Rösling bei Mosigkau; Wörlitzer Park.

Botrychium lunaria. Be. Hang des Hohlweges hinter der Abdeckerei an der Fuhne; hier auch die Form B. l. subincisum.

Salvinia natans. De. Pöplitzer Teich.

Lycopodium clavatum. Ba. Victorshöhe; A. Chörauer Moorwiesen.

Potamogeton prolixus des vorigen Berichtes ist nach Dr. P. Gräbner P. fluitans.

Helodea canadensis. Be. Im Wippergebiet: Ausstiche oberhalb Freckleben.

Melica nutans. C. Diebziger Busch.

Sclerochloa dura. Cö. Amt Rothenburg-Dobis.

Cladium mariscus. C. Alte Torfstiche der Fuhnewiesen zwischen Zehmitz und Löberitz.

Scirpus pauciflorus. C. Ebenda.

Scirpus silvaticus. A. Chörauer Moorwiesen.

Carex Ligerica. De. Sandfeld bei Mosigkau.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche botanische Monatsschrift

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. 21-23