

dagegen fast immer *Helianthemum*, *Pulsatilla*, *Genista*, *Teucrium*, *Chamaedrys*, *Veronica*, *Teucrium*. Gräser sind in allen Brometen vorhanden, aber gegen *Bromus erectus* und die genannten Stauden verschwinden sie fast ganz.

Eigentliche Wiesen, also Grasbestände, die geschnitten und künstlich bewässert werden, sind in dem trockenen Kaiserstuhl sehr selten. Sie unterscheiden sich kaum von den Wiesen der Rheinebene und haben für die vorliegende Betrachtung ein geringes Interesse, da sie unter natürlichen Bedingungen schwerlich entstanden wären.

## Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

### VIII.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

3. Stück.

(Forts. von S. 9 d. Jahrg.).

993. *Eupatorium cannabinum* L. Appel bei Sulzbürg.  
 998. *Petasites officinalis* Mch. Eibach, Reichelsdorf, Kl. Heilsbronn, Neundettelsau, Gnadenberg.  
 1011. *Stenactis annua* Nees. Zw. Vach und Obermichelbach, Kl. Heilsbronn, Hutberg bei Fischbach.  
 1057. *Helichrysum arenarium* DC. Neumarkt i. O.  
 1065. *Artemisia campestris* L. Neumarkt i. O.  
 N. 1089. *Tanacetum Balsamita* L. Zw. Schwarzen Brand und Oberklausen gartenflüchtig (O. Pr.).  
 1108. *Senecio spathulifolius* DC. Bei Sontheim (O. Pr.).  
 1140. *Cirsium bulbosum* DC. Urfersheim (O. Pr.).  
 1169. *Centaurea montana* L. Zw. Oberdachstetten u. Mkt. Bergel, bei Sontheim.  
 1186. *Leontodon incanus* Schrk. Leitenberg.  
 1188. *Helminthia echioides* Gärtn. Illersheim bei Windsheim (Frau Doris Prechtelsbauer).  
 1193. *Scorzonera humilis* L. Zw. Nuschelberg und Lauf (Sch.).  
 1205. *Chondrilla juncea* L. Schönberg (rhätischer Keuper), Igensdorf bei Gräfenberg (brauner Jura).  
 1226. *Crepis praemorsa* Tsch. Appel bei Sulzbürg.  
 1302. *Phyteuma spicatum* L. var. *coerulescens* Greml. Pommelsbrunn (Mdl.).  
 1302 b. *Phyteuma nigrum* Schmidt. Schlosspark Thurn bei Forchheim.  
 1311. *Campanula Rapunculus* L. Büchenbach.  
 1315. *Campanula glomerata* L. Zw. Buch und Tennenlohe.  
 1326. *Vaccinium Oxycoccus* L. Dürrenhembach.  
 1340. *Pirola chlorantha* Sw. Leitenberg, Arzlohe bei Pommelsbrunn.  
 1344. *Pirola uniflora* L. Hinterhof bei Maiach, zw. Hormersdorf u. Riegelstein, von Rupprechtstein über Buchhof bis Mittelrheinbach an mehreren Stellen. Zant.  
 1354. *Menyanthes trifoliata* L. Zw. Hemhofen und Thurn.  
 1368. *Gentiana verna* L. Eckersmühlen bei Roth (Hg.), Urfersheim, zw. Schlüp- und Petersberg (O. Pr.), Weiherndorf b. Sulzbürg (Mdl.), Eichelberg bei Roth auf Zanclodonletten mit gegabeltem Stengel (Hg.).

- 1379 b. *Phacelia tanacetifolia* Benth. Beim Zellengefängnis Nürnberg.
1381. *Collomia grandiflora* Dougl. Herrenhütte (adv.).
1394. *Cynoglossum officinale* L. Vorra. Zwisch. Westheim und Sontheim.
1414. *Lithospermum officinale* L. Stein (O. Pr.).
1424. *Digitalis ambigua* Murr. Bei Schönberg auf rhätischem Keuper (Sch.).
1431. *Physalis Alkekengi* L. Oberhalb Eschenbach bei Hersbruck (Semler), zw. Pommelsbrunn und Hartmannshof (Mdl.).
- 1441×1445. *Verbascum thapsiforme* × *Lychnitis* Schiede. Bei Stein (Kfm.).
- 1446×1441. *Verbascum nigrum* × *thapsiforme* Wirtg. Bei Stein (Kfm.).
1457. *Linaria Cymbalaria* Mill. Gartenmauer in Strahlenfels (Kfm.), Gräfenberg (Riedner).
1462. *Linaria arvensis* Desf. Zw. Fürth und Unterfürberg auf sandigen Äckern (Riedner).
- 1476 b. *Veronica scutellata* L. var. *pubescens* Koch. Unterbürg, unter der typischen Form (Semler); zwischen Eibach und Hinterhof (O. Pr.).
1478. *Veronica Beccabunga* L. f. *minor* Koch. Graben bei Speikern.
1480. *Veronica Chamaedrys* L. f. *pilosa* Schmidt. Im Gebiet nicht selten, z. B. Rottenberg, Speikern, Lauf, Büchenbach, Ziegelstein, Heidenberg, Schmausenbuck u. a. (Semler).
1486. *Veronica Teucrium* L. Zwischen Vach und Obermichelbach, Rossstall, Unterbürg.
1497. *Veronica verna* L. Grossreuth b. Schweinau (O. Pr.), Leyh (Hg.), Erlenstegen (Semler).
- 1497 b. *Veronica Dillenii* Crtz. Marienberg, Gibitzenhof b. Nürnberg, Speikern bei Lauf.
1500. *Veronica Tournefortii* Gmel. Grossreuth h. V. Spitalhof, Mögeldorf, Dutzendteich (im mittl. Keuper). f. *brachypoda* Wiesb. Unter der typischen Form nicht selten, bei Lauf z. B. sehr zahlreich.
1502. *Veronica polita* Fries. f. *autumnalis* Lange. Eschenbach bei Hersbruck im braunen Jura (Semler).
1503. *Veronica opaca* Fries. Auf Dogger: Michelsberg, Hohenstadt u. Eschenbach b. Hersbruck (Semler).
1504. *Veronica hederifolia* L. f. *praestabilis* G. Beck. Standortsform von Marienberg bei Nürnberg.
1529. *Odontites serotina* Lamarck. In der Umgebung von Westheim (unt. Keuper) häufig, Hohenstadt im Jura (O. Pr.): fl. albo: Am Fuss des Petersbergs bei Westheim (Frau Doris Prechtelsbauer).
1532. *Lathraea Squamaria* L. Auf rhätischem Keuper: Prackenfels bei Altdorf.
1540. *Orobanche rubens* Wallr. Zwischen St. Helena und Winterstein vielfach, zwisch. Winterstein u. Oberndorf einzeln. var. *pallens* A. Br. Zw. St. Helena u. Winterstein (Kfm.).
1566. *Salvia officinalis* L. Abhang des Burgbergs bei Eschenfelden (O. Pr.).
1570. *Salvia pratensis* L. v. *parviflora* Willk. Windmühle bei Erlangen (O. Pr.).

1585. *Nepeta Cataria* L. Ruine Wolfstein b. Neumarkt i. O. (Sch.).  
 1596. *Lamium maculatum* L. Bei Ochenbruck im Kenper.  
 1605. *Stachys germanica* L. Ruine Wolfstein bei Neumarkt (Sch.).  
 1618. *Leonurus Cardiaca* L. Zollhaus bei Wendelstein, Schönberg bei Lauf.  
 1627. *Ajuga genevensis* L. Süßwasserkalk bei Roth (Hg.).  
 1631. *Teucrium Botrys* L. Ruine Wolfstein bei Neumarkt i. O. (Sch.).

(Fortsetzung folgt).

## Beiträge zur Flora Anhaltina.

VIII.

Von Hermann Zschacke.

Abkürzungen:

A. = Aken.	C. = Cöthen.
Asch. = Aschersleben.	Cö. = Cönnern.
Ba. = Ballenstedt.	De. = Dessau.
Be. = Bernburg.	Z. = Zerbst.
Ca. = Calbe.	

*Cystopteris fragilis*. Be. Frecklebener Büsche.

*Aspidium dryopteris*. Ba. Fichtenwald Heinrichsburg-Sternhaus.

*Aspidium thelypteris*. De. Erlenmoor bei Törten. Z. An Gräben im Butterdamm.

*Aspidium filix mas*. Be. Langes Holz bei Freckleben.  
 Cö. Gerillgrund bei Dobis.

*Aspidium spinulosum*. De. Kümmerling bei Törten.

*Asplenium trichomanes*. Ba. Felsen im Selkethal.

Cö. Gerillgrund bei Dobis. hier auch *Asplenium septentrionale*.

*Asplenium septentrionale*. Ba. Habichtsstein bei Alexisbad; Felsen zwischen Alexisbad, Mägdesprung und Scherenstieg.

*Asplenium ruta muraria*. De. Wörlitzer Park.

*Polypodium vulgare*. Ba. Im Unterharze häufig; De. Rösling bei Mosigkau; Wörlitzer Park.

*Botrychium lunaria*. Be. Hang des Hohlweges hinter der Abdeckerei an der Fuhne; hier auch die Form *B. l. subincisum*.

*Salvinia natans*. De. Pöplitzer Teich.

*Lycopodium clavatum*. Ba. Victorshöhe; A. Chörauer Moorwiesen.

*Potamogeton prolixus* des vorigen Berichtes ist nach Dr. P. Gräbner *P. fluitans*.

*Helodea canadensis*. Be. Im Wippergebiet; Ausstiche oberhalb Freckleben.

*Melica nutans*. C. Diebziger Busch

*Sclerochloa dura*. Cö. Amt Rothenburg-Dobis.

*Cladium mariscus*. C. Alte Torfstiche der Fuhnewiesen zwischen Zehmitz und Löberitz.

*Scirpus pauciflorus*. C. Ebenda.

*Scirpus silvaticus*. A. Chörauer Moorwiesen.

*Carex Ligerica*. De. Sandfeld bei Mosigkau.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. 21-23](#)