

Exkursionsbericht aus dem Gebiete der Saale bis zum Loquitzthale.

Von Wiefel.

Schluss.

- Sanicula europaea* L. zwischen Eyba und Reschwitz.
Bupleurum falcatum L. bei Fischersdorf, Obernitz und Reschwitz.
B. rotundifolium L. am roten Berge im Getreide.
Libanotis montana Crntz. am Bohlen bei Obernitz, Bergabhänge bei Fischersdorf und bei der neuen Mühle.
Meum athamanticum Jacq. Eyba, Karlshaus.
Laserpitium latifolium L. Wäldchen bei der neuen Mühle und bei Reschwitz.
— *prutenicum* L. auf Wiesen bei Kaulsdorf, Reschwitz, Obernitz.
Turgenia latifolia Hoffm. selten auf dem roten Berge.
Sambucus racemosa L. Waldungen zwischen Laasen, Eyba, Reschwitz, Eichicht; häufig.
Viburnum lantana L. Kaulsdorf, Fischersdorf, Reschwitz.
Asperula glauca Bess. an felsigen, steinigen Bergwänden bei Kaulsdorf und Fischersdorf.
— *odorata* L. nur angepflanzt (bei Eyba).
Galium tricorne With. roter Berg.
— *parisiense* L. hinter Tauschwitz am roten Berge (var. *anglicum* Huds.)
— *saxatile* L. Eyba, Hoheneiche, Wickersdorf.
Aster alpinus L. Früher häufig am Bohlen bei Obernitz; jetzt durch den Eisenbahnbau und räuberische Sammler fast ausgerottet, nur auf einer unzugänglichen Felsplatte noch, im Mai durch ihre Blüten sich verratend. Einen zweiten Standort möchte ich, um der Existenz der Pflanze willen, verschweigen.
Aster amellus L. Bergwand bei der neuen Mühle.
Pulicaria vulgaris Gärtner. von Kaulsdorf bis Saalfeld auf Flusskies.
Madia sativa Mol. wurde von mir in den 60er Jahren vereinzelt bei Unterwellenborn (unweit Saalfeld) gefunden. Wie sich später herausstellte, wurde die Pflanze damals als „Ölkraut“ gebaut; ob jetzt?
Helichrysum arenarium DC. am Abhänge des Eichichter Schlossberges selten.
Matricaria chamomilla L. ist selten, bei Ober- und Unterwellenborn (Sandboden).
Tanacetum vulgare L. am Saalufer häufig.
T. parthenium Schultz bip. Unterloquitz, Eyba.
Arnica montana L. Eyba, Karlshaus, Hoheneiche.
Cirsium heterophyllum All. Spärlich im Gistrathale bei Eyba.
Tragopogon major Jacq. in den Kaulsdorfer Weinbergen.
Podospermum laciniatum DC. forma *muricat.* zerstreut über den roten Berg.
Chondrilla juncea L. Zwischen Kaulsdorf, Tauschwitz und Fischersdorf.
Lactuca scariola L. Saalfeld, Reschwitz, Fischersdorf, Eichicht.
L. saligna L. am roten Berge, in den Kaulsdorfer und Tauschwitzer Weinbergen.
Crepis foetida L. zwischen Obernitz und Kaulsdorf.
Hieracium praealtum Vill. am häufigsten bei Kaulsdorf, übrigens bis Saalfeld.
H. pratense Tausch. vereinzelt bei Reschwitz und Obernitz.

- H. Schmidtii Tausch. bei Eichicht und am roten Berge bei Kaulsdorf.
- Phyteuma orbiculare L. bei Eyba, Reschwitz (überall nicht häufig).
- Menyanthes trifoliata L. Zwischen Eyba und Reschwitz in Wiesengräben.
- Gentiana amarella L. forma germanica Willd. Rotenbachsanger bei Eyba; Arnsgereuth.
- G. ciliata L. an denselben. Orten, seltener.
- Cynoglossum officinale L. am roten Berge.
- Nonnea pulla DC. 1880 am 8. Juni am roten Berge, in der Nähe des Gleitsch aufgefunden. (Blüten im Abfallen).
- Physalis alkekengi L. In Weinbergen zwischen Tauschwitz und Fischersdorf.
- Linaria elatine Mill. bei Weischwitz auf Äckern und Steinrütschen.
- Orobanche epithymum DC. 1862 am Bohlen bei Obernitz einige Exemplare auf Thymus serpyll. und einige auf Sesleria coerulea gefunden; neuerlich nicht wieder.
- Lavandula officinalis Chaix. verwildert auf dem Heiligenberge bei Reschwitz.
- Salvia verticillata L. bei Kaulsdorf und vereinzelt am Gleitsch.
- Nepeta cataria L. an Wegen und Zäunen bei Kaulsdorf.
- Galeopsis pubescens Bess. Eyba, Lositz.
- Stachys germanica L. bei Saalfeld am Eybaer Wege.
- St. recta L. bei Obernitz, Fischersdorf, Kaulsdorf und Eichicht.
- St. annua L. am roten Berge.
- Marrubium vulgare L. bei Saalfeld.
- Ajuga chamaepitys Schreb. Felder auf dem roten Berge.
- Teucrium chamaedrys L. Bergplatte hinter der neuen Mühle, Strassenrand der Oberneritz-Fischersdorfer Strasse, Wutsche (Hutsche) bei Kaulsdorf.
- Chenopodium urbicum L. von Oberneritz bis Kaulsdorf an Dorfstrassen, Düngergräben etc.
- Ch. vulvaria L. Reschwitz und Fischersdorf.
- Blitum virgatum L. zwischen Köditz und Oberneritz 1872 am Bahndamm gefunden; jetzt fehlend.
- Daphne mezereum L. bei der Grenzeiche, bei Reschwitz, zwischen Weischw. u. Laasen.
- Thesium pratense Ehrh. zwischen Eyba und Hühnerschenke, Karlshaus und Hoheneiche auf Wiesen.
- Aristolochia clematitis L. bei Kaulsdorf und Breternitz.
- Tithymalus platyphyllos Scop. Im Dorfe Oberneritz und auf den benachb. Feldern.
- Parietaria officinalis L. am Bohlen bei Oberneritz und an den Häusern des Ortes.
- Sagittaria sagittifolia L. in einem Wassertümpel zwischen Reschwitz und Weischwitz.
- Potamogeton an mehreren Stellen der Saale, wo das Wasser ruhiger fließt. Die vorkommenden Spezies sind: natans L., gramineus L., perfoliatus L., crispus L.
- Arum maculatum L. an der Bergwand von Breternitz flussaufwärts, aber seinen Standort oft aufgebend; am sichersten gegenüber Kaulsdorf im Gebüsch.
- Acorus calamus L. häufig in der Saale, besonders oberhalb Eichicht.
- Orchis ustulata L. Bei Eyba, Arnsgereuth, Birkenhaide.
- O. coriophora L. Rothenbachswiese bei Eyba.
- Platanthera viridis Lindl. bei Eyba, Arnsgereuth, Braunsdorf und Burkersdorf (niedrige Form).

- Ophrys muscifera* Huds. auf dem Gleitsch.
Cephalanthera grandiflora Babgt. ebenda.
Iris sibirica L. auf einer feuchten Wiese zwischen Saalfeld u. Eyba.
Lilium martagon L. Im Schlosspark bei Eyba.
Anthericum liliago L. Breternitz (Wilke); Kaulsdorfer und Tauschwitzer Weinberge.
Ornithogalum umbellatum L. verwildert in Grasgärten bei Eyba.
Allium fallax Schult. Fischersdorf, Obernitz.
Juncus squarrosus L. Eyba, Karlshaus.
Carex praecox Schreb. am Wege von Saalfeld nach Köditz (gegenüber dem Bahnhofe.)
Andropogon ischaemum L. roter Berg.
Alopecurus fulvus Sm. mit *A. geniculatus* L. an seichten Stellen neben der Saale.
Sesleria coerulea Ard, am Bohlen bei Obernitz und an der Gost bei Fischersdorf.
Avena fatua L. forma *glabrata* Peterm. Felder um den roten Berg bis Pösneck, Röblitz, Kaulsdorf.
Melica ciliata L. Bergabhänge von Obernitz bis Tauschwitz.
M. uniflora Rtz. Eyba und Reschwitz.
Leutenberg, den 15. April 1884.

C. Wiefel.

Beitrag zur Flora von Eisleben.

Von R. Staritz.

(Forts. v. S. 25 d. J.)

Berberideen Vent.

- 39) *Berberis vulgaris* L. in Hecken bei E., auch in der Stadt selbst.

Nymphaeaceen DC.

- 40) *Nymphaea alba* L. wurde von mir im Jahre 1874 in den Ausstichteich an der Ziegelei und dem Weidabache zwischen OR. u. UR. ausgesät. Leider kann ich das Resultat nicht mitteilen. In den Mansfelder Seen, wie Hpe. angiebt, nicht, ebensowenig *Nuphar luteum* Sm.

Papaveraceen DC.

- 41) *Papaver argemone* L. Äcker bei OR., Rollsdorf, Aseleben, Unterriesdorf.
42) *P. hybridum* L. Äcker und am Damme der Kohlenbahn, vom Bahnhofe bis zum Riebeck. Kohlenwerke: Ottilia bei OR., selten, auch am Flegelsberge.
43) *P. rhöas* L. Äcker, überall. Eine eigentümliche Form fand ich am Wege von Unterriesdorf nach Wormsleben. In allen Teilen grösser und etwas fleischiger.
44) *P. dubium* L. Äcker bei OR., UR., Amsdorf, Seeburg, Aseleben, Erdeborn, Helfta, Unterriesdorf u. E.
45) *P. somniferum* L. bei OR. Schraplau. kult.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Wiefel Carl Friedrich

Artikel/Article: [Exkursionsbericht aus dem Gebiete der Saale bis zum Loquitztahe 117-119](#)